


# 醫宗說約

一

共四冊

内閣文庫			
番號	漢	15475	
冊數		4	( 1 )
函號	函	33	1





蔣仲芳先生述

# 醫宗說約

是集也蔣仲芳先生上窮靈案下究百家搜精摘要編成歌括每  
症主方以盡其常加減附論以通其變既無繁散之苦亦無遺珠  
之憾真活人妙訣也業醫者在所必讀秘而不傳予因請再四方  
得付梓以公海內讀者不可以具簡易而忽諸 金閭起韓堂梓

## 醫宗說約序

神農本草黃帝素問

醫道所自肇也察寒

溫而軫實鈎深探微



其難其慎蓋醫者意  
之所之而人之死生  
係焉昔人所以等良  
醫於良相甚矣醫道  
之不容忽也每見古  
人立方君臣佐使溫  
涼補瀉之間若出人  
意表而妙在彀中猶



夫品律準繩出於自然之理非可意見叅也自南北方劑判爲二塗有斗火壺冰之求登堂入室者鮮矣粗識寒溫之性畧辨浮沉之理輒思輕投奇中漫曰醫者意也



等人命於鴻毛視醫  
學爲兒戲東坡所謂  
學醫費人良足歎息  
姑蘇仲芳蔣君本望  
族與予家世年誼素  
儒學醫乃飲人上池  
杏輒成林也醫聲籍  
甚近乃得其所著說



約讀之知其積學之  
久用心之深效不誣  
而名不虛也說者論  
之定約者博之精神  
而明之變而通之豈  
惟王氏之學得蔣君  
而薪傳卽素問本草  
諸書有疏述爲羽翼




無復斗火壺冰之歎  
其功豈出良相下哉  
予且拭目望之矣  
康熙元年壬寅虞山

序

余簪

錢朝鼎撰







錢氏鼎彝

序

余皆避亂石梁思生平所  
學無一可者退而學醫於  
吾爰印月子時烽火彌天



購書不得從故家借藏書  
數卷受而讀之因戲謂邱  
月子曰幸甚操一豚蹄不  
將穰穰滿家乎居三日其  
於陰陽上下五色禁方之  
術如盲者辨日印月子笑  
曰甚矣吾子之陋也吾不  
知穰穰者何在也自是棄



去不復學今二十年家不  
飽辰糝者不學醫之故也  
一日周子子佩以其宅相  
蔣子醫宗說約一書見示

凡論方經變罔不條晰其  
自言曰此大雄氏之利他  
者也余既不學醫不能抉  
其奧突然使見於二十年



之前何至饑無食然余學  
醫而不成固恣胸決齒而  
求一但弟子學醫而醫成  
又大雄氏之利他者其過

喻使人疑成方之難  
合古方充棟而人罕  
究心肯堂王氏研精  
岐黃所著證治準繩



鬱乎大觀而又類方  
數十卷可謂取無盡  
而用不竭矣乃後學  
望洋向長安而西笑  
余也遠哉因報子佩之命  
而以數言贅之

康熙二年癸卯歲次仲夏  
望日敬亭山人姜垓撰





醫宗說約自序

余年十二先母周夫人見背先君子君輔公杜門讀書道義自許口不道阿堵字以故家貧甚嘗寄食子佩舅氏家舅氏撫教有加焉於時明發有懷因思生戚遑遑大病每於誦讀之暇間覽方書先君子遂謂小子曰汝有意於此乎古人不得為良相每願為良醫蓋良相良醫其功正相等耳果能精之則可以自





療并可以療人亦內典所謂自利利他之道也予拜  
訓之下深謝不敏長而遭滄桑之變寄迹於穹窿之  
陽人有疾者按方加減與之所投輒效因而叩戶求  
方者殆無虛晷竊思古人陳案雖各臻其妙然論多  
方雜未易窺測不免楊朱之嘆故於晨窓夕几究心  
靈素博涉羣書斟酌盡善成山居述四卷有論有方  
有經有變頗備苦心但力綿不克就梓久置度閣今

年春偶公遜叔過齋頭見而閱之謂曰汝有此而不  
與人共之不亦同於懷寶迷邦者乎且汝先子之言  
具在顧其忘諸予益唯唯謝不敏長夏無事因於山  
居述中簡其要者為主方隨症加減一症一方以見其  
常加減附論以通其變編為俚句名曰說約庶幾學  
岐黃者得會歸之源去煩苦之失耳若曰從此活人  
功與調元者等則予豈敢



康熙二年夏四月古吳自了漢蔣示吉仲芳氏識



叅閱姓氏

張懷栢翠溪氏 山西

王盛鼎舜符氏 長洲

沈頤朗仲氏 長洲

沈時譽明生氏 松江

吳德培羽仁氏 吳縣

戈士儀用羽氏 吳縣

伍麟祥聞橘氏 長洲

毛鐘祥考生氏 吳縣



張玄宿樂天氏 太倉

吳均以公氏 崑山

王弘度元坦氏 長洲

吳士縉公紳氏 徽州

趙士升序之氏 常熟

周揚俊禹載氏 嘉定

吳玉崑蒼嶼氏 長洲

湯哲愚谷氏 嘉定

王人鳳翔于氏 蘇州

王王錫百朋氏 長洲

鄭林雲山氏 吳縣

陳培養真氏 吳縣

鄭櫛兼山氏 吳縣

沈嘉元方氏 嘉定

楊宗震叔起氏 吳縣

吳樹滋如虹氏 長洲

鄒嶧岱友氏 無錫

葉朝采陽生氏 長洲



范安宅如春氏 長洲

仇起元輔卿氏 吳縣

沈永澄文淵氏 吳江

顧應選用霖氏 吳縣

曹仙鍾英氏 吳縣

沈蓮子房氏 嘉定

計玉苓天懷氏 無錫

周雲開杲氏 常州

叅閱姓氏畢

醫宗說約目次卷之首

望色 聞聲 問症

相形 頭額鼻顴耳唇舌

內經分配臟腑脉法 內經三部臟腑圖

診法集要 共十條 脉象辨 共八條

脉象主病二十九條 七絕脉法

藥性炮製歌 草部一百三十九種

本部共五十五種 菜部十種

人部九種 禽獸部十九種



魚蟲部共二十九種 金石部三十種

菓部十八種 穀部共十一種

十八反歌 十九畏歌

君臣佐使法 製度引經法

服藥時候法 咬咀丸散合宜法

李時珍煎藥法 貴賤少長異治

病在上而求諸下醫案二條 病在下而求諸上醫案三條

虛中實實中虛醫案四條 治病須求其本

製方定見案 調得宜案

醫宗說約目次

雜症卷之一

中風 傷風 中寒 暑病 注夏

溫症 火症 內傷 傷食 調理脾胃

酒客病 五鬱 諸氣 痰症 咳嗽

喘急 哮症附搶 瘧疾 霍亂 泄瀉

痢疾 積聚 痞滿 嘔吐 噎膈反胃

呃逆 噎氣 吞吐酸 饑雜 水腫

鼓脹 癆瘵 失血吐血 衄血 尿血 咳血 唾血 大便下血



雜症卷之二

汗症 頭痛 心痛 腹痛 脇痛

腰痛 臂痛 背痛 痛風 眩暈

麻木 五痺 痿症 癰症 癩狂

驚悸 怔忡 健忘 虛煩 不寐

黃疸 斑疹 便濁 五淋 小便秘

大便秘 二便閉 脫肛 三消 夢遺

滑精 脚氣 七疳 蟲積 耳病

目病 鼻病 口舌病 牙齒病 咽喉症

傷寒科目次卷之三

傷寒賦上下篇 太陽經 正傷寒 正傷風

陽明經標病 自汗 口渴 本病 胃腑本實病發斑 發黃 結胸 狂妄

少陽經環病 太陰症 腹滿咽乾 頭汗發黃

自利不渴吐衄 奔豚 動氣 呃逆 直中真寒 少陰經

厥陰經 兩感症 真陰症 逆結症熱結膀胱

熱結症下利 清水 三陽合症自利 腸垢 臍熱 挾血症

鼻衄 瘀血上焦 熱 下焦蓄血 發斑

斑爛 陽極症 陰陽毒 陽厥



陰厥

剛柔痊

陰格陽

如狂

過汗口渴

無陽不能作汗

戴陽嗽水不欲飲

撮空又手當胸昏憤暴衣摸床

懷懷

下膿血

虵厥

狐惑

越經症

食積類傷寒

脚氣類傷寒

挾痰

勞力感寒

色復陰陽易

百合瘥後昏沉錯語勞復食復

晚發

大頭傷寒

黃耳傷寒

赤膈傷寒二症俱類傷寒

胎前傷寒

產後傷寒

妊娠中寒

外治法十七條

辟瘟法

發汗止汗

吐法止吐

導法解大黃芒硝法

救陰寒法

去舌胎法

治鼻衄法

治陰症呃逆法

熨結胸法

看斑法

治發狂法

治吐舌不收法

小兒科女科目次卷之四

色診說

按眉端法

面色主病

虎口三關脉紋法

小兒脉法

心誠賦

虛實寒熱外感內傷六症辨

初生調攝稀痘法

變症

胎熱胎寒

臍風

撮口

急驚

慢驚

疳積

發熱

痧疹斑

嘔吐

泄瀉

暑症

痢疾

瘡疾

咳嗽

肺脹喘急

浮腫

黃疸

自盜汗

失血衄血

吐血咯血

脫肛



諸遲走遲

齒遲 語遲 通神散

瀉白丸

化毒丹

小牛黃丸

沉香末子

陳氏小紅丸

肥兒丸

紅燕丹

抱龍丸

蔣氏肥兒丸

玉樞丹

珍珠丹

雞肝藥

快活丸

夜啼方

吃泥土方

蟲痛方

遺尿方

治尿濁

小便秘方

語遲方

齒遲方

龜胸方

灸法

龜背方

灸法

疝氣方

斷小兒乳法

牙疳口瘡

重舌木舌

弄舌

頭面疳火

丹毒方

眼痛方

耳痛流膿

鼻瘡方

頭瘡方

臍瘡方

小兒醫案六條

女科調經

先期 後期

將來痛 經後痛

經閉塊痛 經來不止

勞瘵經絕 熱入血室

帶下

胎前諸症

惡阻

子懸

子淋

子癰

轉胞

子腫

子氣

胎水

胎漏

胎動痛

風寒頭痛

雜症

暑

泄瀉 痢疾

食傷 咳嗽

耳聾目暗

瘧疾

催生

加味達生散

臨蓐

佛手散 正產

冬月法 弄胎

夏天法 試水

子死腹中 宿疾

交骨不開

胞衣不下

產門不開

子宮不收



產後產寶湯 敗血痛 去血不止 血暈韭醋薰法

沖胃沖心 寒熱 傷食熱 蓐勞

肉戰 中風豈淋酒 痙症 大便結

泄瀉浮腫 食傷 嘔噦 胸脇痛

煩燥虛驚 不能言 飽悶 兒枕蒸乳

骨節痛

小產 固胎湯 四金匱丸 赤白帶下清源收帶方 治帶症五法

乳疾軟溫飲子 乳岩 外吹 乳發 乳漏

女子脉說 調經脉法 胎產脉法 醫案七條

瘍科目次卷之五

外科賦

純陽症訣 經絡氣血訣 三因病原

瘡瘍脉法 純陰症訣 十惡症

虛實辨 發表說 五善訣 半陰半陽訣

和榮衛說 艾灸法 發表說 攻利說 禁灸辨

圍藥法 抑陽散 抑陰散 十四日後治法

藥湯淋腫法 七日治法 藥筒吸毒法 宜針烙說

拔針法 火針法 敗症惡候 桑枝灸法調相法

腫瘍主治法 荆防敗毒散 萬靈丹

內托復煎湯 四妙湯 內疎黃連湯

衛生湯 當歸黃芪湯 神仙活命飲



瓜蒌托裏湯 復生散

蠟礬丸

回陽三建湯

潰瘍主治法

十全大補湯

加減法共五十二條

托裏溫中湯

金匱腎氣丸

附六味八味丸方

白降丹

圍藥神應丹

神燈照法

金黃散

猪蹄湯洗法

鐵桶膏

太乙膏

紅升丹

桃紅散

八寶丹

太素膏

神化丹

干槌膏

白玉膏

疥瘡

飛龍奪命丹

立馬回疔丹

治疔單方四法

紅絲疔治法

療癰 潰堅湯

滋陰散堅湯

益氣養榮湯

桃蠟散

真人壁虎散

火針法

下疳

二靈丹

珍珠散

魚口便毒

山甲肉消散

通水丹

楊梅瘡

羊肉發藥

猪肉茯苓湯

膿子湯

仙遺糧湯

點洗法六條

結毒

五寶丹

丹素丹



紫金丹

碧雲散

外治法一條

痔

治痔良方

提肛散

熊膽散

洗痔黃硝湯

藥線方

枯痔方

護痔散

喚痔散

貼頂升陽散

漏

推車客散

栢膠丸

追毒丸

閉管丸

膿瘡

疥瘡

疥靈丹

參聖丸

薰被法

黃赤丹

白鳳散

癰

浮萍散外治法七條

癰瘡

外治法三條

白赤癰風

鵝掌風

汗斑

杖瘡

金瘡

湯火瘡

損傷

和傷活血丹

活血丹

透骨丹

益母膏

醫宗說約卷之五目次終

醫宗說約

卷之五 目次

八



養骨丹

益母膏

跌打散

跌打散血丹

跌打散血丹

跌打散

金鐵

跌打散

白赤靈風

跌打散

跌打散

跌打散

跌打散

跌打散

跌打散

跌打散

跌打散

醫宗說約凡例

一望色聞聲問症相形。俱業醫之首事也。今摘靈素之奧旨。百家之微論。取其切要者。貫于編首。為初學登高之自。一脈法行世者多矣。備者繁多。簡者缺畧。寸候二腸。高陽招辨。今以內經脈法為主。附以先賢確論。二十九象。主病分明。熟讀細玩。指下自能了然。一醫之用藥。猶將之用兵也。不識兵法。何以定亂。不知藥性。何以攻疾。今取本草之切用者。刪繁去泛。編成歌訣。以便記誦。兼注炮製。于下。臨用自無疑惑。



醫方類聚 卷一  
一君臣佐使湯丸法製俱製方之要。標本先後上下虛實乃治病之機。今取先哲成言并獨得之秘附十三條于後以便考焉。

一二卷二卷俱係雜症上究靈素下採百家勾精摘要編成是訣前段言病之原病之狀中段述病之主方後段隨症加減或一句一法或二句四句一法以盡寒熱虛實之變其言淺其意深其詞簡其法備細心熟究實能活人。

一主方中藥名用一字者則註一字于旁二字者註一〇于側以便初學至于藥物分兩多少不可移易者已註明于下或可等分或可隨病君臣隨意加減者不敢先為拘定隨司命變通之也。

一條中方名古人名用一病名用日藥名用一段用上以便記識。

一傷寒論惟漢張長沙為鼻祖三百九十七法一百一十三方名曰活人書頗費記誦迨後節菴陶華提綱舉領集方四十名曰殺車椎法人稱其便亦苦簡畧今讀仲景之書勾其精要編賦二章以節菴之方補其未備約歌六十熟讀會通自有補耳。



一。小兒病名曰啞科。以其口不能言也。惟特望色相形。觀紋切脉。以知其臟腑之病。誠非易事。今以先哲察病等法。編為歌括。更得名家秘方。條附于後。治幼者宜預為修合。莫待臨渴鑿井。

一。女科雜症。與男子同也。所異者。惟胎前產後。調經種子。崩帶乳疾耳。今此數條。宗古人書。採專科法。并獨得秘編。訣具陳。使學者知所宗。不致望洋而嘆。

一。瘍家經絡表裏陰陽。古人言之詳且盡矣。醫者每以癰疽形象外見。秘方可効而忽之。遂至實實虛虛。禍不旋踵。今以經

絡部分陰陽善惡。腫瘍潰瘍補瀉之法。總成一賦。其外治升丹降丹等方。起死回生。本不輕傳。其如濟人心急。不得不公諸同志。業瘍醫者。先為修煉。庶不負一片婆心也。

一。讀古人書。如東垣升補。養正為先。子和三法。去邪為急。河間火熱。丹溪濕痰。止齋溫補。各臻其妙。豈古人矛盾若是哉。蓋古人著書。議論非特見不傳。醫案非疑難不記。欲補前人所未備也。今之學者。讀是書。即泥是說。往往有偏僻之弊。吁。人有南北。病有輕重。法有變更。豈一家言所能盡乎。此集總採古人之遺意。斟酌盡善。庶無偏僻之誦也。



醫宗說約  
一醫自岐黃之神聖。歷代之名醫。方書充棟。精微玄奧。未易入門。是集也。病狀合病。脉病原合。病方變何症。而爲寒。兼何脉。而爲熱。虛實有據。表裏無疑。一見了然。誠初學指南也。卽未諳醫者。一展卷。則脉症方治。虛實加減。燦然于目。亦可對症投藥矣。敢曰活人心。切聊爲濟衆者之一助也。高明其亮諸。  
康熙元年中秋望日。虞山嚴煜文若氏識。

醫宗說約卷之首

古吳自了漢蔣示吉仲芳氏纂述  
錫山禪醉道人計廉能元讓氏叅  
虞山元虛子嚴煜文若氏較訂

望色

經曰。望其五色。以知其病。故望色者。活人之首事也。靈樞經口。以五色命臟。青爲肝。赤爲心。白爲肺。黃爲脾。黑爲腎。內經云。五臟之氣。色見。青如草茲者死。黃如枳實者死。黑如炁者死。赤如赭者死。白如枯骨者死。此五色之見死也。青如翠羽者生。赤



如雞冠者生黃如蟹腹者生白如豕膏者生黑如鳥羽者生此  
五色之見生也。生于心如以縞裹朱生于肺如以縞裹紅生于  
肝如以縞裹紺生于脾如以縞裹瓜萆實生于腎如以縞裹紫  
此五臟所生之外榮也。內經以一色之中而分平病死三等。至  
靈樞又分明臟腑部分及浮沉淺深天澤散搏等法。蓋以其道  
之不吝忽也。予畧陳其要。夫五色有光明亮是也。五色有體潤  
澤是也。光者無形爲陽。主氣體者有象爲陰。主血氣血俱  
亡其色沉晦枯槁。經所謂草茲枳實。胎衄血枯骨五者是也。氣  
血尚存其色光明潤澤。經所謂翠羽雞冠蟹腹豕膏鳥羽五者  
是也。此五色雖爲可生。終爲一臟之色。獨亢亢則害病也。非平  
也。蓋平人五臟旣和。其一臟之色必待其旺而始榮於外。其榮  
於外也。稟胃氣而出于皮毛之間。胃氣色黃。皮毛色白。故云如  
縞裹。如縞裹者。朦朧光澤。雖有形影。猶未燦然。內因氣血無爭。  
陰陽不爭。五臟無偏勝故也。苟或不然。五臟衰敗。其見色也。昔  
之朦朧者。一變而爲獨亢。昔之光明者。一變而爲沉濁。昔之潤  
澤者。一變而爲枯槁。甚至沉濁枯槁。合而爲天。是光體俱無。陰  
陽氣血俱絕。不死又何待哉。六節臟象論曰。草生五色。五色之  
變不可勝視。至于臟腑部分容色上下淺深散搏等法。未能盡



陳容于望色全書中述之

聞聲

經曰。聞而知之謂之聖。如辨音者。聽其聲。卽可以知其物。雖非玄遠。誠非淺易。蓋不由音律之道造。必于靜定中得也。予姑以經書中要者言之。經曰。肝在音爲角。在聲爲呼。心在音爲徵。在聲爲笑。脾在音爲宮。在聲爲歌。肺在音爲商。在聲爲哭。腎在音爲羽。在聲爲呻。口出無倫謔語也。有虛有實無稽怒叫狂言也。實出言壯厲。先輕後重者。外感也。語言懶怯。先重後輕者。內傷也。語不接續。鄭聲也。無人始言。獨語也。三症鼻塞聲重。傷風也。聲啞

唇瘡。狐惑也。卒口噤。舌反張。瘕症也。鼻齁語塞。風溫也。錯語呢喃。出言不正。熱症也。心下汨汨有聲。先渴後嘔。停水也。喉中漉漉有聲。痰也。腸若雷鳴。氣不和濕也。小兒驚風。口不能言。心熱也。無還聲爲鴉聲。死症也。雜病發喘。癆瘵聲啞。危病也。已上種種。若能細察。實能活人。至于聞其五音。以知其所苦。是神聖之道。存乎司命者之方寸耳。

問症

示吉曰。望聞問切。察病之四法也。望色聞聲。切脉。古人反復言之。至于問而知之。謂工先哲尚未發明。不無有疑焉。何以故。



如至病家問其瀉痢以知其瀉痢問其寒熱以知其寒熱則淺矣必非古人之意也。即至病家問其病起于何日。日少為新病實症居多。日

多為久病。曾食何物。食冰而病藥用冰煎如傷肉食。曾有怒勞虛症居多。

房慾等事。怒則傷肝勞則內傷。及問初起何症。如初起頭疼發

如初起心腹疼痛及後變何病。如痢變瀉變瘧為輕瘧瀉變痢

瀉痢等症俱屬內傷。今口渴思飲否。口不渴內無熱也。口渴欲飲

嘔為停水之類。喜熱喜冷否。喜熱內寒。口中淡苦否。鹹寒

液少若嗽水不欲嚥。傷食不思食雜症思食為有。胸中寬否

主蓄血主陰極發燥。傷食不思食雜症思食為有。胸中寬否

虛淡其脾熱成。傷食不思食雜症思食為有。胸中寬否

疝傷食口酸。傷食不思食雜症思食為有。胸中寬否

不寬傷食痰。傷食不思食雜症思食為有。胸中寬否

積氣滯之症。腹中有無痛處否。無痛病不在內主虛有痛處主

減者。大小便如常否。小便秘結黃赤為熱清白為寒。濁如米泔

為虛。暴瀉暴痢為實久瀉久痢為虛。足冷煖否。足煖陽症足冷陰症

虛下黃赤為熱下清白為寒。足冷煖否。足煖陽症足冷陰症

如常。及平日勞逸喜怒憂思并喜食何物。勞則氣散逸則氣滯

肺思傷脾恐傷腎喜食厚。種七問法實為活人之捷徑然以此

味則生痰醇酒則發熱。種七問法實為活人之捷徑然以此

而盡古人問而知之之義尤未也。予于靜定之中若有所悟蓋

今人之病如咳嗽發熱瀉痢諸痛俱病之總名也。一症之中各



分出寒熱虛實痰火血氣等件隨症調治。此豈有異人之目。洞見臟腑者乎。亦惟問其症以知之也。予何人斯。敢忝末議。但願學岐黃者。見痰即攻痰。見火即治火。見食即消食。莫為病之總名所拘也。

### 相形

頭者諸陽之會也。頭重視身。名天柱骨倒。元氣敗矣。因于濕。首如裹。蓋至卑之邪。而犯至高之位。其象有物以裹其首也。又有頭搖頭眩頭暈者。經所謂徇蒙招尤。目瞑耳聾也。蓋為知有物以蒙其首。招搖尤甚。又兼瞑聾。是下寔上虛之故。有痰有火有虛有風

額南方也。經曰。心熱病者。額先赤。若青黑色現。主有暴疾。

目肝之竅也。經曰。肝病者。眦青。脫陽者。見鬼。脫陰者。日盲。氣脫者。目不明。陽氣盡。陰氣盛。則目瞑。欲愈之病。日眦黃。日赤主熱。白睛黃主黃疸。眼胞腫主風。主濕。開目見人。病屬陽。閉目不見人。病屬陰。凡病目明能識見者。可治。若睛昏不認人。或目上視。或眼小目瞪直視。或日和視。或目睛正圓。或戴眼反拆。或眼胞陷下。皆死症也。若病人目睛微定。暫時稍動者。屬痰。宜吐。若目中不了了。大便不通者。宜下。

鼻者肺之官也。肺病喘息鼻張。經曰。脾熱病者。鼻先赤。凡鼻色



青者腹中痛。微黑者有水氣。黃者小便難。白者爲氣虛。鮮紅有  
留飲。鼻孔乾燥者必衄血。鼻燥如烟煤。屬陽毒熱極。鼻孔冷滑  
而黑。屬陰毒冷極。鼻燥息如鼾睡。屬風溫。鼻塞濁涕者。屬風熱。  
鼻流清涕者。屬肺寒。鼻孔痔脹者。屬肺熱有風。  
經曰。心病者。顴赤。腎病者。顴與顏黑黃赤色出兩顴。大如母指。  
主卒死。肝熱病者。左頰先赤。肺熱病者。右頰先赤。  
耳者腎之竅也。經曰。耳焦枯。受塵垢。病在骨。精脫者。耳聾耳間  
青脉起者。掣痛。足少陽經絡亦繞耳而入耳。故暴病而耳聾耳  
腫耳痛耳旁紅。皆屬少陽風熱。

經曰。唇舌者肌肉之本也。肺不榮則肌肉軟。肌肉軟則舌萎人  
中滿。人中滿則唇反。唇反者甲篤乙死。  
經曰。足少陰氣絕則骨肉不相親而肉軟却。齒長而垢髮無潤  
澤。戊篤己死。足厥陰氣絕。唇青舌卷囊縮。庚篤辛死。凡病  
人舌乾口焦爲脾熱。焦而紅者吉。焦而黑者凶。唇口俱腫赤者  
是熱極。青黑者是寒極。口苦者是胆熱。口甜者是脾熱。口燥咽  
乾者腎熱。舌乾口燥者是心熱。口噤咬牙者是風痊。唇口生瘡  
聲啞者是狐惑。齒燥無津液是陽明熱極。前板齒燥脉虛者是  
中暑。唇口舌胎斷紋者難治。唇色白者主失血。主虛。唇口燥裂



是脾熱。齒如熟齒者難治。若唇青舌卷。唇吻反青。環口鰲黑。口張直氣。口如魚口。唇口顫搖不止。氣出不返者死。頰爲北方腎水象也。經曰骨熱病者頰先赤。色赤又主腎與膀胱氣滯熱結而小便不通。

舌心之苗也。經曰心病者舌短卷。頰赤少陰氣厥逆走上則齧舌。凡見舌乾舌碎舌裂。主心火甚旺。總之舌鮮紅濕滑者吉。燥瀆者凶。舌上白胎者胸中有寒。丹田有熱故胎白而滑。未入乎腑邪在半表半裏間。法當和解。舌上黃胎者必燥渴。胃腑有邪。法當下之。舌上黑胎燥生芒刺者必燥渴亢極則難治也。法當

急下。若不燥渴身不熱。舌上黑胎而滑者屬陰寒。法當急溫。若舌卷焦黑而燥者陽毒熱極亦當下之。若舌青而胎滑無熱不渴者陰毒寒極亦當溫之。凡舌色鮮紅者吉。青黑者凶。而紫者爲陰寒。赤而紫者爲陽熱也。但見舌硬舌卷舌腫舌短舌強囊縮者難治。

經曰頭者精明之府。頭傾視深精神將奪矣。背者胸之府。背曲肩隨府將壞矣。腰者腎之府。轉搖不能腎將憊矣。膝者筋之府。屈伸不能行則僂俯筋將憊矣。骨者髓之府。不能久立行則振掉骨將憊矣。病人身輕自能轉動者易治。身重不能轉動者



難醫。掌中熱者，腹中熱；掌中寒者，腹中寒。四肢倦怠者，主中氣不足。手足牽引，口噤難言者，名曰風症。四肢強直，口噤頭搖者，名曰瘧症。又手冒心多，因過汗，尋衣摸床，名曰撮空。脚手難移，身重而痛，小便短赤，名曰風溫。若身熱口渴，揭去衣被，揚手擲足，脈來有力，陽也；熱也。寔也。無熱不渴，欲得衣蓋，或身重足冷，倦臥惡寒，或好向壁臥，閉目不欲見光明，懶與人言，陰也。寒也。虛也。總之身輕，手足和煖，開目欲言者，吉。若身汗如油，喘而不休，形體不仁，乍靜乍亂，脈浮而洪者，死。皮膚潤澤者，生。枯燥者，死。形如枯骨，脈脫者，死。大骨枯槁，大肉陷下者，死。若看小兒，更有八候之說。兩手伸縮曰搖，十指開合曰撮，勢如撲曰驚，頭偏側曰顫。身仰後曰反，臂如開弓曰引，目直似怒曰竄，露睛不活曰視。凡此者，風痰驚熱所為，大人亦常犯之。

內經分配三部臟府脈法

脈要精微論曰：尺內兩傍則季脇也。季脇穴名，尺內尺澤之穴，兩傍尺之外側也。尺外以候腎，尺裏以候腹中。腎有二枚，二尺候之候腹中者，附上所以候大腸、小腸、膀胱之疾。左外以候肝，內以候胃，內以候脾。脾附土，土之上關，位也。肝主貴，貴上附土，土之上關，位也。肝主貴，貴上附土，土之上關，位也。右外以候心，內以候膻中。膻中氣海也。前以候前後，後以候後上。



竟上者胃喉中事也。下竟下者少腹腰股膝脛中事也。

示吉按經曰持脉有道。虛靜為保。古之神聖尚以虛靜是戒。今之學者非古誰遵。而臟腑三部不能一定于胸中。寧言虛靜乎。舊訣以經絡相為表裏。大腸小腸列于二寸。蔡西山戴同父滑伯仁復以二腸之病候于尺中。至先師李士材非之尤甚。及考丹溪脈訣二法並載。予以為信招辨之訣。奚不遵岐黃之典。上從胃喉。下至膝脛。三集有序。內外無乖。由此而再加虛靜之功。豈復有指下難明之訥耶。

內經三部臟腑圖

內經三部臟腑圖



寸關尺者從魚際至高骨。却有一寸故名寸。從尺澤至高骨。却有一尺故名尺。至高骨。却有一尺故名尺。寸陽尺陰。高骨為陰陽之關界。故名關。從關至魚際。經云上竟上也。從關至尺。澤經云下竟下也。膽寄于肝。大小腸膀胱統于腹中。故經文不及之。



診法

黃帝曰診法何如。岐伯對曰診法常以平旦陰氣未動陽氣未散飲食未進絡脉調勻氣血未亂故乃可診有過之脉。

黃帝曰平人何如。岐伯曰人一呼脉再動一吸脉亦再動呼吸定息脉五動閏以大息命曰平人。平人者不病也。醫不病故爲病人平息以調之。

脉經曰欲持其脉令仰其掌男先取左女先取右醫者覆手以中指切至高骨定其關位次下食指切至關前以定寸位再下名指切至關後以定尺位。

叔和曰下指之際宜相病人長短肥瘦人長臂亦長指下宜疎人短臂亦短指下宜密瘦人膚薄持之勿重肥人膚厚持之勿輕。

樞要曰持脉之道有三輕手循之曰舉重手取之曰按不輕不重委曲求之曰尋初持脉時宜先輕手舉之以察其浮如脉浮膚上陽也腑也內應心肺再重手按之以察其沉如脉沉肉下陰也臟也內應肝腎又再不輕不重中而取之以察其中如脉行于血肉之間中和之應也內應脾胃若浮中沉俱不見則委曲而求之若隱若見三部皆然則爲陰陽伏匿之脉。



經曰春胃微弦曰平。夏胃微鉤曰平。長夏胃微與弱曰平。秋胃微毛曰平。冬胃微石曰平。診家當隨四時而察胃脉。慎勿執一。東垣云不病之脉不求其神而神無不在也。有病之脉則當求其神之有無。蓋言不論脉之數熱遲寒。脉來有力卽爲有神。但清其熱溫其寒。自己若遲數無力。是爲無神。根本不固。將何所恃耶。

秦越人云男子生于寅。寅爲木。陽也。女子生于申。申爲金。陰也。故男脉在關上。女脉在關下。是以男子尺脉恒弱。女子尺脉恒盛。是其常也。反者男得女脉。女得男脉也。男得女脉爲不足。病在內。女得男脉爲太過。病在四肢。右得之病在右。左得之病在左。隨脉言之也。

脉法曰反關脉者。脉不行于寸口。由列缺絡入臂後。手陽明大腸之經也。以其不順行于關上。故曰反關。有一手反關者。有兩手反關者。此得之于有生之初。非病脉也。令人覆手診之。自見經曰凡陰之所在不應。不應者。仰手而沉。覆手而沉也。是天地之氣使然。診家當先識運氣。及南北二政之理。若不知而誤治之。反代天和。

脉象辨



浮中沉伏脉之上下也。浮者為上。有餘。按之不足。中者為中。行于肌肉。

沉者為下。行于筋骨間。伏者又其下也。附于骨上。重按不見。

長短芤三脉。脉之盈虛也。長則過于本位。短則不及本位。中間

有兩頭無曰短。兩頭有中間空曰芤。

平緩遲數四脉。脉動之急慢也。一息四至五至曰平。一呼一吸為一息。

一息三至曰遲。較之平脉稍遲。比之遲脉稍速曰緩。一息六至

曰數。

促結代瀉四脉。脉動之有止者也。脉動數。時一止即來曰促。脉

動緩。時一止即來曰結。動而中止。不能即來。良久復動曰代。往

來遲滯似止非止。三五不調曰瀉。

大洪寔長弦緊牢革動滑十脉。脉之有餘之類也。較之平脉稍

大曰大。大與洪相似。但不十分浮而有力。浮大有力曰洪。洪與寔相似。但洪則重按稍衰。

且長。浮中沉三部皆然曰寔。長于本位曰長。長而端直如弓弦

曰弦。弦而急彈如切繩曰緊。緊與弦相似。緊則長而端直。切急而左右彈。弦則惟長而端直而已。

古人弦取象于弓。弦緊取象于切緊繩可知矣。浮洪有力。重按則空曰革。沉寔有力。舉

之不見曰牢。狀如大豈厥厥動搖曰動。中指充滿往來流利曰

滑。

小短濡弱微細瀉七脉。脉之不足之類也。小于平脉曰小。短于



本位曰短。浮小無力曰濡。重按不見沉小無力曰弱。舉之乃空。細則僅存一線。猶有常位。可審微則似有若無。可虞血脉將亡。濇則三五不調。惟見往來遲滯。

浮洪虛濡革散芤七脉。皆浮脉之類也。浮于膚上。舉之有餘曰浮。洪則兼有力而大。虛則兼無力而軟。濡兼微小。重按則無。革兼洪大。重手不見。散則類乎浮大。中手便無根蒂。芤則體原虛軟。重按傍有中空。

沉伏弱牢四脉。皆沉脉之類也。沉于筋間。重按不見曰沉。重按不見推筋尋之始得曰伏。弱則兼無力而小。舉之不見。牢則兼有力而實。輕手則無。

### 脉象主病二十九法

示吉曰脉氣血之神也。隱于膚中。視之不見。惟恃三指之巧。而識悔吝之機。誠非易事。故脉之理微。自古難之。然豈因其難也。恐置之不問乎。上稽靈素。下考百家。凡脉應于指下者。數取形求。共得二十九種。其上下動止盛衰虛實。往來跡象。雖極指下之幻。亦無遁情矣。從此而察三部之中。見是脉。卽有是症。脉症相合。內外互參。爲治之法。自彰也。然此二十九象。散見諸經。起而集之者。代有其人。由來已久。但簡要者多。所缺畧。備全者不







主厥逆沉遲為寒極主洞泄沉數有力為實熱外症燥渴便沉

遲無力為虛寒外症手足厥冷宜溫補沉實主內熱沉細主骨痛經云

諸細而沉者皆在陰則為骨痛沉滑主痰飲滑氏作宿食沉伏主霍亂沉緊主

急痛經曰寸口脈沉而緊心下有寒沉喘主寒熱沉短而敦主

厥陰旺立冬前後得甲子厥陰之至沉短而敦沉細懸絕主冬故以夜半死寸

沉主陽虛心氣鬱肺氣寒關沉胸脇疼痛尺沉主下元虛冷泄

瀉瀉

數脈宜寒涼忌溫熱無熱不渴手足冷而脈數者死

數脈動太速也呼吸定息脈來六至過于平脈一至曰數為陽

盛陰虧之候主熱越人云數者府主煩經云數主吐脈經曰寸

主暴驚黃帝曰脈至如主三消寸數上消關數主適得病扁鵲

為適得病前大後小即頭痛數而浮主表熱手背熱為外數而

沉主內熱手心熱為邪熱數細無力主陰虛發熱血虛之症盜

夜重乾咳數大無力主內傷元氣為虛熱宜數大有力主實熱

皮毛枯槁數大無力主內傷元氣辛甘發散數大有力主實熱

內外皆熱或云便秘脈躁喘數者為陽主夏故以日中死寸數

左主面赤舌燥右乾咳聲嘶關數左口苦脇痛右嘈雜善饑口

臭人數左溺赤五淋右大便閉腸紅

遲脈宜溫熱補忌寒涼剋伐經曰察九候獨遲者病



遲脉動太慢也。呼吸定息。脉僅三至。減于平人之脉一至曰遲。

為陰盛陽虧之候。主寒。扁鵲云遲者脈也。遲則為寒。主不足。寸見為氣不足。尺見為血不足。

遲而浮主寒在表。遲而沉主寒在裏。遲而沉細無力主中寒厥。

冷。倦臥指甲青。舌卷囊縮。遲而滑者脹。遲而澀者有癥結。

寸遲。左心虛神怯。右冷痰氣短。關遲。左面青脇痛。右中滿吐瀉。

尺遲。左精冷小便餘瀝。右火衰不育泄瀉。

大脉。已午月脉宜洪大。察九候獨大者病。形瘦脉大胸中多氣者死。

大較之平脉稍大也。浮中沉皆然。大之極為洪。為實。為陽有餘。

陰不足之候。經云寸口脉大主實。主病進。經曰大經以清者脈大主實。主病進。則病進。

主寒熱。經曰脉大者寒熱在中。主癲病。岐伯曰大堅疾者癲病。主不得偃臥。經曰肺氣盛脉

不得偃臥。數大有力主外感風寒。邪氣有餘。謔大無力主內傷。

元氣正氣不足。寸大。左舌乾消渴善驚。右咳嗽喘急。關大。左口

苦善怒。右痞脹不食。尺大男子為逆。主二便不利。女子為順。尺

獨大搏手主有孕。

小脉。察九候獨小者病。人身大而脉往來小者死。

小較之平脉稍小也。中外皆然。小之極名微。名細。為正氣不足。

之候。主寒。主氣血皆少。靈樞經曰小者血氣皆少。主病在內。經云脉小實而堅者主病在內。

主胃反。經云小弱而清胃反。主泄少氣。靈樞經曰尺膚寒其脉小者泄少氣。小而數主陰虛。

脉象主病

共



發熱小而遲主虛寒瘧冷。傷寒汗吐下後脉小為病退。若

乳子病熱脉小為順。產後傷寒脉小非陽病見陰脉也。經曰乳子病熱脉懸小何如。岐伯曰手足溫則生。

死。寸小左神昏善忘驚悸。右懶言氣怯關小左目昏易怒。右

少食痞滿尺小下元虛冷腰膝軟疼。

滑脉 人身滑而脉往來滑者死。滑而盛病日進。

滑脉行動不滑也。往來流利如珠之盤展轉替替然與數相似。

一曰浮中如有力。曰滑。為陰氣有餘之候。經云滑者陰氣有餘也。陰氣有餘為多汗。

身寒伯仁曰滑為血實氣壅之候。血不主痰飲主宿食主吐逆。

勝于氣也。二論雖異實可互為闡明。脉法曰關上滑而主癰疾。經曰癰疾何如。岐伯曰脉搏大滑數大小不均必吐逆。

心中結熱滑疾胃中有寒。叔和脉盛滑堅者病在外。脉滑浮而疾。

謂之新病。經內女子二尺滑而和者主有子。滑而有斷絕者主經

閉。尺脉偏滑疾面赤如醉。寸滑左心悸痰滯心包。右咳嗽痰喘。

關滑左寒熱口苦。右宿食嘔吐尺滑小便淋相火妄動腎濁。

濇脉 申酉月脉浮短而濇。病在外脉濇堅難治。

濇脉之行動不滑也。虛細而遲往來極難三五不調無復次第。

如雨沾沙如刀刮竹曰濇。岐伯曰濇者陽氣有餘也。為身熱。無活滑氏曰濇為氣多血少之候。為

陽氣有餘之候。主少血主心痛主血痺。經曰濇則心痛。濇主亡

汗主傷精濇而堅內留惡血。表熱脉濇主中霧露。女子有



孕主胎痛無孕敗血為病寸濇左心神虛耗驚悸怔忡右短

氣冷痞關濇左目昏脇痛右心疼痞滿尺濇下元不足男子傷

精女人崩漏

緊脉夏至後得甲子太陰旺太陰之至緊大而長

緊者勁急而不和緩也按之搏指長而左右彈如切繩絞索之

狀曰緊滑氏為邪風搏擊伏于榮衛之間主寒主痛主積聚主吐逆叔和曰緊則為寒緊

而滑者吐逆駛而盛而緊曰脹內經緊而急者遁尸經脉緊牢者為

實扁鵲浮緊主傷寒表症沉緊主寒客腹中名內傷寒氣口右關緊盛

左手平和者主傷食寸緊左頭熱目痛右鼻塞咳嗽關緊左

風癰肋脹指甲青右惡心脹滿尺緊疝瘕腰脚臍下痛二便不

利

緩脉乳子中風緩則生急則死腎病及一尺忌見

緩脉動舒緩而不緊急也往來徐徐呼吸不及四至較遲脉和

速為榮衛向衰之候主虛主濕主解經曰尺脉緩濇謂之解解而滑為

熱中浮而緩主風表沉而緩主內虛主冷緩而濇為痺上見之

為項強下見之為脚弱寸緩左怔忡多忘右氣短頭重關緩

左風虛眩暈右善嘔不思食尺緩脚膝無力下元虛冷

示吉曰緩中州脾脉也緩而無神方可言病若四至調勻緩



而有神不大不小不浮不沉不輕不重意思欣欣如春風楊柳之狀平和之應也。倘認為病脉則誤矣。古人論脉大人以五至為平。小兒以六七至為平。今若此又覺偏于熱矣。豈古今時勢異耶。抑今人元氣薄也。

弦脉 經曰春胃微弦如持長竿末稍曰平 脾病及右關及四季之末忌見

弦長而端直如按絲弦舉之應手按之不移為陰遏陽鬱之候。

主瘧主痛主飲主疝主寒熱往來主傷風主宿食 經曰脉弦在寸口者宿食

主驚 經云肝腎并小弦欲驚 主氣結主勞倦主經絡閉為寒所阻弦數為

勞瘧為傷寒熱邪傳少陽寒熱口苦脇痛耳聾 雙弦脇急痛

弦長為積 寸弦 左 頭疼心惕 右 咳嗽惡心關弦 左 脇痛寒熱

右 宿食痞滿尺弦小腹痛下焦停水

### 芤脉

芤浮大而軟中空傍實傍有中無若捻葱葉為血不能統氣之

候 伯仁曰氣有餘血不足血不能統氣故脉來虛而大若芤之狀 主失血芤而數主火盛而血

妄行芤而遲主水土二臟虛寒不能藏血失血寸芤 左 心虛易

驚痰現紅星 右 咳血血絲關芤 左 脇痛吐血 右 嘈雜嘔血尺芤

便血腸紅女子崩漏

洪脉 立夏後得甲子太陽旺 太陽之至洪大而長 右寸及冬忌見 宜寒涼



洪較大更盛也。浮大有力。騰上滿指。來至大而去且長。有類乎  
 實。惟重按稍衰為異。為氣血燔灼之候。主煩主咽乾。主表裏皆  
 熱。主二便濇。主傷寒陽明經病。寸洪左煩熱舌乾裂。右乾咳。  
 唾粘上消。關洪。左眼赤善怒。右火嘈易飢脹滿。尺洪。左小便赤  
 濇。右大便難。火旺遺精。

虛脉

虛中下皆空也。浮大而軟。舉按無力。豁然不能自固。訣曰浮而無力為虛  
 為榮衛俱虛之候。主暑傷元氣。主虛煩多汗。主恍惚多驚。主小  
 兒驚風。病在中脉。虛難治。肝腎脉并虛為死。陰虛陽搏謂之

崩。內經寸虛。左恍惚多忘。右肉傷元氣。懶言。關虛。左目昏少寐。右  
 不思食。虛痞。尺虛。左腰膝酸軟遺溺。右下元虛冷。

實脉

實表裏俱實也。弦大而長。舉按有力。浮中沉三取皆然。曰寔。為  
 邪氣益盛之候。經曰脉實以堅謂之邪主熱主痛。主痢主氣塞。  
 主食積。主伏陽在內。寸實。左口舌瘡咽喉痛。右煩熱嗽痰喘。  
 急關實。左脇痛善怒。目赤。右中滿痰飲。臍脹食積。尺實。左便赤。  
 少腹痛。右大便難或痢。  
 散脉。老人忌見此脉。



散到手便無根蒂三五不調類乎瀉又兼浮大有陽無陰似乎

虛中指便空來去不明根由難覓如散葉隨風不常其狀為氣

血耗散臟腑欲絕之候主寒熱無時主虛陽不斂主心氣不足

主暴病而榮衛虧損寸散左神虛驚悸右氣散久喘關散左

筋萎不寐右飲食不化瘦弱無力尺散精耗耳鳴腰膝無力

長脉人短脉長者是中損二十歲

長指下有餘如持長竿過于本位為陽氣有餘之候陽也越人主

壯熱主三焦煩鬱主陽毒內蘊經脉主氣治經曰長主遺尿經云

過寸入魚主足脛痛寸口脉中手主逆氣喘急經云脉長出魚

寸長左心經實熱舌乾咽痛右上焦氣壅關長左壯熱脇痛右

中滿不食尺長溺黃莖痛大便實陽事頻舉

短脉人長脉短是大損三十歲

短指下不足中有傍無不及本位為陰中伏陽之候滑氏云氣

導其血主氣病主頭痛經曰寸口之脉中主酒病脉法曰短疾

主三焦氣滯主宿食不消短而數主心煩心痛寸短左心氣

鬱頭痛右氣怯內傷關短左胃痛引脇面青白左惡心四肢怠

惰尺短二便不利元精削弱

濡脉凡病初起見濡難治若久病後產後見之為順宜補



濡浮細無力也。輕手乍見重手却去。如線之浮水中。為氣血俱衰之候。主虛主濕。主少氣。主無血。主骨蒸盜汗。主痺積。主下冷。主婦人產後客風面腫。寸濡。左心驚盜汗。右氣乏體倦。關濡。左目昏易怒。右不食虛滿。尺濡。傷精脫血。泄瀉腰膝虛冷。

弱脉

長夏胃微。稟弱曰平。弱多胃少曰脾病。老得之順。少壯得之逆。

弱沉細無力也。輕手不見重手按之。怏怏不前。欲絕未絕。為血氣欲絕之候。主亡精。主虛汗。主痼冷。主神昏身重。主精氣不足。主元氣虛耗。寸口脉沉而弱。曰寒熱。脉弱以滑。是有胃氣。命曰易治。內經寸弱。左陽虛心悸。右形寒氣短。關弱。左筋萎無力。右瘡。

滿倦怠。尺弱。下焦冷。泄瀉便數。

革脉

經曰。渾渾革至如湧泉。病進而色弊。

革浮而有力也。輕手舉之。洪大搏指。重手則空。如按鼓皮。曰革。為裏虛表實之候。主實熱在外。主傷寒一二日表症。壯熱無汗。皮膚盡疼。又主男子亡血失精。女子半產漏下。寸革。左頭疼面赤煩燥。右咳嗽聲啞。關革。左善怒嘔血。右嘈雜善飢。尺革。夢遺失精。二便澀滯。

牢脉

越人云。牢而長者肝也。牢者為實。宜寒涼攻利。

牢沉而有力也。輕手不見。重手按之。實大搏指。曰牢。為表虛裏



實之候。主實熱在內。主傷寒熱邪傳裏。大便燥結。主骨間疼痛。  
主勞傷痿極。寸牢。左煩渴舌裂。右氣鬱引飲。乾咳。關牢。左兩  
脇急痛。右不食。臍脹。尺平。小腹痛。二便閉。腰膝痛痺。

示吉曰。牢革二脉俱在實脉中流出。革爲實之浮。牢爲實之  
沉。陰陽亢害。大抵與胃氣相遠。故先哲皆不取之。然有暴病  
而得是脉。病爲之也。若久病而診得之。胃氣全無。鮮克免者。

微脉

經云微浮秋吉冬成病

微不顯也。依稀輕眇。似有若無。模糊難見。爲氣血俱虛之候。主  
少氣。主自汗。主泄瀉。主崩漏脫精。微而數。主虛熱。微而遲。主虛

寒。浮而微者。陽不足。主身惡寒。沉而微者。陰不足。主臟寒。下利  
微而弱者。主寒。少氣。寸微。左憂惕。善忘。不寐。右短氣不足。以  
息關微。左脇肋虛滿惡寒。右惡心。不食。虛痞。尺微。男傷精。女崩  
帶。脛膝無力。

細脉

形盛脉細少氣不足以息者危

細不粗也。往來指下。極其小渺。僅存一線。如蛛絲相似。爲氣冷  
血虛。不足以充之候。主傷濕。主痛在內。主元氣不足。乏力無精。  
主內外俱冷。痿弱洞泄。主勞傷過度。神昏體倦。寸細。左心無血  
養驚悸。右氣少。倦頽。關細。左目暗筋萎。右少食。虛滿。尺細。精冷。



下虛泄瀉。女子經事過期。

促脉

示吉日促無胃脉也。傷寒熱極及暴怒痰厥急驚。尚為可生。久病及雜症見之者死。

促陽之極也。一息脉來六七至。時一止復來曰促。為陽獨盛而

陰不能相和之候。主熱極。主暴怒。主氣壅。主傷寒陽毒。主痰血

發在寸口。脉促上擊者。肩背痛。經內寸促。左狂言。風痰于心。右痰

熱咳嗽。關足左吐血。善怒熱極。右脾熱口臭引飲。尺促腎水涸。

二便瀇滯。

結脉

結陰之極也。一息脉來三四至。時一止復來曰結。為陰獨盛而

陽不能相入之候。主氣鬱。主血壅。主飲食痰飲留滯。經絡浮結

主外有痼疾。沉結主內有積聚。寸結左驚悸痰飲。右肺寒痰

嗽。關結左脇肋痞痛。右食積痰飲留滯。尺結小腹冷痛硬滿。

示吉日脉因熱而數。因數為促。因寒而緩。因緩為結。蓋促結

者寒熱之變也。滑氏曰。有氣血痰飲食五者。若有一留滯其

間脉亦為之間斷。非必死脉也。故張長沙亦作病脉。予近診

血氣素虛之人。及有年者。脉來不數不緩。但數動一至。或五

六動一止。後亦無妨。蓋其榮衛固不足以充前導。而氣血飲

食痰易于留滯也。若兼數兼緩。則病上更病。退則生。加則死。



矣。蓋可忽哉。

代脉

長夏脉但代無胃曰死。代爲戊巳惡脉。右關忌見。

代更代也。動而中止。良久復動。動而又止。如前復起曰代。爲一臟無氣而他臟爲之代至也。六脉皆然。主呼吸危亡之候。然亦有暴病而致是脉者。主霍亂吐瀉。主心腹急痛。主便膿血。主心中驚悸。主積痰停水。主中風卒仆。主瘀血飲食停滯。以致元氣不續。寸代左怔忡。言語蹇塞。右氣塞痰壅。關代左胃脘急痛。石暴痛吐瀉。尺代亡陽失血。陰疝上冲。

伏脉

經曰。按之至骨脉氣少者。腰脊痛而身有痺也。

伏浮中沉皆不見也。附于骨上。重手推筋。取之乃得。爲陰陽潛伏。關隔閉塞之候。主寒主痛。主水主霍亂。主疝瘕。主飲食不消。主榮衛氣閉而厥逆。伏結爲積聚。寸伏左沉憂失志。右氣帶痰積。關伏左血冷脇腰痛。右吐瀉暴作。中腕積塊。尺伏腎寒火虛。疝瘕痼冷。

動脉

動狀如大豈。厥厥動搖。尋之有舉之無。不往不來。不離其處。爲陰陽相搏之候。正理主痛主驚。主崩脫。主泄痢。主虛勞。體痛陽動則汗出。陰動則發熱。婦人手少陰脉動者。妊子也。內寸動左



心驚汗出右自汗痰喘關動左寒熱口苦右食積停滯尺動骨蒸虛脫崩帶溺赤

七絕脉法

一曰雀啄連連搏指忽然止絕少頃復來如雀啄食肝絕也一曰魚翔本不動而末強搖似有似無如魚之翔心絕也一曰屋漏如屋殘漏下半時一滴胃絕也一曰解索指下散亂乍數乍疎如索之解脾絕也一曰蝦遊浮于指下始則冉冉不動少焉而去久之忽然一躍進退難尋如蝦之遊大腸絕也一曰釜沸浮于指下有出無入無復止數如釜湯沸肺絕也一曰彈石沉于筋間劈劈急硬如指彈石腎絕也凡此七脉一見皆主胃氣消亡臟元已竭死無時矣

藥性炮製歌草部一百三十九種

人參味甘功專入肺止渴生津大補元氣更能養血肺熱乃忌細皮光潤者佳去蘆切片用肺中實熱者寸洪大有力勿用反藜蘆

黃芪甘溫力專補氣收汗固表內傷有濟端托潰瘍生肌大利綿軟箭幹者佳托裏生用補氣蜜炙一用鹽水炒表邪實而無汗者勿用托裏得防風而切速

甘草甘平健脾強胃調和諸藥解毒功最密炙溫中生用火退甜去小便便滋痛節主癰疽腫痛俱生用身蜜炙溫補若痞滿嘔吐者勿用反其逆海藻大戟芫花



當歸甘辛補血歸經扶虛益損退熱滋陰頭止血上行身養血中守尾破血下流全

活血不走酒浸洗淨用體肥痰盛姜汁炒恐泥膈也風和初旺者脾虛泄瀉者濕痰浮腫者勿用

川芎辛溫生血調經能止頭痛開鬱上行小者開鬱不宜單服久服酒浸用

山藥甘溫健脾補腎補陰固精瀉痢能定消腫長肉筋骨強盛

人乳拌蒸喜麥門冬惡甘遂單食多食亦能滯氣

白朮苦甘健脾強胃除濕利水痰痞皆退大者為雲朮力大氣濁小者為台朮力小

氣清土炒微黃用之入滋陰藥中再用酒拌蒸佐黃芩則安胎君枳實則消痞傷寒動氣勿用

蒼朮甘辛健脾平胃燥濕寬中鬱結開遂米泔水浸一宿去黑皮切片炒用并能發

汗定瘧祛瘴安土燥火炎乾咳聲嘶陰虛便結者勿用

白芍酸寒能收能補平肝養血腹痛自可瀉痢崩漏安胎不若

伐肝生用止痛炒用和血補血酒炒飲血止血醋炒新產婦人勿用恐酸寒伐生生氣也反藜蘆

赤芍酸寒除熱清目破血通經癰腫宜服產後勿用

生地微寒專治血熱骨蒸煩勞止吐衄血忌見鐵器酒淨用良藥煎及子血虛寒者

勿用肥人多痰姜汁浸炒用

熟地微溫滋腎補血封填骨髓勞傷易絕烏鬚黑髮耳目清徹

用生地酒浸蒸熟晒乾再浸蒸如此九次一法用好酒在砂罐內煮一夜其色如漆則熟矣忌食同生地多痰姜汗拌炒

知母味苦滋陰止渴自汗骨蒸煩熱可合生用瀉胃火鹽酒炒瀉腎火忌鐵去毛

貝母微寒止渴消痰清心潤肺開鬱除煩去心研末用出四用陝西者佳性輕而治



上焦之痰出浙江者名土貝母性重而燥。惟治皮裏膜外痰塊結腫癰瘰一切瘡瘍之痰。然肺癰肺痿及人面瘡。古人俱用者反。

黃芩苦寒。枯瀉肺火。消痰利氣。風熱皆可。條芩安胎。除下焦火。

崩淋痛痢濕熱除苦。除風熱生用。入血分酒炒。治瀉痢姜汁拌炒。治膽熱用猪膽汁拌曬乾。細實而堅者。

各條

黃連苦寒瀉心除痞止痢厚腸濕熱自己。清目除煩瘡瘍不起。

清熱酒炒。治瀉痢姜汁拌炒。開火鬱湯泡吳茱萸拌炒。去其用腸紅下血入猪大腸中煮熟用。癰腫疔瘡生用。

大黃大寒破血消瘀快膈通腸積聚盡驅。錦紋者甘酒浸蒸熟達巔頂治頭風目疾。及久積痢病治瀉痢姜汁拌炒。治傷寒熱結生用。治瘡瘍熱結酒炒。血痢薑菜汁拌曬乾。

枯梗味辛療咽腫痛載藥上升痰嗽皆用。寬胸利膈枳殼相共。

去蘆生用。若用之治腸紅久痢大腸氣鬱之疾須炒黃色。

天花粉寒清熱止渴消痰定嗽癰腫可奪。

瓜蒌潤肺消痰下氣寬胸清熱更醫乳閉。

去壳打爛去油用瀉者勿用。

半夏味辛燥濕化痰止吐開鬱健脾消涎。有毒凡使用白礬生薑皂牙同煮以半夏中無白星為度。煩渴及血症胎前勿用。反烏頭。

紫蘇其辛風寒發表梗下諸氣安胎之實。

夏月不敢用麻黃以紫蘇葉代之。

蘇子潤肺開鬱下氣定喘消痰乾咳是利。

微炒為末。

白芷辛溫陽明頭痛散風驅寒排膿可用。皮膚瘙癢通經亦中。



防風甘溫諸風通用頭暈目疼骨節痺痛去風

獨活甘辛頸項難舒腰背酸疼諸風皆除入肺

羌活溫平身痛頭疼祛風除濕活骨舒筋入膀胱小腸

柴胡味苦寒熱脇痛和解瘧疾升陽宜用他火無功咳嗽氣急痰喘嘔逆者勿用

前胡甘辛消痰解熱止嗽除痞又開氣結亦止夜啼

香附辛甘疏氣開鬱止痛調經更消宿食忌鐵器椿去毛發散消食生用入血分酒

炒軟堅止痛鹽水炒降虛火童便浸開鬱醋炒止血童便浸炒黑溫經艾汁炒消痰姜汁炒又有鹽酒醋童便四味合製

麻黃性溫解表出汗身熱頭疼風寒盡散去節根切斷用之霜降後春分前傷寒表

實無汗頭疼如斧劈身熱如火熾方用之若夏秋雖頭疼發熱不可輕用也誤用則有亡陽衄血筋惕之弊根止自汗

葛根甘平陽明發表解酒止渴溫瘧可好自汗者勿用

麥冬甘寒清心潤肺止咳滋陰煩渴皆濟更除勞熱虛火大利

溫水洗去心用不令心煩惟傷寒科帶心用之

天冬甘寒保肺清熱消痰止嗽喘渴能絕肺癰肺痿更治吐血

去心虛寒者勿用

五味味五止渴生津氣散能收滋腎強陰暑熱自汗乾咳功成

北產者佳寒邪初起咳嗽者勿用小兒尤忌凡用打碎

升麻微寒解毒散風升提下陷牙疼可攻辟瘟止瀉清胃有功

形輕堅實色青綠者佳



藁本苦辛。嶺頂頭疼。陰寒腫痛。風濕俱行。

細辛辛溫。少陰頭疼。破結通關。牙痛功成。風寒濕痺。驅散皆

反藜蘆去土葉  
用不可單服

連翹苦寒。瀉六經熱。解毒消癰。通淋水洩。去心打碎除肺火  
止用心赤鼻良驗

澤瀉甘鹹。利水滲濕。通淋消腫。陰汗可入。炒黃  
色

延胡索溫。血結諸痛。破瘀調經。跌撲堪用。生用破血。炒用調經。  
酒炒行血。醋炒止血。

地榆微寒。血熱堪用。血痢帶崩。金瘡止痛。炒黑止血。虛寒下陷。  
血衰瀉痢者勿用。

防已辛苦。風濕脚腫。手足攣急。散熱消癰。去皮酒  
浸洗

常山苦寒。專截瘧疾。最惡結痰。水脹可食。有毒令人吐。吐痰生  
用截瘧醋炒。或同烏

梅用同丁香。截三陰。犀  
人小兒及虛弱久病者勿用

龍膽苦寒。療眼清熱。下焦濕痛。疳痢皆絕。酒洗用  
入肝腎

玄參鹹寒。清無根火。目赤咽痛。心煩俱可。散腫解熱。腎虛能補。

反藜蘆勿犯銅氣堅  
黑者佳入心肺腎

丹參味苦。定志養神。生新破瘀。崩帶調經。安胎清目。癰腫能平。

酒浸去蘆  
用反藜蘆

苦參苦寒。燥濕清熱。癰腫瘡疥。逐水散結。黃疸腸風。殺蟲妙訣。

反藜蘆以糯米泔浸一夜去  
浮面腥氣晒乾一用酒拌炒

紅花辛溫。最消瘀血。多則通經。少則養血。兼治跌撲。瘡毒解截。



三稜苦平。行血。行氣。消癥。削堅。虛人當忌。麵裹煨。切片。醋炒。用。畏。牙硝。

蓬朮苦溫。破積。消聚。止痛。行血。通經。最易。消食。開胃。醋炒。用。例。

天麻辛平。風熱。眩暈。驚悸。風癇。癰瘰。俱應。濕紙裹。煨熟。用。

南星苦辛。能治。風痰。破傷。跌打。下氣。開閉。麻痺。風疾。癰腫。皆安。

姜湯泡透。切片。姜汁浸炒。用。妊娠勿服。為末。入臘月黑牯牛膽中。陰干。名膽南星。

秦艽苦辛。去濕。活筋。肢節。風痛。腸風。骨蒸。酒洗。切片。

遠志辛溫。益智。寧心。清目。利竅。壯陽。補精。甘草湯泡。去心。用。

破故紙溫。腰膝。酸痛。與陽。固精。鹽酒炒。用。即補。骨脂。用。

葫蘆巴溫。煖補。腎臟。膀胱。諸疝。脹痛。皆除。酒洗。用。

何首烏甘。漆精。種子。黑髮。悅顏。長生。不死。忌犯。鐵器。九。蒸。九。晒。用。之。

骨碎補溫。骨碎。折傷。固齒。驅風。殺蟲。最良。即猴。姜。

威靈仙溫。腰膝。冷痛。積痰。痲痺。風濕。通用。酒洗。

牛膝味苦。除濕。痺痿。腰膝。酸疼。益陰。補髓。去芦。酒洗。用。

黃精味甘。能安。臟腑。五勞。七傷。此藥。大補。洗淨。九。蒸。九。晒。用。之。鈎。吻。畧。同。切。勿。誤。用。

蒲黃味甘。逐瘀。止崩。止血。炒黑。破血。宜生。酒洗。用。

續斷味辛。接骨。續筋。跌撲。折損。且固。遺精。酒洗。用。

益母草甘。調經。所宜。產後。胎前。生新。去瘀。忌犯。鐵器。酒洗。去浮。用。

菴蓉甘溫。峻補。精血。若驟。用之。反動。便滑。忌犯。鐵器。酒洗。去浮。用。



鎖陽性溫補陰固精大便燥結酥炙用行者大便不寔

車前性寒溺澀眼赤利水止瀉帶濁有益研用

紫苑苦辛血痰上氣補虛定喘寒熱並濟酒洗

百部微寒肺熱咳逆傳屍骨蒸殺蟲有力酒洗

百合味甘安心定膽止嗽消浮癰疽可啖

款花甘溫理肺消痰肺癰喘咳定悸除煩

兜鈴苦寒肺熱久嗽定喘消痰能薰痔漏根各青木香下氣甚速兼治小腸氣

青黛性寒開鬱清火驚癇疳痢發斑俱可

耳菊味甘除熱祛風頭眩目赤收淚有功酒洗晒乾用

意苡味甘專除濕痺筋節拘攣肺癰肺痿去壳淨炒用

丹皮苦寒止血通經和傷清熱無汗骨蒸酒洗

兔絲甘平夢遺滑精腰疼膝冷補髓益陰水淘淨用白酒糯米泔同入砂罐內煮爛

成餅晒乾入諸藥用

茴香性溫能除疝氣腎臟虛寒調中煖胃鹽湯浸炒

砂仁性溫養胃進食止吐安胎通經破滯炒為末

白蔻辛溫能却癰瘡益氣調元止嘔開胃去壳炒為末

肉蔻苦溫脾胃虛冷寫痢不休功可立等麴裏煨熟研碎用

草蔻辛熱治寒犯胃作痛嘔吐不食能逐擣末用



草菓味溫消肉除脹截瘧逐痰解瘟辟瘴檇木用

菖蒲辛溫開心通竅去痺除風清聲至妙

附子辛熱性走不守四肢厥逆回陽功有厥冷回陽用生引諸藥行經用麴裏火煨

去皮臍切四片用童便浸透燒乾若入補益丸中切六片先用甘草防風同煮三四滾去皮臍再防再用童便煮一日晒乾片無毒也

毒也

天雄大熱壯陽補火陰寒止痛面風亦可製同附子

烏頭性熱溫經去風手足拘攣回陽兼用製同附子

射干味苦咽喉腫痛欬逆上氣消痰有中

旋覆鹹耳驅風開結脇滿稠痰水濕能絕

大戟苦寒消水利便腫脹癥堅其功暝眩反甘草

商陸酸寒赤白各異赤者消腫白利水氣

葶藶性寒利水消腫痰欬癥瘕治喘肺癰隔紙炒用

牽牛性寒利水消腫蠱脹疰瘕散滯除壅妊娠忌服黑者屬水力速白者屬金效遲

研爛取頭末用

草薢耳苦風寒濕痺腰背冷疼添精益氣

木通辛甘小腸熱閉利竅通經最能導滯乳閉難產淋濁皆治

通草味甘善治膀胱消癰散腫能通乳房

燈草味淡清心定驚除熱利水夜啼如神



石斛味甘。却驚定志。壯骨補虛。冷閉可恃。

去根酒洗。一法蜜炙。

石葦苦甘。清熱利水。癰閉五淋。癰疽可委。

拭去毛羊脂。妙焦黃用。

白蒺藜苦。療瘡癢。瘡白癰。頭瘡。翳除目朗。

搗去。利川。

青箱苦寒。治風熱濕。明目堅筋。殺蟲有力。

水賊味甘。益肝退翳。能止月經。積聚更奇。

壽酒。

茅根甘寒。止血治淋。利水和傷。除熱通經。

壽酒。

仙茅辛溫。腰足攣痺。壯陽補血。勞傷莫離。

烏荳湯中浸一夜酒拌蒸用。

鬱金苦溫。破血生肌。吐衄溺血。鬱結功奇。

小者為。鬱金。

薑黃味辛。消癰破血。心腹疼痛。下氣最捷。

大者為。薑黃。

牛蒡辛溫。能消瘡毒。癰疹風熱。咽疼可逐。

一名鼠粘子打未用。

紫草苦寒。心腹邪氣。利竅通水。癰腫大利。

酒洗。

白薇苦鹹。利水益陰。中風帶下。寒熱酸疼。

酒洗。

白附辛溫。治面百病。血痺風瘡。中風諸症。

白蘚皮寒。黃疸頭風。咳逆濕痺。疥癬功同。

蘆薈性寒。殺蟲消疳。癰癤驚搐。服之立安。

胡黃連苦。治勞骨蒸。小兒疳痢。盜汗虛驚。

并治。痔漏。

澤蘭甘苦。癰腫能消。打撲傷損。月事可調。

用葉調經。酒洗用。

青蒿苦寒。骨蒸勞熱。虛煩盜汗。殺蟲功烈。

童便浸。晒乾用。



巴戟天溫助腎添精疎風辟邪酒浸方靈

去骨酒洗

蘭葉甘辛散久鬱氣胆痺消渴劫痰癖利

用草蘭葉

決明子甘能除肝熱目疼收淚仍止鼻血

炒爲末

葶麻子辛利水消脹無名腫毒其功莫量

塗足心下胞胎塗臍頂收生腸去壳擣用

蘆根甘寒客熱消渴噎膈吐逆利水皆活

擣汁

蛇床苦辛風寒濕痺諸惡瘡癰陰痛能醫

炒

金銀花甘療癰無對未成則散已成則潰

山豆根苦療咽腫痛敷蛇蟲傷可救急用

俗名金鎖匙用根口嚼汁吞止咽喉腫痛

艾葉溫平驅邪逐鬼漏血安胎心寒必委

擣作絨灸百病

薄荷味辛最清頭目祛風化痰骨蒸宜服

稀莢味苦祛風除濕明目補元烏鬚強骨

酒蒸用

蒲公英寒消瘡結核化食散滯乳癰可食

夏枯草寒療癰瘰癧散血破癥目痛須求

藿香辛溫能止嘔吐發散風寒霍亂功大

荊芥味辛能清頭目表汗祛風治瘡消毒

止血炒黑用

香薷味辛傷暑便澀霍亂水腫除煩解熱

炒擣用

蒼耳甘溫風寒濕痺頭風腦漏疥癬功奇

炒擣用

茵陳味苦退濕除疸明目發汗清熱所攬



使君子溫消疳積清濁瀉痢諸蟲驅除為樂去壳取肉殺蟲半生半蒸用

良薑性熱下氣溫中轉筋腹痛宿食能攻

石蓮苦寒噤口痢疾解熱開胃白濁淋瀝去壳

劉寄奴溫破瘀通經金瘡出血下氣除癥

木部共五十四種

扶神補心善鎮悸驚健忘善怒益智安神去皮木用

茯苓味淡滲濕利竅白化痰涎赤通水道去皮入補藥川人乳拌蒸

琥珀味甘安魂定魄破瘀消癥利水通塞細研

松香性溫主安五臟殺蟲定痛惡瘡皆當治瘡用葱汁拌煮乾研用

栢仁味甘補心益氣斂汗扶陽更除驚悸去壳去油取霜用

肉桂辛熱善通血脈腹痛虛寒溫補可得不見火

桂枝小枝橫行手臂止汗舒筋手足痺利佐麻黃發汗同芍藥止汗

木香微溫散滯和胃諸氣能調吐痢功最治血分酒磨入氣分湯磨治濕治痰姜汁

磨不見火

山梔性寒解鬱除煩吐衄胃病降火不難清上焦鬱熱用慢火炒黑清三焦寔火生

用能清曲屈之火

吳茱萸熱能調疝氣臍腹寒疼吐酸用利去梗炒

山茱萸溫益髓澀精除腰膝痛腎虛耳鳴去核酒洗用一云核味清遺精者連核用



蔓荊味苦頭痛能醫能除眼淚拘攣濕痺

杜仲辛溫強筋壯骨足痛腰疼小便淋瀝

去粗皮鹽酒炒斷絲一用酥炙一姜汁炒

烏藥辛溫心腹脹痛小便滑數順氣通用

厚朴苦溫消脹除滿痰氣瀉痢其功不緩

去粗皮姜汁洗炒亦有生用者

黃柏苦寒降火滋陰骨蒸濕熱下血堪任

去粗皮切片蜜炒鹽酒炒人乳炒童便炒

或生用隨病用之

桑皮甘辛止嗽定喘瀉肺火邪其功不淺

枸杞甘溫固髓添精明目祛風種子如神

酒洗

骨皮苦寒解肌退熱有汗骨蒸強陰涼血

酒洗

棗仁味酸斂汗祛煩多眠用生不眠用炒

去壳研末

益智辛溫安神益氣遺溺遺精嘔逆皆濟

去壳研末

檳榔辛溫破氣殺蟲逐水祛痰專除後重

腹皮微溫能下膈氣安胃健脾浮腫消去

水洗三四次再用甘草湯洗曬乾

丁香辛熱能除寒嘔心腹疼痛溫胃可求

氣血勝者忌下香以其益氣也

冰片辛苦善開喉閉消風明目殺蟲亦易

小兒驚癇大人痰迷

猪苓味淡利水通淋消腫除濕多服損腎

去砂石

蘇木甘鹹能行積血產後月經兼醫撲跌

沉香降氣暖胃追邪呃逆足冷壯陽破結

忌見火生磨



乳香辛苦療諸惡瘡生肌止痛心腹痛良去油為末

沒藥溫平治瘡止痛跌打損傷破血通用去油為末

木瓜味酸濕腫脚氣霍亂轉筋吐血有利用淡竹者佳

竹葉味甘退熱安眠化痰定喘煩渴安然用淡竹者佳

天竺黃寒解煩除驚驅邪逐痰明日清心煎膏用

金櫻子溫澁精除嗽脾洩下痢崩帶功奏去心刺煎膏用

郁李仁酸四肢浮腫潤腸破血下氣寬中去壳用

燕蕒辛溫痔瘻疥癬消疔去積殺蟲不鮮去衣麴炒黃用

五加皮寒祛痛風痺健步堅筋和傷並奇去骨

楮實味甘壯陽助膝堅筋益氣明目妙經酒浸一宿蒸用

秦皮性寒散風去濕風熱驚癇目赤有力

密蒙茸寒主能明目虛翳青盲服之效速

辛夷辛溫寒熱頭風面腫齒痛通鼻溫中

蕤仁性溫理氣消痰目赤風腫止淚相閉破核取仁去皮尖研用

女貞味苦養精補陰去風除濕黑髮強筋酒浸晒乾用

五倍苦酸痺風癰疥止瀉清精明目功快

牙皂辛鹹通閉開竅頭目風淚脹食皆效

巴豆辛溫削堅蕩積破癥消痰通利有力去皮心膜或生或熟聽用



金鈴性寒大熱顛狂通水利便心痛亦當  
 雷丸苦鹹解蠱殺蟲胃熱癰瘡逐水有功  
 鉤藤味苦小兒寒熱驚癇胎風舒筋活血  
 血竭味鹹跌撲損傷生肌止痛破血功良  
 茶茗微寒解渴能濟上清頭目消痰下氣  
 阿魏辛溫除癥破結禁瘧殺蟲傳尸可滅  
 乾漆辛溫通經破積除痺殺蟲心疼痛有益炒令盡用  
 楓香辛苦辟惡驅風齒痛下痢癰瘡有功一名芸香  
 蜀椒辛熱冷氣欬逆風寒積聚辟瘧消食微炒出汗開口者勿用

菜部十種

生薑性溫散風驅寒痰嗽嘔吐泄痢能安  
 乾薑味辛溫中發表沉寒痼冷其功不小炒黑能止血并清虛熱  
 蘿蔔辛溫下氣消食止嗽解渴消麴宜吃熟者補脾胃卜子功相同炒研用  
 白芥子溫專化脇痰瘰癧胃下氣除涎炒研  
 韭味辛溫補腎益陽遺精白濁瘀血堪嘗搗汁用子功用尤勝神昏目暗者勿服忌  
 大蒜辛溫化肉消穀霍亂轉筋散癰解毒傷目忌斜蒿同食  
 胡荽辛溫頭疼消食散痧驅痘肢熱有益忌斜蒿同食令人汗死

糖蜜牛肉



葱白辛溫散邪發汗傷寒頭疼安胎有幹良蜜松葉常山同食殺人

冬葵子寒療淋利便主滑胎產通乳立見

白冬瓜甘煩渴最善消脹止淋能通二便

### 人部九種

人乳味甘補陰益陽悅顏明日羸瘦仙方

金汁甘寒解毒療瘡天行狂熱虛熱可當

屎蛆甘鹹療疳除積肚腹脹滿小兒有益

童便鹹寒勞熱吐衄痰喘咳嗽產後勞瘵生津止渴和傷功足

髮灰苦溫治嗽驅淋補陰止血吐衄如神多產婦人將髮洗淨置餅中火煨通紅灰

冷研用髮灰酒服極善催生

紫河車溫療諸虛損勞瘵骨蒸培植根本

天靈蓋鹹傳屍勞瘵癰瘡血崩投之有賴人頂蓋骨燒存性

死人枕鹹傳屍鬼疰邪氣石蛇煎湯可恃用畢送還原處人腦後骨

### 禽獸部十九種

黑嘴白鴨大補虛勞兼除水腫熱毒可消白目者能殺人忌齒齧肉

烏骨毛雞甘溫補虛折傷諸癰安胎並奇

雄雀性熱壯陽益氣腦主耳聾血點雀膏糞名白丁香能潰癰疽

雀卵酸溫男子陰痿益精種子下氣可委



伏翼味鹹去翳明目逐淋利水延年久服尿名夜明砂主寒熱積聚

龍骨甘平夢遺精泄崩帶腸癰瀉痢驚熱

虎骨味辛治脚膝定痛追風能壯筋力酥炙搗末

犀角酸寒化毒辟邪解熱止血顛狂自歇搗末

羚羊角寒明目清肝卻驚解毒和熱能安鎊末

牛黃味苦大治風痰安魂定魄驚癇靈丹研

麝香辛溫善通關竅伐鬼安驚解毒甚妙蒜忘大

鹿茸甘溫益氣滋陰洩精尿血崩帶虛羸酥炙

阿膠甘溫止欬膿血吐衄胎崩虛羸可啜蛤粉炒成珠或麴炒

能膽苦寒風痰狂執驚癇黃疸惡瘡可絕辟塵者佳

臘肉臍熱添精助腎心腹疼痛補虛堪任

狗肉鹹熱壯陽補傷更益氣力帶漏亦良

羊肉甘熱補脾益氣虛勞寒冷心驚能濟

黃牛肉甘健脾益氣壯骨強筋乳養心肺更解熱渴大腸滑利

猪肉性溫補脾益氣蹄能下乳瘡瘍皆利臟止腸紅肺能潤肺

腎止腰疼心定驚易舌能健脾油塗瘡例腦治頭眩顧消積痢

多食動風生痰最忌

蟲魚部共二十六種



蜂蜜甘平。益氣補中。止咳解毒。潤腸有功。除煩定驚。虛熱可攻。

蠟能止痢瘡瘍所通。蜜煉熟用。忌生葱。

牡蠣鹹寒。澁精止汗。崩帶脇疼。老痰祛散。火煨研末。左顧者佳。

珍珠氣寒。鎮驚除癇。開壅磨翳。止渴墜痰。研極細用。

石決明鹹青。盲內障。風熱骨蒸。益精可仗。九孔七孔者良。以麴裏煨研細用。

龜甲鹹甘。滋陰補腎。逐瘀續筋。更醫顛顛。酥炙研細用。

鼈甲鹹平。勞嗽骨蒸。散瘀理瘕。去痞除崩。酥炙研細用。醋炙亦可。

蕪州烏蛇。專主諸風。癰瘡瘰癧。風淫有功。鬚眉脫落。塞耳治瘡。

酒洗酥炙用。

花蛇性溫。癰瘰癧。喎斜大風。癰疥諸毒。莫嗟。

蝦蟇耳寒。除邪破血。解熱療痺。癰腫宜貼。

蠍味甘辛。中風風癱。手足抽掣。風痰可捐。去鹽上炙黃用。

五靈脂溫。力能行血。心腹疼痛。目翳能絕。產暈兒痺。炒熟止血。

蜈蚣辛溫。解蠱蛇毒。心腹結聚。墮胎力足。去頭足炙黃用。

蝸牛鹹寒。筋脉拘攣。脫肛痔瘡。疥毒兒痺。或生研或炙用。

僵蠶味鹹。諸風驚癇。濕痰喉痺。瘡毒潰堅。炒黃擣末。

蟬退甘寒。消風定驚。殺痺除熱。退翳催生。

蝟皮苦甘。腸風痔漏。翻胃腹痛。陰腫功奏。酥炙黃擣末。



土鼈味鹹。折傷行血。下乳通經。去積尤捷。火酒浸瓦上炙乾用

羌螂鹹酸。通腸治脹。破血墮胎。驚風全仗。去足翅火炙

斑貓有毒。破血通經。諸瘡癰癰。水道能行。去足翅糯米黃為度去米用

山甲性寒。五疔驚悸。惡瘡疥癬。去風亦易。上并炒黃耆末

鯽魚味甘。溫胃健脾。補虛進食。腸風能醫。燒灰可敷諸瘡

鯉魚甘平。氣喘咳逆。水腫黃疸。止渴安胎。

烏賊骨鹹。驅翳止淚。崩漏帶下。金瘡血遂。

鰻鱺甘平。療虛壯陽。傳屍諸蟲。帶下陰瘍。煎膏可塗癰

鱧魚甘溫。產後淋瀝。腸鳴腹痛。脾氣補益。血塊塗癰

蟹味鹹寒。散血破結。養筋益氣。胸煩悶洩。膏塗漆瘡爪主破血障暗

金石部共三十種

金銀箔辛。安心養神。驚悸顛狂。邪熱俱靈。多服有毒以鵝鵝肉解之

黃丹味辛。吐逆顛狂。止痛生肌。截瘧神方。熬錫所作山東者佳入血分

胡粉性寒。殺蟲解毒。破結消癰。生肌長肉。化鉛所作入氣分

銅青苦澁。斂瘡止血。清目殺蟲。去腐妙訣。

鐵漿性平。鎮心墜結。顛癰狂亂。解毒亦捷。

水銀辛寒。殺蟲除疥。墮胎絕孕。昇丹功大。

輕粉辛寒。瘡瘍拔毒。蟲癰疥癩。疔積亦服。即水銀所昇者



陀僧辛鹹鎮心墜痰嗽嘔瘧痢癰痔俱關

研細水飛用不可多服

丹砂甘寒明目鎮心除煩止渴益氣安神

研末水飛用昇煉服之殺人

鐘乳甘溫壯元益陽利竅下乳解毒甚良

研末水飛用

白礬酸寒清喉明目寒熱洩痢諸瘡解毒

光明如水晶者佳收斂之劑弗宜驟用

禹餘糧甘骨節疼痛寒熱咳嗽煩滿崩中

煨

朴硝性寒攻下燥結留血停痰傷寒實熱

煉作芒硝性緩再煉名玄明粉性更緩

滑石甘寒利水解渴開胃降火傷暑能活

白色者佳研細水飛用

石膏性寒清胃解肌止渴生津頭疼可醫

大熱生用煨熟研末性緩兼敷熱瘡

青鹽性寒補腎益氣明目止痛更消積聚

食鹽味鹹能吐中痰心腹卒痛過多損顏

炒熱熨心腹諸痛并洗眼

雄黃甘辛辟邪解毒更治蛇虺喉風癰肉

中無砂石者研細水飛用

紫石英溫寧心定驚咳逆邪氣腫毒能傾

赤石脂溫保固腸胃潰瘍生肌瀉痢功最

火煨紅研用

寒水石寒能清大熱腹中積聚熱渴俱提

研用

蓬砂性溫止嗽消痰善理喉痺破結開關

研用

膽礬性寒清熱殺蟲善吐風痰驚癇可攻

研用爲末吹乳驚立効

青礬石辛蕩滌宿痰消磨食積其功不凡

研細同火硝煨紅水淘淨曬乾用

無名異平消腫敗毒止痛生肌金瘡長肉

研細用法醋磨



玉屑味甘明目養神除煩止渴寧心定驚壽如米苦酒浸之消如泥用

自然銅辛主破積聚療傷續筋止痛最易火煨醋淬九次

石燕性涼利便除淋腸風痔漏產難能平火煨醋淬九次研細水飛用

磁石鹹寒能療濕痺目昏耳聾腫毒亦醫吸鉄者佳火煨醋淬七次研細用

硫黃大熱除癰疥瘡壯陽逐冷殺蟲妙方甘草湯煮研用

菓部共十八種

陳皮甘溫順氣寬膈留白和脾消痰去白麩炒

青皮苦寒能攻氣滯消堅平肝脇痛能治醋炒去穢

枳殼微溫快氣寬腸胸中氣結脹滿爲良麩炒去穢

枳實味苦消食除痞破積化痰冲牆倒壁麩炒去穢

杏仁溫苦風痰喘嗽大腸氣閉便難功奏泡去皮尖炒爲末用

桃仁甘寒能潤大腸通經破瘀血瘀堪嘗去雙仁泡去皮尖炒爲末用

大棗味甘主和百藥能益五臟補氣虛弱入藥煎洗淨打碎入丸藥煮爛去皮核

烏梅酸溫收斂肺氣止渴生津能安瀉痢自汗腸紅截瘧亦利

藕味甘平散悶除痢消食止渴更解熱毒汁止吐血節和傷速

枇杷葉苦止嗽清痰和胃定嘔解渴除煩刮去黃毛蜜炙用枇杷潤五臟止渴

榴皮酸澇精漏下痢腸風下血染髮亦易子能止渴花醫吐血

山查其酸健脾消食行血散氣癰疽有益壽未用炒黑能治血積



梨性甘寒消痰止嗽清喉降火解渴功奏精攪取汁用

柿甘澁寒主潤心肺痰嗽熱渴止血須記柿乾補虛厚腸止痢忌同蟹食呃逆用蒂

芡實甘平補脾瀉精煖腰去濕明目安神去壳炒

胡桃甘平和傷通經肌膚滑潤腰痛如神去衣用過食動風生痰

龍眼甘溫補虛益智健忘怔忡明目同治中滿氣膈者勿用去壳取肉

橄欖甘滑開胃下氣酒食渴瀉魚毒皆利核中仁可塗口唇燥裂

穀部共十一種

麥芽性溫下氣消食健脾開胃止脹吐逆炒黃所用

神麴甘溫消食開胃止瀉逐痰脹滿能退炒研

酒性大熱辟穢禦寒通行血脉莫飲太酣外科及和傷藥酒水各半煎行經藥煎熟

後入酒

醋消腫毒胃脘氣疼能消積聚血暈如神中滿嘔吐濕熱者勿用

飴糖甘溫潤肺和脾嗽渴白汗消痰補虛熱者勿用

胡麻甘平潤肌填腦益氣補虛明目不老蒸九次

白藟甘溫補脾止瀉霍亂轉筋酒毒須藉葉主蛇蟲咬傷花主赤白帶下炒搗

赤小豆平止瀉利水排癰解熱便血功最或炒或煮

芝麻性甘行風通血滑腸潤肌白濁能絕油能解毒疥癬妙訣

豆豉苦寒煩燥滿悶寒熱頭痛解表須問



菜豆其寒散癰厚腸消腫下氣執毒最良

十八反歌

本草明言十八反夏瓜母白白 頭藻大其花 其半婁貝斂芩攻烏海戟遂芫俱反細草諸參辛芍叛藜蘆參謂人參丹參 苦參玄參沙參

十九畏歌

硫黃原是火之精朴硝一見便相爭水銀莫與砒霜見狼毒最怕蜜陀僧巴豆性烈最為上偏與牽牛不順情丁香莫與鬱金見牙硝難合京三稜川烏草烏不順犀人參最怕五靈脂官桂善能調冷氣若逢石脂便相欺大凡修合看順逆炮燬炙煉莫

相依

君臣佐使法

弘景曰用藥猶如立人之制若多君少臣多臣少佐則氣力不周也按神農本草經以養命上藥為君養性中藥為臣治病下藥為佐使岐伯曰方制君臣者主病之謂君佐君之謂臣應臣之謂使非上中下三品之謂也張元素曰為君者最多為臣者次之佐者又次之藥之于證所主同者則各等分李杲曰凡藥之所用皆以氣味為主補氣在味隨時換氣主病為君假令治風防風為君治寒附子為君治濕防己為君治上焦熱黃芩為君



中集執黃連爲君。兼見何證。以佐使藥分治之。此制方之要也。本草上品爲君之說。各從其宜爾。

### 制度引經法

陳嘉謨曰。製藥貴在適中。不及則功效難求。太過則氣味反失。火製四煨炮炙炒也。水製三漬泡洗也。水火共製。蒸煮二者焉。法造雖多。不離于此。酒製升提。薑製發散。入鹽走腎而軟堅。用醋注肝而住痛。童便製除劣性而降下。米泔製去燥性而和平。乳製潤枯生血。蜜製甘緩益元。陳壁上製竊真氣而驟補中集。麥麩皮裂。抑酷性勿傷上膈。烏豆湯甘草湯漬曝。並解毒致令平和。羊酥油猪脂油塗燒。咸滲骨。容易脆斷。去穢者免脹。抽心者除煩。大槩具陳。初學熟玩。

### 服藥時候法

本經曰。病在胸膈已上者。先食後服藥。病在心腹已下者。先服藥而後食。病在四肢血脉者。宜空腹而在旦。病在骨髓者。宜飽食而在夜。東垣曰。古人服藥活法。病在上者不厭頻而少。病在下者不厭頻而多。少服則滋榮于上。多服則峻補于下。凡云分再服三服者。要令勢力相及。并視人之強弱病之輕重。以爲進退增減。不必泥法。好古曰。用藥若寒熱各半。晝服則從熱之屬。



而升。夜服則從寒之屬而降。或晴則從熱。陰則從寒。變化不一。如此。此三論各呈妙旨。學者于此貫通之。自能得其活法也。

咬咀丸散合宜法

李杲曰。湯者蕩也。去大病用之。散者散也。去急病用之。丸者緩也。舒緩而治之也。咬咀者。古制也。古無鐵刀。以口咬細。煎汁飲之。則易升易散而行經絡也。凡治至高之病。加酒煎。去濕以生。姜補元氣。以大棗發散風寒。以葱白去膈上痰。以蜜細末者。不循經絡。止去胃中及臟腑之積氣。味厚者。白湯調。氣味薄者。煎之和滓服。去下部之病。其丸極大而光且圓。治中焦者。次之。治

上焦者。極小。稠麵糊取其遲化。直至中下二焦。或酒或醋取其易散之意也。犯半夏南星欲去濕者。丸以薑汁稀糊取其易化也。水浸宿炊餅又易化。滴水丸又易化。煉蜜丸者。取其遲化而氣循經絡也。蠟丸取其難化。而旋旋取効。或毒藥不傷脾胃也。

煎藥法

李時珍曰。今之小小湯劑。每一兩用水二甌為准。多則加。少則減之。如劑多水少。則藥味不出。劑少水多。又煎耗藥力也。凡煎藥。並忌銅鐵器。宜用銀器瓦礫。洗淨封固。令小心者看守。須識火候。不可太過不及。火用木炭蘆葦為佳。其水須新汲味甘者。



流水并水沸湯等各依方。若發汗藥必用緊火熱服。攻下藥亦用緊火煎熟。下硝黃再煎溫服。補中藥宜慢火溫服。陰寒急病亦宜緊火急煎服之。又有陰寒煩燥及暑月伏陰在內者皆水中沉冷服。

### 貴賤少長異治

宗奭曰人有貴賤少長病當別論。病有新久虛實理當別藥。蓋人心如面各各不同。惟其心不同臟腑亦異。欲以一藥通治衆人之病其可得乎。張仲景曰有土地高下不同物性剛柔食居亦異。是故黃帝興四方之問岐伯舉四治之能且如貴豪之家。

形樂志苦者也。衣食足則形樂而外實。思慮多則志苦而內虛。故病生于脉與貧下異。當因人而治。後世醫者委此不行。所失甚矣。又凡人少長老其氣血有盛壯衰三等。故岐伯曰少火之氣壯壯火之氣衰。蓋少火生氣壯火散氣。况衰火乎。故治法亦當分三等。其少日服餌之藥于壯老之時皆須別處決不可忽。病在上而求諸下。

示吉曰凡病頭痛目痛耳紅腮腫咽喉腫痛一切上焦等症。除清涼發散正治外更有三法。大便結脉沉實者用酒蒸大黃三錢加入本湯中微下之名。釜底抽薪之法。大便如常脉無力用。



牛膝車前引下之名引火歸原之法如大便洩瀉脉沉足冷者宜六味地黄丸加牛膝車前肉桂足冷甚者加熟附子是冷極于下而迫其浮火上升也各導龍入海之法若不知此不免頭痛醫頭之謂也

一同學年二十餘歲患腮腫醫以清涼散火之劑不效一夜舌忽腫塞口命在須臾叩門求救予診其脉微細而數大便四五日不行矣微數雖屬虛火而便結又已屬實予用百草霜吹舌上內用酒蒸大黃五錢肉桂一錢引火下行一劑而愈一友始而牙痛既而咽腫醫投涼藥痛轉甚予診其脉沉細大

便一日二三次予曰浮火上升也其足必冷察之果然以金匱腎氣料作湯與之服完即睡覺來病失矣

病在下而求諸上

示吉曰凡治下焦病用本病藥不愈者須從上治之如足痛足腫無力虛軟膝癢紅腫用木瓜米仁牛膝防已黃柏蒼朮之品不愈者定是中氣下陷濕熱下流用補中益氣升提之若足軟能食而不能行名曰痿症宜清肺熱如治泄瀉用實脾利水之劑不效亦用升提補中益氣去當歸加蒼朮炮姜脉遲再加故紙肉苁如治下痢日數行寸口脉滑者宜吐之如治瀉血用京



血利米不效宜清心蓮子飲清心復不止再加升麻柴胡如治  
大便下血用地榆側柏槐花棕灰蒲黃荆芥血餘阿膠等件不  
效者若兼泄瀉再診其脉如右開微細或數大無力是脾虛不  
能攝血宜用六君子加炮姜若右開沉緊是飲食傷脾不能攝  
血予製沉香末子甚驗若右寸洪數大便如常是實熱在肺熱  
主流通傳于大腸宜清肺熱用麥冬花粉玄參枯苓桔梗五味  
枳壳之類如小便閉用五苓車前瞿麥不效者須加清肺藥桑  
皮桔梗玄參之類脉虛口渴者用生肌散加燈心木通之類經  
云氣化則能出矣若上部脉滑有痰是痰壅于上如玉漏之上

竅塞而下竅閉也宜用二陳四君煎大劑頓服鵝翎探吐之  
徐萬壽楓江人年二十餘歲七月中下血不止連醫不效至十  
月初屢次昏暈事急矣求治于予予診之右寸獨得洪數是必  
實熱在肺傳于大腸也用麥冬花粉桔梗玄參黃芩山枝五味  
沙參服數劑而愈

胡明甫年五十餘患臙瘡三載沿皮瘙癢微腫色紫黑用膏藥  
蓋之則流水鞋襪盡濕去膏藥即又燥烈痒痛難忍易醫數人  
內外兼治日甚一日不得已而求予予曰予非瘍醫然亦識之  
此濕熱下流也人但知燥濕清熱解毒而不知濕熱之原從脾



家下陷耳遂用補中益氣湯升舉其氣更加黃柏清熱蒼朮燥濕茯苓澤瀉利水蓋治濕不利小便非其治也彼求外敷藥適在山中未便細思之燥濕散瘀者無如陳石灰清熱者無如側柏汁皆山中所有遂以石灰研末梔柏汁調勻稍加火酒爲從治之具試之明日則瘡乾矣數日而全愈

吳江吳姓者巨族也有子十餘歲下血已久百藥不效乘便過潮乞藥予以沉香末子數服與之一月後遇諸塗復索前藥甚急予曰尚未愈乎彼曰子愈矣猶子亦病此也後服之亦愈蓋小兒多因食傷脾胃以致不能攝血也昔丹溪已言及之其外泄瀉溺塞痠症治驗頗多然古人已有成案予又附之則蛇足矣

### 虛中寔

虛中寔者本虛而標寔也如年老久病氣血兩虛若兼內有所積外有所感補之不應也至于傷寒熱病後元氣雖虛補之必復熱若多食食復尤宜消導瘧後痢後中氣脾元未復飲食易傷風寒易襲最宜細察產後發熱血虛者多若兼惡露不行腹有塊痛其熱也血滯無疑若兼胸腹滿悶咽酸惡心其熱也停食無疑若不用行瘀消導而概施補血之品其能愈乎小兒痘



後惟當補益。倘兼他病亦宜察風食而調理之。蓋表虛則風易入。脾虛則食易傷也。

周忠介公夫人年六十餘。患痰喘五六年。醫藥無効。士材先師診之曰。右寸浮洪。肺有定邪。須用麻黃石羔半夏防風細茶生薑等件。藥雖峻而病當之無畏也。投之果愈。但麻黃止可用二三分。服後兼須避風耳。

山塘吳氏母年六十餘。外患腹痛。日瀉四五行。已三四年矣。遍治不愈。予診之。二尺沉緊。予曰。內有沉積也。用熟大黃三錢。入本病藥中煎服一劑。而病如失。

管子諫夫人小產後惡露不止。屢發昏暈。面色恍白。惡心不食。自汗六脈微細而數。治以四物湯加參朮。姜衣服數劑。虛症稍退。而血亦止。但大便秘結。腹痛不食如故。而噤酸發熱尤甚。諸醫束手。予于前方中加酒蒸大黃二錢。大便始潤。而發熱噤酸漸愈。

崇明蕭氏寄居吳門之西山。有婦二十餘歲。素虛弱。患熱病。將一月。醫者滿堂。漸愈。一夕忽死。其父叩門求救。予曰。已死矣。又何救焉。彼曰。死其分也。若得一決。尤所甘心。不得已而往。至其家。帳已揭。帛已焚。慟哭之聲徹于中外。予就視之。脉雖無。重按



尚存心口微溫。予曰似有生机。即用竹瀝。燈心。生姜湯灌之。咽下一口。少頃微動。細察之。腹痛甚。問其大便。云二十日不食。亦不行矣。予以大黃一兩。芒硝五錢。桃仁當歸各三錢。與之。衆駭。口素有弱症。且病久何能堪此。予曰更有法在。強與之。遂去黑物半桶。即用參五錢煎湯補之。蓋因其素弱。急下後不得不峻補也。調理月餘而愈。今連生三子。此諸醫因其虛而不治其實。幾誤矣。從此亦可例推。

### 寔中虛

實中虛者。今實而素虛也。如病人現在頭疼。身痛。身拘急。惡寒發熱。無汗。此表寔也。宜汗之。若其人有虛症。或止衄下血。或夢遺滑精。或小便淋瀝。或大便瀉利。或內傷勞倦。或房勞陰虛。或動氣瘡痛。或胎前產後。或熱入血室。或口燥咽乾。或尺脈微弱。俱不可汗。亡之則自汗亡陽。而變為肉潤筋惕等症。如病人現在發熱潮熱。煩渴譫語。腹脹硬滿。大便五六日不通。此裏寔也。宜下之。若其人有虛症。或內傷勞倦。或房勞陰虛。或氣血兩虛。或胎前崩漏。或經水適來適斷。或小便清白。或手足逆冷。或臍有動氣。或腹痛按減。或六脈無力。或小兒病後慢驚。或傷寒惡寒及表症在者。俱不可下。亡之則自利亡陰。而變為逆冷昏



沉等症。如病人現在胸滿鬱上。微煩。或食在胃口。或喉中有痰。或胸中懊憹。或寸口脈滑。皆病在膈上也。宜吐之。若其人老弱。氣衰。或吐血。衄血。漏。或勞倦內傷。或好怒喜淫。或胎前產後。或熱入血室。俱不可吐。上之則自吐不止。而變為呃逆。喘急。厥逆等症。外如胸腹脹滿。是也。若其人平素少食。或不想食。或右關微細。或脹滿。手揉則軟。或不暖。氣作酸。惡食。俱屬脾虛不運化。如胸脇腹中諸痛。實也。若其人手按痛減。則為虛症。氣血不能運行。上氣喘急。實也。若其人勞倦內傷。或奔走大過。或房勞陰虛。皆為氣虛。不得歸元。面赤煩燥。實也。若足冷。脈沉無力。自利。則

為陽虛。陰極發燥之症。凡此種。皆虛實互見。或虛症似實。失辨為害最速。故先哲已詳言之。

示吉曰。識藥易。察病難。察病易。用藥適中難。何也。古人用藥。有因天之寒溫而異。有從人之虛實而殊。故麻黃汗藥也。或代之以羌活。或易之紫蘇。或佐之以石膏。久虛無汗。身痒如蟲行。乾葛亦解表熱。大煩口噤。不能言。柴胡能療此。皆輕重發汗之法。故用大黃下藥也。或助之以芒硝。或調之以甘草。或佐之以桃仁。或兼之以柴胡。或上行而酒浸。或散滯而姜炒。或同人參以調氣。或兼當歸以養血。或欲其走而生用。或使其留而九蒸。或



天下而用一二兩。或微利而用五六分。此皆急下微下之法。若夫吐法。瓜蒂散其首方也。至于桐油吐喉痰。常山吐瘧疾。胆礬吐喉閉。鹽湯吐霍亂。二陳湯。黃蘗汁。桔梗蘆人參蘆。葱根汁。卜子汗。無非湧吐之物。但藥之無毒者。宜大劑而頓服。藥之有毒者。宜少服而漸加。服後或以手指探。或以鵝羽探。不出以蘗汁投之。不吐再投。且投且探。無不吐者。吐至瞑眩。慎勿驚疑。但飲凉水立解。此隨症止湧之法也。外如枳實消痞。佐以白朮。知柏滋腎。導以桂心。胆汁童便。入白通以驅寒。炒黑乾姜。入四物以治熱。冷藥熱服。熱藥冷服。如此種々。先哲豈好為多岐哉。亦為

用藥適中之難。用此苦心耳。陳案同多。不容贅述。

### 治病須求其本

夫治病當知標本。以身論之。外為標。內為本。陽為標。陰為本。故六腑屬陽為標。五臟屬陰為本。臟腑在內為本。十二經絡在外為標。而臟腑陰陽氣血經絡。又名有標本焉。以病論之。先受為本。後傳為標。故百病必先治其本。後治其標。否則邪氣滋甚。其病益蓄。縱先生輕病後生重病。亦先治其輕。後治其重。則邪氣乃伏。有申滿及病大小便不利。則無問先後標本。必先治滿。及大小便。為其急也。故曰緩則治其本。急則治其標。此東垣之法。



也然脹滿便閉亦有標本之分故先喘後脹病在肺喘爲本而腫爲標治宜清金降氣先服後喘病在脾脹爲本而喘爲標治宜寔脾利水血分之症先經水斷絕而後浮腫腫爲標而血爲本先治血水分之症浮腫而後經絕腫爲本而爲標先治水此皆先哲之陳案同志者當選貝葉齋僧永譽初患疥自以水銀咬艾薰之遂喘急胸滿漸至通身浮腫一醫投之五皮飲不效復以椒目大黃等投之喘愈急而腫愈甚延予視之予曰疥在皮膚肺氣熱也復以火薰火毒傷肺遂失降下之令氣道塞水道閉喘急溺瀉浮腫之所由來矣今復推蕩陰血又傷若其童真難免于死矣遂以麥冬黃

芩山枝桑葉花粉滑石木通燈草與之服四劑而諸症皆愈

製方定見

北直梁敬州客楓江年六十餘病濁已三年淡滲寒涼溫補之品投之俱不效求治于予予診之六脉俱微惟左寸帶數予曰此因心火不降以致脾胃之氣不升白濁之物因而下滲耳法當養心升補若用本病藥無益也遂製方用丹參茯苓遠志棗仁山萸山藥黃芪白朮升麻柴胡其草陳皮姜棗煎服服三劑其濁遂至彼懷愠曰抑何故也予問其體中健否彼曰如故予曰若使所出者盡爲津液休必憊甚今濁增而體健知白濁之



物積于其中。爲藥所迫而出耳。清者既升。濁者自降。再服二劑。所積者盡。而病如失矣。投之果然。由此觀之。若無定見。庶必再換一方。寧能愈乎。從此亦可例推。

調攝得宜

夸隆盛氏。一子一女。俱十餘歲。病劇延予視之。予問何恙。曾服何藥。彼曰。男患胸滿寒熱。曾服小柴胡。加消導藥。女患內熱。乾咳特甚。曾服清火滋陰。麥冬。黃芩之品。其方具在。但服之不愈。予診之。男得浮弦。女得弦數。予曰。脉症湯藥甚相合也。因何不愈。沉思開。忽聞女衣有烟火氣。予視之。曾臥火箱中乎。曰然。予

卽以前方剉藥與之。令其遷臥床上。其子亦以前方與之。令其避風絕食。服藥完而二人皆愈。其父駭問曰。方藥相同也。何効之不同。若是耶。予曰。令郎風食症之輕者也。惟其輕也。不避風。不絕食。宿食未消。而新食復傷。舊風未散。而新風又襲矣。若令嫖咳嗽火熱燦金。而用清火潤肺之品。治之甚當。其如外火復偏。一杯水其能救一車薪火乎。此其所以皆不愈也。予因此而加之調攝。故愈。

醫宗說約卷之首

終



不寐食而食未化而寐食難化難化而寐風又難矣若令  
之不同甚矣。張氏曰。今風食。或之難化。出於其難。出於其難。風  
越風。難食。難化。宗而二人皆愈。其父難問曰。衣藥。其同。此何故。  
明以簡衣。陸藥。與之。令其難化。未。其。衣。與。之。令其。








醫宗說約二

内閣文庫		
番 號	漢	15475
冊 數		4 ( 2 )
函 號	団	33 1





醫宗說約卷之一

古吳自了漢蔣示吉仲芳氏纂述

錫山禪醉道人計廉能元讓甫叅

弟時行季芳氏

壻葉舒嵩明韓氏

司

中風人覺大指次指麻木不仁或肌肉微掣即為中風先兆

西北地寒風浩蕩或中腑兮或中臟或中血脉或中經善行數

變難名狀卒倒外症入地不知人痰塞喉間命欲喪東南地濕類中

風症候相同治須當腑中風邪着四肢惡寒拘急脉浮遲中臟



唇緩滯九竅鼻塞便閉不語時若中血脉口眼歪又有中經亦  
要知六經無症溺調和口不能言肢不持古人曾作真風治三  
家妙論亦須思東垣大率主氣虛河間腎虛兼火治丹溪主濕  
內生痰總是類中分明註治之先用開關法牙阜去皮細夏  
藜各三錢俱為末再加麝香吹鼻中有嚏則生無難活醒後投之  
三合湯茯苓皮草夏茯苓半應相當星萎歸桔苓連木竹瀝薑汁是共一  
湯左癱屬血右屬氣血虛加芍藥生地用姜汁炒瘀血桃仁  
與紅花瘀血症小便利大便黑或腹中塊痛氣虛參芪也同劑盜汗遺尿亦如之  
小便不利不可利姜蠶全竭閉塞加釣藤善治牙關閉肥人

附少以引經

烏頭附子重便者用

氣寔人參亦要忌

右寸有力去之補住痰涎于經絡

盛自汗身體痛防風

羌活升薄桂頭目不利或頭疼

辛芥穗無汗身疼加羌活防蒼木秦花配心血虧欠神恍惚

茯神遠志菖蒲入或心動搖驚悸者

酸棗竹茹辰砂益風痰熾

盛須膽星防枳牙早瓜蔓仁食傷麴芽山查寔便秘還須三化

行大便結用三化湯厚朴大黃枳實羌活等分每服一兩微利之

示吉曰東南類中風者多故從火痰氣而治寔有神驗若果

係風邪外中六經形症具者原宜先服小續命湯解表便秘

者三化湯通滯之後方用本湯調理更為切當至于治口眼



歪斜。方法固多。不如瀉夾車地倉二穴。歪左針右。歪右針左。病可立愈。

### 傷風

頭痛發熱。鼻不通。惡風。自汗。號傷風。脈來浮緩。兼無力。參蘇飲。服自然。鬆人參。紫蘇。及枳。橘。梗。乾。葛。前。胡。同。陳。皮。茯。苓。甘。半。夏。木。香。少。許。水。姜。攻。已下咳嗽去參。加桑杏去皮尖內有痰。黃芩。進痰。唾如膠。金沸草。胸滿痰多。婁貝。順冬。月自汗。桂枝。添。若還無汗。麻黃。令傷食。厚朴。麴麥。芽。中酒。白寇。烏梅。信頭。疼。羌。芳不可無。氣喘。杏蘇亦莫。剩。

示言曰人之易于傷風者其故有二。一因元氣虛乏。氣不衛外。風乘虛入。治宜參芪益氣。而佐以散邪。一因素有鬱熱在內。毛竅常開。邪風易入。治宜芩連清火。而佐以疏風。此皆氣虛鬱熱為本。風為標也。治本則標自愈。

### 中寒

中寒傷寒殊非一。傷寒科在後傷則漸深。中直入。初起。憊冷。四肢寒。無熱。不渴。身戰慄。脈來無力。又沉遲。加味理中湯。有益。參。木。桂。草。并。乾。姜。加。桂。陳。皮。功。妙。極。寒。甚。附。子。及。吳。萸。溫妙附童便煮茯苓。半。夏。吐有力。生。姜。煎。就。須。冷。服。依其所主先其所因也無脈。猪。胆。一麝香分



吃泄瀉不止加荳升姜汁三匙嘔吐入舌捲囊縮指申青脉絕  
蒸臍不可忽

蒸臍法○用麝香半夏末一匙填臍中後用生薑片  
貼于臍上放大艾火于姜片炙二七壯灸關元氣海各二七  
壯熱通于中逼寒出外手足溫煖則生 一用硫黃麝香末  
填臍中放葱餅于臍上以熨斗盛火于葱餅上熨之如餅爛  
再換一枚葱餅用葱頭一握切去葉留白根約寸許連縛四  
五餅應用

### 暑病

暑天病熱名暑症腹痛吐瀉冒暑病頭痛身熱燥不寧身如針  
刺傷暑應寒熱自汗出不止咳嗽倦怠為中暑脉虛身熱動而  
得之病屬陽加味香薷湯可止香薷冬五葉草皮厚麥味茯苓木瓜次  
第尋黃連燈心姜棗生大服氣虛參米共芪靈寒熱柴苓為要藥嘔  
加藿半法為精瀉合澤猪真妙訣去麥渴用知粉藥如神綿綿  
腹痛傷冰冷乾姜滑石法從心去連小水不利或短赤澤瀉山  
枝并滑石白木瀉加羌號暑風胸滿寔兵消食積自汗不止用參  
芪水瀉木通澤有益頭痛川芎并石羔痰悶瓜蔓及枳實已上  
治若居涼館喜風涼頭疼惡寒頭項強身形拘急熱無汗靜而



得之陰寒傷

此因暑致病

宜服羌活并蒼朮厚朴乾葛及藿香紫蘇

等分薑三片水煎熱服號升陽

湯名

兼食神麴滑石炒內傷冰冷

用炮姜

示言曰夏至一陰生人內寒而外熱若過食冰冷及連需益

元寒涼之劑遂至寒積于中而成內傷寒症凡吐瀉而腹痛

無休歇脈來遲緩者是也治宜理中湯合平胃散溫之寒甚

加附子如悞投香薷飲則危矣

注夏

溫熱蒸人夏日長氣虛體弱熱因傷胸中氣促四肢倦心煩食

少不如常好卧口乾或泄瀉治用清暑益氣湯黃芪升麻與

木各一錢參人白皮神陳黃澤酒瀉炒麥冬青皮及當歸乾葛三分各三

味九粒甘草水煎引姜棗盜汗還加浮小麥便赤滑石并山枝

渴甚天花烏梅食去毒頭痛川芎石羔好嗽加羔杏升蒼朮木

香砂仁胸不寬瀉加肉寇茯苓的去麥歸

濕

東南之地恒多濕居民感受病非一或行涉水雨露蒸或過飲

冷因而得小便短赤身體重骨肉酸麻行不疾漸加浮腫及身

黃燥土溼濕湯可識茯苓香附半陳皮厚朴澤湯猪蒼白朮引用



砂仁并姜棗臨服半匙鹽可入外濕寒熱身腫痛羌防木通加  
有益內濕胸滿兼嘔吐喘脹腹膨用枳椇黃連山查炒卜子溺  
閉木通車前力濕熱發黃仗茵陳山枝車前兼滑石

示吉曰治濕大法在表在上者開鬼門用麻黃防風葦微汗  
是也在裏在下者潔淨府用五苓葦利小便是也丹溪云濕  
得燥則豁然而收用蒼朮是也濕從風散用羌獨活類是也  
濕久則生熱用黃連山枝是也從此而變通之亮能活人但  
麻黃止可用二三分蓋汗多恐生變症耳

火

相火命門君火心三火一水不相均惟腎屬水經所謂一水不勝二火五臟

升皆是火氣有餘便是火妄動須知燦至陰經所謂一水不勝五火也古人調治非

一法一一從頭說與君心火亢極陽強病人壯氣寔鹹冷進癩

狂便閉用硝黃補大承氣湯朴硝大黃枳椇厚朴水煎服大便如常芩連應黃連解毒湯黃

芩黃連黃栢山枝烏梅水煎服治大寒火可瀉從上方隨經調

治須更定飲食勞倦身發熱元氣不足內傷症補中益氣味甘

溫陽虛之火功偏勝補中益氣湯人參黃芪當歸白朮陳皮甘草升麻柴胡生薑大棗水煎服相火

熾盛以乘陰朝涼暮熱血虛成陰中之火甘寒降知栢四物法

通靈四物湯當歸生地芍藥川芎加黃栢知母二味鹽酒炒腎水受傷陰虛病面紅耳熱



浮火盛左尺洪數無根火。栝蘤六味治如神。

六味地黃丸。地黃。山藥。茯苓。肉蓯蓉。澤瀉。丹皮。澤瀉。蜜丸。淡鹽湯送下。加黃。

栝蘤板空。心服已上補虛火法。

胃虛過食生冷傷抑遏陽氣。

脾中央火鬱之症升散之。升陽散火最為良。

升陽散火湯。升陽。散火。湯。升陽。散火。湯。升陽。散火。湯。

四肢乏力。肌熱。筋痺。或骨髓中熱。用升麻。葛根。羌活。獨活。白芍。人參。各五分。炙甘草。生甘草。柴胡。各三分。防風。二分。牛黃。水煎服。忌。

寒涼物。去獨活。及生。命門火衰。陽脫病。面赤煩燥。虛火盛。足冷。耳草加。葱。即火鬱。命門火衰。陽脫病。面赤煩燥。虛火盛。足冷。

脉沉陰極燥。回陽救急醫中聖。

回陽救急湯。見傷寒科。

陰虛發熱火旺甚。

脉數無力屬心腎。內傷發熱乃陽虛。脉大無力脾肺分。氣從左。

起肝之火。陰火還從臍下生。脚下熱來侵腹者。斯人虛極藥難。

平。熱從脚起。先用附子末。津調。貼脚心中。湯泉穴。引火下行。夜服四物降火之劑。

示吉按積熱論曰。治火之法。始而涼和。次而寒取。寒取不愈。

則因熱而從之。從之不愈。則技窮矣。是徒知治熱以寒。而不。

知熱之不衰。由乎真水之不足也。當壯水之主。以制陽光。經。

曰。寒之而熱者。取之陰。陰腎水也。求其屬也。此獨為積熱者。

說。愚意治火。除人壯氣寔者。便秘者。火微者。從正治外。俱當。

遵此為則。蓋火非水不降。未有腎水足而心火熾者也。益坎。

勝離湯。寔為火症之總司。湯見勞瘵。

內傷  
飲食勞倦是內傷。或因飢飽過行。房風寒傷人名外感。辨明調。



治病無妨人迎緊盛手背執寒熱邪作無間歇惡寒無汗鼻不通。此是外感君須別內傷之症氣口洪手心有熱微惡風寒熱間作不知味更兼氣弱語言慵內傷惡寒得煖解外感近火寒仍攻外感內傷相挾者脉症並見須辨通內傷不足急補之外感有餘瀉不同或先補養或先散先後之間無苟從。治內補中益氣用芪參歸朮升柴甘與陳引加姜棗水煎服氣和微汗最為精救腎水虧酒炒栢入心養血紅三分升麻柴胡自汗去夜間不睡加棗仁炒為末亦川芎蔓荊頭疼用口乾乾葛藥為靈巔頂痛時辛藁本怔忡驚悸棗茯神甚者再加遠志食加麴芽

查枳椇烏漆瀉瀉芍茯苓黃連枳椇除胸悶有痰前生衣為防已木瓜除脚弱龍骨牡蠣煨為末治遺精防羌芷弓身熱用寒頭疼者加虛火知母栢玄參火炎上者用黃芩黃連清內熱菊花熟地醫眼疼

傷食

後天之本屬脾胃納化飲食滋榮衛胃主納飲食不下為胃病脾主化飲食不消為脾病養生妙法節飲食脾胃受傷飲食倍胸腹飽悶并作酸噯氣惡食腹痛累或吐瀉時下洩此種種皆因傷食例甚則發熱與頭疼惟身不痛傷寒異有傷食類傷寒係在傷寒科左關平和右關緊香砂平



胃功有濟。蒼木陳皮厚朴<sup>此平胃散只</sup>香附砂仁<sup>此四味</sup>香理氣川芎

枳椇并藿香水姜煎服食須忌消肉查菓消麵<sup>山草</sup>上消糯米食酒

藥麴飯食神麴及麥芽生冷瓜菓<sup>神</sup>姜青逐<sup>皮</sup>一<sup>糯</sup>加索粉傷時加杏

仁西瓜多吃食鹽促魚傷橄欖椒紫蘇稻草將來消牛肉麝香

能消蔬菓積葛梅白寇酒傷入枳壳桔梗除胸滿挾氣烏兵寒

姜益傷飲須合四苓湯<sup>乾</sup>飲茶湯涼水之類四苓<sup>茯苓澤瀉猪苓白朮</sup>嘔吐臨服加姜

汁白朮茯苓治脾虛泄瀉車前寇白木<sup>已上消</sup>上部有脉下無

脉其人當吐不吐卒指物探吐是良方否則瓜蒂散有力<sup>赤小</sup>

豈為末溫水調<sup>下</sup>食積鬱久成濕熱<sup>黃</sup>芩連大黃不可缺再入白朮

并澤瀉去藿砂仁蒼木訣胃中停滯生冷物心腹急痛人暴卒

大黃乾姜巴豆肉等分為末名備急蜜丸豆大服三丸或吐或

瀉痛自息<sup>已上下</sup>食積法

按丹溪曰明知身受寒氣口吃寒物初得之宜溫散溫利稍

久則成鬱鬱久則成熱熱久則生火若仍用溫藥寧不助火

添病乎宜用辛涼以發表辛寒以理中邪易伏而病易退也

至東垣則有輕則損其穀重則逐其滯之論蓋少壯新病宜

推逐急去為美如老人久病又宜導化漸去為佳也二公之

旨真消導法中口訣故特拈出



調理脾胃

至哉坤元調脾胃萬物資生無病累胃陽納受是所司脾陰消  
化精神遂飲食自倍脾胃傷潔古枳朮丸為最白木八兩將土  
炒四兩枳麵皮炒為末了荷葉包米煨飯丸一補一瀉方真好  
半夏陳皮消痰用理氣香砂不可少元氣素弱脾不磨食多腹  
內即不和加入木香炒陳山黃白川麴白芍芍人參亦用多素有痰火鬱胸  
膈噯酸噯氣并酒積炒枝連芍弓陳皮砂仁木香茯苓入胃強  
脾弱人好食食後反飽難消尅黃連山枝甚石羔人參白芍其  
草及

按王節齋曰凡治諸病若見胸膈飽悶或噯氣噯酸腹痛泄  
瀉惡食少食等症便問曾何飲食審明傷積即先調理脾胃  
消導飲食然後用本病之藥或于本病藥內佐以消導若不  
審此藥雖對症而無効也蓋藥先入于胃脾胃自傷不能運  
化藥味以成功耳同志者審之

酒客病

病因于酒則歸酒氣味俱陽熱性有無形元氣受他傷上下分  
消不可久宜微汗利小便久則病深變症多先賢著論須尋究  
葛花解醒湯妙藥白寇砂仁葛花如無花以乾葛澤瀉炮姜  
根代之各五錢



神麴各一錢 猪茯苓陳皮人參約各一錢 木香青皮各五分 共為末

調下三錢病可却

六鬱

滯而不通病名鬱。濕火氣血痰與食。六鬱之症發東垣。五鬱之  
旨出岐伯丹溪製成越鞠丸。總解諸鬱有功。績香附醋炒蒼朮及  
撫弓神麴山枝宜炒黑。水丸。荳大服百丸。等分隨症加藥。病如  
失寒熱頭疼胸膈痛耳聾目暗脉沉瀉氣鬱木香烏藥加砂仁  
青皮薄桂及濕鬱周身骨節痛陰寒則發肢無力脉來沉細並  
扶苓咳嗽氣急為痰鬱手足麻木脉滑沉痰塊硬堅咯不出須

加瓜蒌桔杏仁南星半夏及海石火鬱口苦五心煩頭目昏昏  
日昏黑小便赤澀脉沉數黃連青黛功奇特午後發熱為血鬱  
小腹痛處移不得脉來沉瀉或結上下失血桃紅花入噯氣作  
酸為食鬱遇食作痛不思食胸腹飽悶面色黃積槌針砂醋炒沉  
緊脉右開春加防風夏苦參秋冬吳萸用有益

氣

捍衛冲和之謂氣。妄動變常火之例。局方燥熱與辛香以火濟  
火有何利。冷生氣者出高陽高陽生冷生氣多是火丹溪意上  
工訓治辨虛是虛者右手脉無力懶言氣短身倦怠胸中虛滿



不思食塞因塞用六君子

人參白朮茯苓甘草補中益氣亦有半夏陳皮姜棗煎服

力滯氣寔者脉洪寔憂愁忿怒因而得胸脇脹滿噫不通吐酸

惡心心鬱抑種種氣滯若何醫分心氣飲最相宜通半桂芍

各三錢半蘇梗二兩羌活桑青皮陳腹皮各五錢甘草木香引姜棗兵郎附

梳胸滿奇脇痛苦紫爲要藥痛居小腹用吳萸氣滯氣虛合補

劑六君兼用功誠異性急加柴熱用芩女人烏附原有利氣滯

腰痛梳木瓜翻胃沉香磨順氣

示吉曰治氣補虛寔瀉正治也若虛寔相兼宜一補一瀉古

人亦有定法至虛中寔寔中虛切宜用察假如人老病久脉

虛人弱虛也倘投補藥而不効須察其胸腹之間有無痛處

及噯氣作酸否若有之輕者用消導之品重者及大便寔者

用酒製大黃一二錢微利之後用補藥無不驗矣譬之加染

舊衣必須先洗其垢後加顏色也然乎

痰

百病怪病皆痰甚脾胃虛弱濕不滲濕熱相蒸遂生痰遊行到

處皆成病寔脾燥濕是良方因痰生于脾胃也降火順氣能接命痰隨氣升

善治痰者先治氣氣升屬火善治氣者先降火古人總用二陳湯隨病加減如神應扶

苓半夏及陳皮甘草四味生薑進有火枝苓次第添不愈加降黃連



氣蘇杭從容順頭疼鼻塞是挾風紫蘇羌防不可聽面紅嗽喘  
 咯不出卒倒痰涎為癰瘰熱痰因用黛芩連瓜萆花粉功奇特  
 身重倦怠名挾濕面目浮腫氣喘急脉來濡滑為濕痰燥濕健  
 脾蒼白木吐咯不出痰硬極動則氣喘名夾鬱右脉沉滑左手  
 平星萆貝附兼海石嘔吐惡心胸痞塞遇寒則甚滑遲脉乾姜  
 肉桂治寒痰再加二木從來的卒倒仆地不知人角弓反張風  
 痰立南星白附及天麻姜蚕牙早兼汁瀝惡心嘔吐口嚙酸胸  
 膈飽悶為夾食右關紫滑名食痰平胃相兼麴芽入氣虛須合  
 四君湯血虛四物姜汁益脇痰白芥子青皮痰滯經絡須瀝汁

示吉曰濕痰寒痰飲痰涎二陳寔是主劑若久而不愈  
 寸堅滑名老痰根深固結致肺胃二脉伏結者名結痰膠粘  
 固結消吐不盡大脉濇滯名頑痰隨火上升為狂為癰名火  
 痰此四者非二陳所司也宜節齋化痰丸清金降火緩治效  
 速用天冬去心黃芩酒炒海粉瓜萆仁橘紅各一兩桔梗香  
 附鹽水炒連翹各五錢青黛朴明各三錢為細末煉蜜入姜  
 汁為丸丸如龍眼大或噲化或白湯化下或細丸如黍米大  
 姜湯送下亦可

咳嗽



咳嗽當分二症奇有聲無痰咳症醫有痰無聲名曰嗽嗽屬脾  
家痰濕嗽咳為肺經和氣盛風寒火濕亦因虛主治當宜用保  
和杏粉蘇桔及前胡芩枝清火寬中梔半決消痰甘橘多引用  
生薑同燈草飲時食後起沉疴風痰再添星瀝汁肺寔桑葶不  
可無右寸浮洪有力若還風嗽聲難轉麻黃用三分石羔用一錢是  
真途清晨嗽多肺火動天冬麥冬在所用上午嗽者胃火伏知  
母石羔病自中下午嗽多屬血虛宜補陰四物湯火浮于肺黃  
昏重黃昏嗽多不宜涼藥宜人春嗽芍藥柴加入夏宜清火麥  
冬得秋用桑防冬解表麻防桂半乾姜悉已上治有聲有嘔吐

痰如無聲者二陳平胃治之則再合枳朮功誠妙茯苓半夏陳  
厚朴白姜汁臨服不可忽已上治有痰無聲者  
乾咳久嗽用滋陰內熱無痰最害人四物湯將為主劑再添知  
柏鹽酒及玄參燈心甘草和諸藥桔梗天花火用芩黃貝母黃  
冬清痰用二冬冬欬痰潤燥行血見再加沙丹苑肺傷因用芫莩  
參酸收子五味瀉皮枳桑椹辛散防姜問好音面紅吐血火炎上童尿  
藕汁最為靈

示言曰治咳嗽大法新者大約屬痰食風寒宜瀉宜散久者  
大抵屬勞火陰虛宜補宜收然新者易治久者難醫予製論



化丸。治久嗽乾咳。無出其右。不敢自秘。謹傳于世。用川貝母  
花粉款冬花陳香圓各二兩。訶子薄荷葉各二兩。為極細末。  
再用天冬麥冬去心紫苑玄參各二兩。桔梗甘草各一兩五。  
味子烏梅肉各五錢。柿餅四兩。煎湯去渣。再入梨汁蘿蔔汁  
各一碗。餽糖二兩。玄明粉五錢。姜汁三錢。煎成膏子。為元丸。  
如雞豆大。每噙一九。化盡嚥下。再噙。使藥力不斷。神效難述。

喘

肺主清高。無塞窒。一有邪干。便喘急。風寒痰火。各不同。醫家心  
法。辨虛實。內因痰火。外風寒。六脉浮洪。更有力。是為寔症。五虎

湯。麻黃石羔耳草益細辛半夏及桑皮杏仁枳殼。再加入引用。

葱姜徐徐服。隨症加減。方為的。若有痰升。喘症。茯苓附南星正

相應。乍進乍退。名火喘。芩枝冬味蘇子並食。後作喘。食積來。麴

芽查槿腹皮進。大便燥結。不能通。玄明粉兼蘇子勝。結甚加何

者為虛。正氣虛。遇勞則發。似邪欺。吸吸短氣。脉無力。補中益氣

法。精奇黃芩山枝兼火用。茯苓半夏挾痰宜。夾食山查腹皮槿

氣高而喘。是良醫。

哮喘附搶症

喉中為甚。水雞聲。哮喘原來痰病侵。若得吐痰并發散。遠離厚



味藥方靈白菓

廿一箇去梳切碎炒黃

麻黃蘇子

各二錢

芩

一錢五分

款冬半夏

各三錢

且爲君桑皮杏仁皆錢半三碗水煎一碗存食後徐徐溫

嗽下更能定喘法如神

示吉日喘爲惡候。哮爲痼疾。自古難之。然猶易明也。更有結症。最爲利害。不可不知。蓋人喉間有二管。一軟一硬。軟者連胃而無底。通有形之水穀。上入下出。名曰食喉。硬者連肺而有底。止通呼吸之氣。玄門謂之十二重樓。名曰氣喉。若有形之物。誤入氣喉。惟其有底。不能下出。必從上擄出而後止。若捨有形中之無形者。如酸醋鹽水之類。尚有方法可治。若捨

有形之易祛者。如粥飯之類。尤易擄出。若捨有形中之無形者。如瓜子生荳之類。上不出下不降。必死無疑也。醋擄者。用甘草二兩。每段切二寸長。兩半劈開。用猪膽汁五枚。浸三日。火炙爲末。蜜丸茶清吞下二錢。臨臥服。食鹽哮喘方。用白麵砂糖各二錢。糖餅灰汁。捻作餅子。爐內煤熱。剗出。加輕粉四錢。另炒。將餅切爲四槌。摻輕粉在內。令病者吃盡。吐出病根。

瘧

寒熱往來。名曰瘧。正氣與邪相擊搏。風寒暑濕。食與痰。亦有陰



虛兼氣弱陽分日發邪氣輕陰分深分應間作在氣分早臨血  
晏臨于陽為熱寒為陰並則寒熱離則止暑風邪氣與榮衛並行則病作離則病止  
榮衛邪氣並相爭邪不勝正移時早輕正不勝邪移晚行重治  
法要分有無汗無汗散邪藥為君有汗正氣藥為主更看新久  
再評論新者宜瀉宜發散久者補氣及滋陰無痰無食不成瘧  
初起清脾飲最靈草菓柴胡并厚朴陳皮半夏及黃芩茯苓白  
朮青皮醋炒甘草生姜并用兵陰陽水煎露一夜侵晨溫服効  
如神白汗去半加知豆母黑無汗加蒼乾葛精多熱黃母知加倍用多  
寒薄桂定須增頭痛羌芫芷要藥煩渴不眠葛粉親夏月香薷

并藟豆冬天無汗麻黃寒甚加桂枝白汗去此治新瘧有餘  
症若還虛久再酌斟口久自汗精神倦六脉微細更無神氣短  
懶言不思食夜間盜汗又來勤人參黃芪用補氣歸芍當白驚甲醋炙  
好滋陰除出菓兵及厚朴棗姜為引定功成若欲截分藥如何  
是者常山兵最多青皮烏梅真妙藥即香少許酒煎過或片河水各半  
煎或酒水夜裏露時侵晨飲是日絕食去沉疴瘧母恒居左脇  
間香香塊各瘧母生令人多汗脇疼連藥宜消導何為好驚甲稜蓬止末  
附四般醋煮停勻加海粉青桃麴芽與紅藍為末糊丸日三服  
病當漸去不為難



霍亂

霍亂之症起倉卒。外有所感。內有積。胃中停蓄。難運消。吐瀉交作。腹痛極。上焦但吐而不利。下焦但瀉無吐逆。中焦吐瀉兩相兼。偏陽多熱。偏陰寒。吐利得盡。陰陽順。其間死者終稀焉。治用加減止氣散。霍香紫蘇。陳皮。全厚。朴。茯苓。并半夏。桔梗。腹皮。蒼朮。先白芷。甘草。砂仁。末。生姜。大棗。水來煎。紅花。木瓜。轉筋用山查。芽。麴。傷食兼。腹痛須加炒芍藥。寒痛加姜桂。似傳。檳。青皮。心下痞。柴胡。乾葛。寒熱纏。小便利。澤猪。効。中暑發熱。連需傳。轉筋人腹痛欲死。麥湯薰洗病可止。千金方有外治法。男挽其

方細看陰陽及寒熱。又有一種乾霍亂。腹痛欲死。病勢悍。不吐不瀉。疔。腸沙。鹽水吐之。神妙案。三因吐法用鹽二兩。放刀上用鹽滓入水內。煩飲。但得吐瀉。病無妨。熱湯米湯不可按。候食探吐之後。用藥調理。外治曲池刺青筋。委中出血。亦有幹

示吉。按古人之論霍亂。多責于暑。故此疾多生于夏秋。即冬月有之。亦原伏暑而然。是以脉雖虛小。手足微冷。不可輕用姜桂熱藥。况霍亂之脉。沉伏者多。理宜正氣散。合香薷飲之。類治之。此言一出。活人不少。但夏月之病。寒熱不同。投治大



異。苟不具。妄心審問。鮮有不天人者。何則。假如病人的係日中勞役。動而得之。其為熱也無疑。若雖從日中得之。于時又多食冰水冷物。或從冷水中浴來。是又冷熱間雜矣。倘不從日中勞役。暑氣尚微。肉食與冰寒齊進。冷館兼大扇清涼。陽氣退藏。陰寒填塞。不用桂附。何以活人。故先哲升陽湯。冷香飲子。非無故而發也。

泄瀉 下水穀為瀉

泄瀉之原有六節。虛濕寒痰食與熱五泄之名。內經傳。滑泄利泄三虛之旨。先賢說。飲食傷脾。脾虛不能運化。色慾傷腎。腎虛不能用藏。忿怒傷肝。肝虛木來剋土。健

脾利水是主方。燥濕升提不可缺。或用風藥或溫補。或因虛滑宜收濟。總用健脾滲濕方。二木伏龍車。前扶苓。訣。厚朴。朱芩。與木通澤瀉陳耳木香列煨姜三片。少許鹽酒。積白。慈葛根。截濕泄泄水腹下痛。小便不利。腸鳴動。倍二木加食泄腹痛泄後減意酸臭腐食不用。加山查。香附。枳。檳。砂。仁。寒泄。脉遲。穀不化。腹痛悠悠無休罷。加炮姜。肉桂。火泄。腸鳴下黃赤。一陣痛來瀉可佈糞門。隻痛脉數急。黃連。黃芩。山枝。真。好。話。去。著。虛泄。虛滿。不思食水穀食時完不化。脉來沉細久不痊。人參山藥砂仁。掛痰泄泄痰浮水面。泄下。沉者是。積浮者是。痰或多或少。脉滑善。半夏。南星。法必添吐。



山痰涎人更便。六症從容審問明。更分新久醫方驗。新者宜瀉。宜消食久者升提。溫補益泄久下陷用升提。升麻柴胡更有力。虛甚人參芍山藥。虛寒炮姜肉苁吃。腎虛送下四神丸。故紙酒兩吳黃炮炒一兩肉苁藥麵裹煨二兩五味子二兩為末生薑半片同大棗一百枚煮爛取淨肉為丸每服一錢五分監湯送下防風羌活兼風入。暑月帶滑藟豆。尋冬天炮姜誠有得。虛泄久泄更有方。一匙黃土炒為末臨服食。

痢

痢疾原來下膿血。裏急後重不可說。食積氣滯總相兼。頑辨青黃赤白黑。純白而來氣必傷。血受病兮應是赤。氣血俱傷赤白來。食積為黃是真的。純血來者亦如之。黑者須知死血色。白膿稠粘是為痰。宛如豆汁方屬濕。諸痢下迫皆屬火。勿妄以白為寒。測通因通用。具經文。消積瀉濕和蕩滌。後重須教調氣除。清血便膿應自息。通滯湯今治法傳。條芩厚朴姜炒入。蘇梗兵榔共木通。胸中不寬陳穀立熱用黃連。姜汁炒痛木香。後重將軍不可忽。小水不利加滑車。臨服木香磨姜汁。頭疼惡寒身體熱。蒼木防風羌葛接。名風邪痢惡心作酸胸滿悶。枳椇山查麴芽呷。名食積痢內傷痢疾小腹痛。桃紅能治紫黑血。腹中不痛身不熱。大孔迫甚黃小洩。氣鬱為痢用升麻。柴胡防風不可缺。煩渴身熱腹痛



極水穀入胃卽吐噦。噦口痢疾胃熱甚。倉米人參蓮肉悅酒積。痢因恣飲酒葛根白寇烏梅烈天行疫痢老幼傳合用敗毒無他。說夏月香薷扁豆增腸癖銀花血自竭隨症加減是良工。再看新久醫中傑。新者宜下宜消。尅久者宜升宜補。益諸痢日久。咸兵榔加入扁荳芍白朮補脾山藥及茯苓下陷升麻柴胡得白久氣虛參芪用紅久血虛歸芍力血痢不止用阿膠荊芥蒲黃同炒黑姜灰從治加少許若還不止血餘頭髮燒灸用益痢久不止人虛極按腹不痛無食積四君四物隨症添。劉子栗壳日行如石榴皮肉菓瀉易梅俱收瀉藥脉來遲緩是爲寒炮姜肉桂肉寇續參蓮禁用

治禁口痢將田螺擣爛入麝香一分納臍中引下其熱內用黃連一錢人參三分煎湯終日呷之一口下咽卽愈

毛公威傳痢疾神驗方用真川連一兩五錢吳茱萸湯拌炒白朮五錢半上炒蒼朮米泔水浸炒四錢五分白芍酒炒二兩當歸二兩蓮肉炒四錢山查肉八錢木香不見火二兩肉豆寇麵包煨五錢四分麥芽炒三錢五分神麴五錢五分枳壳麩皮炒去麩二錢五分右共爲極細末每服一錢二分壯實者一錢五分小兒三五七分看人大小用白痢白湯下赤痢蜜二三匙和白湯下赤白相兼燈心湯下水瀉清米湯



下俱空心服。忌一切葷腥麵食椒酒煎炒生冷等物。按此方投之虛弱之人及痢久者甚為穩當。若壯盛初起腹痛甚及積滯勝者秘方白丸子奇効。用皂礬揀淨一兩入白蘿蔔汁一鍾銅杓內火上化開再入好真粉一兩伍錢和勻取起晒乾為末用神麴打糊為丸每服五分壯實者七分赤痢燈心湯下白痢姜湯下白瀉米湯下服後瀉出黑積藥即行矣。

### 積聚

以痕積聚皆有塊食積痰血成其類積為食積有成形忽聚忽

散聚為貴。榮衛失序七情傷脾不運化神憔悴五積為陰五藏生六聚為陽六腑贅。主治總宜化堅湯當歸白朮為前隊半夏陳皮枳椇兼山查香附砂仁對厚朴木香等分煎。生姜一片功方遂右脇有塊青稜蓬左脇有塊芫桃桂肉食成塊草菓連粉麵食積神子麴卜貴痰塊在中海石加瓜蒌白茯苓皮郎碎壯健人加兵稜蓬瘦弱人參少許配瘡後柴胡鱉甲青如要丸時加阿魏外治熨法有神功五仙消痞痞能潰。

痞塊外治秘法用小鱉一個紅荳菜二兩管仲五錢阿魏二錢葱蜜各一兩共擣為膏再入麝香三分貼在痞上外用青



布掩着。內服消痞藥神効。五仙膏用大黃肥阜生薑生  
葱大蒜各半斤。共搗爛。用水煎取汁。去渣再煎成膏。黑色爲  
度。攤絹帛上。先用針刺患處。後貼膏藥。

### 痞滿

從來痞滿無痛塊。胸滿虛悶難通泰。皆由土弱失運行。濕熱食  
痰多作怪。半補半瀉是奇方。白木茯苓爲主賓。枳椇厚朴及甘  
陳。木香香附砂仁在。蘇梗兵郎炒。子引用姜棗。切難載。脈遲  
加入炮乾姜。脈數黃連。姜汁方有賴。傷酒須添葛。寇澤香薷麥  
芽治食積。小便不利加澤通。大便秘結時。將軍入。按痞痛甚用大

黃脈來無力參芪益。

示古按仲景云。滿而不痛爲痞滿。而痛爲結。結責之寔寔爲  
積。滯有餘則宜下。宜消。痞責之虛。虛爲中氣不足。則宜和宜  
補。據此虛寔兩分。又何必袞同消補。但人有脾氣素虛。現停  
積滯。補之則積滯未消。邪得補而愈甚。消之則脾氣未健。土  
受傷而愈虛。不得不從易老講一補一瀉之法矣。許學士云。  
邪之所湊。其氣必虛。留而不去。其病則寔。斯言信然。

### 嘔吐

乾嘔有聲吐有物。聲物俱有。嘔之則吐。輕嘔重乾嘔。凶嘔乃漸



出吐頻出不嘔不吐為惡心總是胃虛不能食有寒有熱亦有痰有因停水因食積或因氣滯或氣虛加減平胃病自息半夏陳皮共霍香厚朴香附及蒼朮枳椇梗引通砂木仁炒為一匙姜汁臨服入煩渴欲飲脈來數王連竹茹山枝落去蒼朮吐水冷涎脈沉遲炮姜肉桂吳萸作嘔吐痰沫脈滑時南星白茯苓木索水停心下汨汨聲茯苓澤瀉猪苓樂飽悶作酸惡食氣右關緊盛傷食例神麴麥芽并兵郎草菓山查肉傷利熨傷加久病之後不納食脈來無力又微細參芪白朮并茯苓枳椇厚朴三味去胸膈抑鬱善噎氣忿怒憂愁不快意兵郎卜子大腹皮升散升麻防風具傷酒乾葛澤寇佳傷風紫蘇乾葛易

噎膈反胃

噎膈之症多因火薰蒸津液成痰阻七情妄動五藏傷陰血漸稿無生所咽喉痛塞不能食病起賁門上焦膈中膈飲食得水行食下半日又吐出下膈飲食如平人朝食暮吐渾無力主治加味二陳湯茯苓半夏陳皮黃連山枝青竹茹藿香厚朴木通的桔梗香附共砂仁臨服一是加姜汁薑汁童便次第增痰泥中焦須竹瀝合用四物姜汁炒血虛左脈來微瀉氣虛須合四君湯右脈乾弱并無力痰飲寸關脈滑沉瓜蔓貝母能開膈



脉來數盛是火炎。吳炒黃連倍用的。脉來乳瀉是血厥。桃仁歸  
尾並萊汁寸關沉瀉是氣結。沉香木香兵郎入大便燥結不通  
行酒蒸大黃合四物。再加桃杏仁麻仁炒為末養血潤燥。牛羊  
乳寒痰泥膈吳萸。兌脾不磨者。麴蘖同七情鬱結成氣。噎寸關  
沉瀉七氣湯。乾姜王芩肉桂得半。夏橘紅并熟地并草芍藥二  
桔梗吃。三枳提五枚。參一兩。氣病投之。噎自息。

示吉曰噎膈重病也。其原非忿怒抑鬱。即憂愁思慮。其來有  
漸。始則痞滿火嘈吞酸。不知治療。既而逢食則噎。尤可少食。  
久則食下則吐。或粒不下咽。當此之時。三陽熱結。精血枯槁。

若欲求愈。須病者安心靜養。行仙家十六字法。一吸便提。氣  
歸臍。一提便嚥。水火相見。如此行之。再加以薄滋味。勤  
藥餌。愈病不難。仙家云。屋破修容易。藥枯生不難也。張雞峰  
曰。噎當是神思間病。惟內觀自養。可以治之。此言深中玄旨。  
若欲速效。而投香燥之劑。其害不可言也。開膈下食方。惟玄  
明粉三錢。鵬砂三錢。為末。每服三錢。用火酒一盃。姜汁半盃。  
共入枸內煎二三滾。取出澄清。用小酒盃徐徐服之。自覺臍  
下溫熱。即得飲食矣。然亦為劫劑。服後即投大補。較之香燥  
稍善也。此方乃毛公  
威先生所傳



呃逆

俗名打呃名呃逆。纔發咽喉則據寂。連續數聲。輒輒然。短促不長。難消息。有痰有火有停水。有寒有氣。有食積。主治丁香柿蒂湯。香蒂柿竹茹陳皮當。本方四味。柿若寒。治下焦之逆氣。丁香陳飲食太過。胸中滿。麴芽枳椇及兵。郎痰涎壅塞。脉來滑。茯苓半夏木香方。水停心下。汨汨聲。白朮茯苓猪澤。尋發熱煩渴。脉來數。柴胡半夏芎黃芩。去丁滯氣。盈兮。腹胸滿。砂仁木香半夏存胃中虛冷。脉來遲。乾姜桂附木相親。脉來虛甚。全無力。六君合用。始為精。六君子人參茯苓半夏。夏日本甘草陳皮。諸呃不止。用沉香姜汁磨成臨

服。行若還病久。呃逆作。虛極。從來症最惡。六君合用。沉香寒甚。還同姜桂落。本湯去竹茹。古人嗅法。有奇方。期門灸法。亦當學。倘然大便結不行。須用將軍無推却。

嗅法。用乳香硫黃艾各三錢。為末。好酒一鍾煎。數沸。乘熱使病人鼻嗅之外。用楊姜查擦胸前亦好。灸期門法。婦人屈乳頭向下。盡處骨間動脉是穴。男女乳小者。以手一指為率。陷中動脉是穴。男左女右。灸三五壯。

噯氣

胃納水穀。脾運化。榮衛周流。無驚詫。緣何噯氣。氣上升。胃中濕。



熱痰食話。丹溪主治星半湯。南星山枝共半。夏石羔煨香附及茯苓甘草。陳皮生薑助食積。麴芽兵枳槿氣滯砂仁本香及口渴煩悶。姜炒連虛甚人參芍白木若還寒氣脉微遲或傷生冷并寒物除去。山枝及石羔加入炮姜木香益益智茴香及厚朴隨症加減病如失。

吞酸吐酸

飲食入胃脾不運濕熱相蒸為酸病。如穀食在器濕熱而易為酸也。吐出酸水名吐酸。吐咯不出吞酸。應若還不治漸惡心。翻胃噎膈須臾進丹溪加味二陳湯。茯苓半陳已前定黃連蒼朮及砂仁神麴香。

附吳萸順吞酸。冬月倍吳萸。夏月吐酸連倍甚人參白木虛弱增枳槿山查食傷認再戒怒氣以平肝。滋味薄時胃清淨。

嘈雜

心嘈總是屬虛火。火動痰生因作楚。二陳湯共桔連枝參朮附朴白芍伍煨姜棗子一同煎。竹筴姜汁加皆可嘈甚不止加石羔熱多青黛亦得所。鬱用砂仁并撫弓便寢大黃。酒蒸能救苦。驚悸怔忡左寸瀉血少將來合四物。麥冬遠志酸棗仁竹筴烏梅炒米入。終歲火嘈必天年火能燬物真可惜。

水腫



人之全生資水穀。脾主穀。腎水屬水。吐土虛不勝水。水氣泛溢。浮腫。局手按成窩。舉手滿。皮光如泡。氣喘促。寔脾燥濕是主方。利水分消。真可錄。上腫必須兼風治。開鬼門。時微汗浴。經曰。能自上下清陽之分。下腫必須潔淨。府小便利。分通水谷。分消。湯是秘人傳。二木茯苓厚朴全。猪苓澤瀉大腹皮。香附砂仁枳。壳兼陳皮木香磨水汁。生姜燈草一同煎。上腫麻黃用二分防方有。效。下浮米已藥如仙。米仁炒須麴芽上子。消食積。葶蘆桑皮治。氣急利水滑石并木通。發熱黃連山枝入。腹脹卜子共兵。郎氣。昭升柴少許。益虛甚人參亦可加。痰多半夏原有方。山根葛茵陳。

治發黃。瘡牛大黃治便寔。去白木。又有虛症更宜商。朝寬暮急血。虛殃。合四物湯。暮寬朝急氣虛症。四君合用。且先嘗先喘後脹加苓。麥冬去二木香。先脹後喘倍二木。諸脹用藥忌甘溫。麴蘆醬鹽切。莫食。

示吉曰。分消湯治脾虛水腫。土炒白朮須用三錢。寔有神驗。但先喘後脹。其病在肺。非分消所司也。麥冬飲治水出高原。其症四肢皆腫。少腹不急。初起便有喘滿。用麥冬五十粒。去心姜汁炒。糧米五十粒。水煎不拘時服。又秘方防芪散治肺葉脹腫。蓋肺主皮毛。風邪入肺。不得宣通。肺葉脹。亦能作。



腫其症先眼下臥蠶紋起喘急用防風桔梗杏仁桑皮蘇子  
貝母各一錢黃芪三分水姜煎服。又有血分症婦人先經  
水斷絕而後四肢腫滿小便不通此血瘀水道以通經為主  
宜小調經散白芷五錢沒藥官桂甘草各三錢赤芍細辛當  
歸延平各一錢琥珀另研一錢麝香五分為細末每服二錢  
酒下已上三症病同治異司命者無忽諸

### 鼓脹

水腫鼓脹其原一皆是脾虛不運尅鼓脹病重水腫輕水腫皮  
浮如常食。四肢皆腫飲食如常具病在外故輕各變鼓脹氣入于臟為鼓脹腹大身瘦

食不入

名單鼓脹病在內故重

脾虛致病是總原亦有水血與食積有因

氣寔及氣虛上工隨症用消息寔土分消是妙方二朮厚朴炒

枳椇陳皮香附縮砂仁朱苓赤茯苓澤瀉的水香腹皮引生薑水

煎氣急磨沉香飽悶兵郎炒卜子血鼓歸芍紅丹當尾赤花皮血鼓脇滿

身上有紅絲紋腹有塊痛按不移大便黑色血為殃。不愈加靈脂桃仁

水鼓小便苦秘結胸腹脹急水飲傷。合用五苓散秘方用大戟

去戟旋旋食食積鼓脹大便結小便赤澀胸悶絕牽牛卜子及

兵郎山稜蓬朮亦可設氣寔鼓脹因抑鬱留滯不散腹脹急大

腸虛秘或吐酸脇肋痛脹及面黑。合用分心氣飲見諸氣氣虛脹滿多勞



役元氣虛乏真倦極。短氣溇泄腹脹膨。脉來微細不思食。宜合  
益氣分條而治是良醫。寔脾利水為君則。順氣消食為佐使。清  
湯金制木從來得。用黃芩麥冬之類滋補腎水以制火。用知柏之類肺得清化  
斯有力。却鹽味以防助邪。斷妄想保母氣益。莫服利藥圖暫快。  
補益真元病自息。

示吉曰。人脾氣素虛。現停水積。方生鼓症。治斯疾者。正氣足  
而滯氣行。是為上工。其次利小便。尤可活人。若用下藥。大便  
利而暫取快。是速斃也。予遇斯症。嘗早服補氣健脾之品。食  
後進勝金丹一錢。消積利水順氣。雖無速效。活人已多。傳以

壽世。勝金丹用蒼木炒二兩。厚朴姜汁炒。枳椇炒。桃仁去皮  
尖炒。丹皮陳皮。兵郎赤茯苓。半夏黑丑頭末。木香各一兩。甘草  
川芎各六錢。為細末。外用阜礬四兩五錢。先用蘿蔔汁化開。  
攪去泥土。煮乾。再入醋煮乾為末。與前末和勻。再用神麴三  
兩為末。打糊為丸。丸如菉豆大。每服一錢。虛人老人五分湯  
下。并治胸膈飽悶。泄瀉痢疾。瘀血內傷。功不盡述。

癆瘵

腎經虛損各癆瘵。朝涼暮熱病無賴。五心煩熱消瘦形。乾咳失  
血真陰壞。陰常不足。彥修傳。朱丹溪有陰常不足陽常有餘論益坎勝離湯自



在發熱面赤盜汗來消中便赤功難載脉來微數兼無力日輕

夜重又喘急

若日重夜輕又為內傷元氣症

皆因房慾喪陰精滋陰降火病漸

息歸生芳芍

生大

丹茯苓天麥門冬

去心各一錢

炒知栢

鹽酒炒陳皮其

草同姜棗臨服童便竹瀝好銀胡骨皮治骨蒸

生大

芪朮棗仁炒為末

自汗保咳嗽氣急貝

母去心

苑桑有痰貝母萸仁了見血阿膠屋

苑丹寒熱驚甲醋炙早

脉弦加柴胡青皮

從治畧加炒姜灰泄瀉山藥

澤瀉找

去知栢歸童便

盜汗浮麥堪為佐牡蠣黑豆功亦大金櫻蓮鬚

去滑精

再加山藥

牛膝車前浮火動赤白濁加蓮茯燈勞熱龜膠青

蒿中嗽血沙參紫苑添

山黃

衄血枝苓茅根搗汁臨服加入用喉乾聲啞粉

桔增收斂五味訶子共瀉甚減去歸知栢連麥查朴同消食

示吉日男女人之大欲存焉每致過度陰虛症多故丹溪以

此立論然病名虛損亦有從陽氣不足者若因彥修之法緊

治虛損能免廢人乎故有反是說者謂陽生陰長只當以參

芪補之滋陰之劑無益也吁一症一藥豈容偏僻參芪補陽

東垣已製方治內傷元氣矣丹溪豈有悞哉是不善用丹溪

者悞也

失血

心生血今肝藏血隨氣而行無處缺目視舌言耳能聞手能握



特足能攝緣何錯經致妄行。勞傷火動從容說。嘔吐血出名吐  
血從胃而來是真訣。宜犀角地黃湯血皆因出鼻中。痰內有血名咳  
血肺經有火二症來。衄為輕兮咳禍烈。血隨唾出名唾血痰帶  
血絲名咯血腎經有火妄煎熬。勞瘵之症難逃越。痰涎有血血  
從脾脾虛不攝被火欺。六症皆從上竅出。鮮血為新紫血瘀。犀  
角地黃能總治犀角丹皮生地各一錢赤芍當歸連芩炒酒  
各一錢。茅根搗汁磨墨奇吐血烏膠天冬用衄血麥冬枝下黑依  
咯唾黃母知母熟地麥冬山枝加亦宜紫黑血塊胸中塞。自然大  
黃并韭汁藕節搗汁最行瘀。浮火上升童便入咳嗽沙參天麥

冬痰多貝母天花力。口渴知母味麥冬寒熱青蒿驚甲立脾虛。  
泄瀉去歸苓茯苓山藥草皮陳入從治暑加炒姜灰還同童便一  
齊吃。若還不止用蒲黃側柏荆芥俱炒黑。脉來微緩更無神血  
不藏攝虛之則阿膠加入八珍湯。四君四物合用芩連犀角不可食。有  
肉熱加重便半盃姜灰少許補澄云乾咳出血若服童便百不一死服寒涼百不一生宜童便一物飲之小便尿血  
為溺血心與小腸邪熱結。清心蓮子見淋症合本湯莖中疼痛湯  
澆雪。倘然不痛是為虛養肝固榮加減截不止荆芥及蒲黃俱  
黑補中益氣升提絕。

下血雖從大腸來其原不一費心裁有鮮有瘀有遠近糞前血為近血

尿下血



黃後血有因血熱有氣衰或為腸風下清血而色鮮或為臟毒下血色下濁者是

陷風邪亦致垂治法新久辨鮮瘀鮮者新者本方奇合用川芎

并白芍槐花荆芥及地榆三味炒黑側柏將來礬水煮其陳煎飲病

無餘發熱龜膠柴胡効血虛熱地血飢醫酒客烏梅寇乾葛下

陷防風升柴驅跌蹠傷加麻地驚從治姜灰少許俱

紫黑血塊為瘀血桃仁紅花歸尾訣驚甲丹皮及川芎赤芍延

平不可缺荆芥蒲黃俱炒黑水煎服時陳酒入不止蘇木熟大

黃塊止前方加減吃

下血不止若何醫泄瀉胸痞脉又虛此屬脾虛不攝血道中益

氣最相宜加入炮姜并芍藥血餘阿膠功最希

上下失血太多氣息幾微命若何寒涼之劑休仍用獨參一

味起沉疴是陽生陰長之法

示吉曰治失血大法其始也熱主流通用清熱滋陰之品佐

以炒黑蒲黃荆介側柏之類蓋血得黑則止也若血出上竅

加以順氣如蘇子破瘀如藕汁降火如童便之類其既也以

致肝脾不能藏攝須用補肝益脾之品切不可仍用寒涼以

傷脾胃血上湧不止用大蒜搗如泥或津調附子末下敷脚

心湧泉穴引火歸原血自歸經如倉卒未便竟以熱湯浸二

失血

失血



足亦驗。若血出下竅新者正治。本湯中便血加兵部便結者。再加玄明粉。瀉血合四苓。此在下者引而竭之也。稍久用升。挺升麻柴胡之類。不止合補肝益脾之藥。無不效矣。雖然亦未嘗盡其變也。予常用消食之品。而治吐血便血。其效若神。蓋人但知脾虛不能攝血。而不知飲食傷脾。亦不能攝血也。其要切右關沉緊者是。予嘗用清肺之劑。而止便血。人但知腸風臟毒熱在下集。殊不知上焦肺熱亦傳于腑而便血也。其要切右寸浮洪或洪數。及血在糞後來者。是人皆以予傳秘方。吁。予方豈秘哉。予不過察三部之中獨大獨小。獨遲獨

數者病也。餘病寔可例推。

古吳 廣濟 示吉仲芳氏述

錫山 隱居道人計廉能元讓氏

天池 自得子毛漢迎方來氏

弟 時行季芳氏

培 蔡舒嵩明韓氏

醫宗說約卷之一 終

失血



汗症  
汗者身之液不止合補肝益脾之藥無不效矣雖然亦  
未嘗盡其變也予常用消食之品而治吐血便血其效若神  
蓋人但知脾虛不能攝血而不知飲食傷脾亦不能攝血也  
其要切右關沉緊者是予常用清肺之劑而止便血人但知  
腸風臘毒熱在下集殊不知上焦肺熱亦傳于脾而使血也  
其要切右寸浮洪或洪數及脈弦者來者是入皆以予傳  
秘傳書錄也翁藏其可同此三部之中獨大獨小獨遲獨

醫宗說約卷之二

古吳自了漢蔣示吉仲芳氏述

錫山禪醉道人計廉能元讓氏

天池自得子毛漢迎方來氏

弟時行季芳氏

壻葉舒嵩明韓氏

汗症

克肖天地名曰人。天地有雨人汗生。久雨之時天地否久汗之  
人病自成。上工治汗須分別。自汗盜汗有二說。寐時汗出覺來



止盜汗陰虛兼火挾動則汗出名自汗陽虛有濕兼氣竭自汗  
補陽并調衛盜汗滋陰降火絕參芪湯治自汗來人參黃芪白  
朮截茯苓當歸兼棗仁白芍熟地牡蠣屑各一錢烏梅一个并其  
陳浮麥大棗煎一貼盜汗當歸六黃湯生熟地黃黃芩當歸  
連栢等分用黃芪倍用水煎方陰陽兩虛自盜汗二方合用又  
何妨泄瀉虛滿食不思芩蓮黃栢定須除加入棗仁并白芍黑  
豆桃奴亦可施汗出不止法如何五倍爲末津調和塗入臍中  
真妙法或用撲粉亦除疴龍骨牡蠣俱爲末白朮糯米麥研過  
周身撲之汗自止莫將厚被蓋身多

示吉日汗症有虛無實調治不難但冬月傷風非桂枝湯  
至于內傷自汗原須補中益氣湯蜜炒升柴少加製附子浮  
小麥麻黃根治之調其中氣使脾上和則濕不上升濕不升  
則君火亦不能自爲汗也

頭痛

頭痛卽非眞頭痛風寒痰火虛氣動古人羌活冲和湯加減服  
之眞有用羌活黃芩及防風蒼朮白芷細辛羌生地甘草引姜  
秦葱頭發汗自然鬆太陽倍羌活症惡風寒少陽柴胡症寒熱口陽  
明石膏乾葛攻日汗發熱不眠頭痛目痛脈微洪太陰腹痛倍蒼朮或有痰身重脈沉緩



少陰倍用細辛功。症足冷氣逆脉來沉細甚加麻黃附子。厥陰頭痛吐痰沫手足厥冷吳萸通緩脉沉。肥人頭痛多濕痰二陳合用木相同。瘦人定是火壅上酒炒黃芩病可冲脉來洪數實火升重劑須知石羔靈脉來無力是虛火牛膝車前引火行。導龍入海法。人參黃芪氣虛用。症懶言倦卧右脉無力合四君子湯。血虛四物酒恒送。肝輕夜重。風熱在上頭痛者天麻蔓荊酒芩共頂巔頭痛加藁本酒炒片芩用亦中大便秘結酒大黃金底抽薪功最重若還真痛指甲青且發夕死誠危恐。

按半升頭痛古法本方中

有秘方用白芷二錢川芎三錢爲末黃牛腦子一個共入瓷器內加酒頓熟和酒食之隨量一醉酒醒痛失矣外用吹鼻法一用關楊花川芎等分爲末一用火硝川芎等分爲末俱妙右痛吹左鼻左痛吹右鼻又隔鹽灸法用一厚紙爲圈約一分厚填鹽其中放太陽穴上用艾火置鹽上灸七炷艾炷如黃豆大圈約錢大可也凡服頭痛藥須乘熱先薰後徐徐嚥下藥力始到又秘方治半升頭痛以致目中生翳者用白鳳仙一株搗爛用火酒一斤浸之露七夜去查飲酒食後服神効。



心痛

心痛雖分九樣論

食風熱冷悸蟲飲症去來痛

皆因胃脘當心疼。痛則不通

多成鬱鬱久因而作熱。蒸大實痛時不可按。按之痛減作虛。因

虻蟲痛止偏能食

面上兼有白斑唇紅時作時止

脉膏須知瘀血成

必平日喜食熱物

饅雜善飢是胃火口吃冷物屬寒疼

或身受寒氣

痰痛吐痰脉沉滑

惡心惡食食傷生加減調中治諸痛。山枝陳皮草寇共蒼朮。桔

梗與兵郎烏藥香附枳

枳殼用半夏姜汁磨木香秘法一匙滴酒

送火甚竹茹姜炒連炮

姜肉杜虛寒中

去山枝

瘀血歸桃五靈脂

痰飲瓜蒌南星弄食積砂仁杏菴菜蟲痛川椒烏梅

加酒大黃通則不痛從來重

用玄明粉三錢亦妙

真心痛時指節青

占旦死誠可痛

示言曰痛無補法勿用參朮得寒則凝不可純用寒涼故古

人用山枝而佐以姜汁也此症大都因有形之物隔礙其氣

而然法宜吐瀉以行其氣宜三因吐法或鵝翎探吐之外治

點眼止疼實為妙法用透明雄黃火硝等分為末加麝香少

許新汲水調點眼內眥精明穴男左女右扶行數步立愈若

在鄉僻藥餌不便竟用鞋底泥化人井花水中攪勻服甚佳

此症痛止切不可飲食食必復痛外蟲痛欲死用老葱根



搗爛取汁香油和服立愈 諸心痛用良姜香附等分炒為末每服二錢酒送下効

腹痛

腹痛之因有幾般食痰瘀血熱蟲寒瀉後痛減知食積痰則脉滑小便難或腹中鈞痛脇下有聲時痛時止是火痛四肢手足心熱脉來數綿綿不止作寒看症面青白或瓜甲唇口皆青脉來遲內有瘀血致腹痛必有常處不移動小便自利大便黑面白唇紅痛不常蟲痛惡心食不用腹中乾痛時作時止天吐瀉目暑來身重腹痛因濕中或兼浮腫手按痛止軟為虛手不可近是實痛主治戊巳調中湯蒼朮陳皮香附光厚朴茯苓并

滑石川芎白芷神麴方木香山枝須炒黑各一錢甘草少許

入痰多半夏及南星食積兵郎共枳實砂仁蘇梗調氣滯易根

寇澤消酒積飲酒人多酒積痛熱甚黃連不可無寒多姜桂原有山去

救赤芍歸尾及桃仁瘀血痛塊加有益肉食停滯查草菓上子

麥芽消麴食冒暑香茹并藿香傷濕木通倍蒼朮手按痛甚便

不通大黃三錢一齊吃按之痛減脉無力白朮白芍補虛則烏

梅川椒治蟲痛川練桂兵同要用臍下大痛治最難人中黑時

病已重

止痛熨法一用炒鹽一升絹包乘熱熨痛處冷則再炒一



用生姜片許。搗爛去汁。取查炒熱。熨痛處。冷則加汁再炒。并治結胸痞氣。一用麩皮炒熱。熨痛處。示吉日鹽性善走力。能軟堅。姜熱味辛。辛能發散。麩皮性熱。熱主流通。故能定痛。加之以炒者。借火力直達于中宮也。大痛時先用此法。痛稍定。辨虛實寒熱用藥。更為切當。

毛公威曰。痛則不通。總宜行氣秘方。桃靈丹治諸痛如神。用桃仁一兩半炒半生。青皮玄胡廣皮靈脂各五錢。沉香圓木香各三錢。乳香沒藥各三錢。共為末。九種心疼。淡醋湯下。絞腸腹痛。淡鹽湯下。食積瘀血痛。酒下。

脇痛

胆無別竅。肝盡陰位。居兩脇。怒為神。忿怒傷肝。主脇痛。風邪痰食。血能成。小柴胡湯加減治。柴胡半夏及黃芩。白芍甘草。青皮用川芎丹皮。次第行引。加姜棗水煎服。青黛胆草熱可增。右脇疼痛。痰流注。右關脈滑或走注有聲。南星白芥白茯苓。左脇痛時合四物。按之有塊。瘀血成。痛處不移。桃仁紅花宜加入。痛甚乳香沒藥。尋右脇有塊。兼飽悶吐酸。噯氣傷食症。右關脈緊盛。麴芽厚朴及兵郎肉食山查草菓。應脇痛口苦并寒熱耳聾嘔吐寒邪。訣胆汁三匙入本湯。神功妙用。無人說。脇痛內熱大便難。沉實有力是。



熱結痛隨利減加大黃瘀血桃仁不可缺脉來微細又如何或  
大無力內傷多本湯須借人參力補中益氣合除病  
示吉日脇為肝膽之區禁用汗吐下三法司命者須知外治  
法內外夾攻自能速効一用白芥子水研敷痛處能消脇中  
痰又兼辛散用吳茱萸研細醋調敷熱主流通又從治  
也一用韭菜一握縛定約寸許切斷成餅放在痛處上用熨  
斗火熨之使韭菜氣入內即愈餅爛再易一枚韭菜氣辛開鬱  
結又能逐瘀用者擇焉

腰痛

先天之本性兩腎位在腰間藏精應房勞過度兩腎虛邪氣客  
之腰痛病腎虛為主有瘀血或濕或痰或鬱熱風寒挫閃總能  
疼益坎湯中加減說山藥山萸熟地黃香附烏藥續斷杜仲  
故紙鹽酒炒丹皮澤瀉砂仁接引用青鹽空心飲尋常腰痛自  
然絕痛之不已腎知母黃柏脉數添或手足心熱而炮姜肉桂  
以爲常屬虛寒濕時見熱能除紅口乾屬熱天陰疼  
脉遲設症足冷無熱不寒濕時見熱能除內桂良姜天陰疼  
痛知濕熱加黃柏蒼白朮控閃板疼難俛仰歸尾桃仁牛膝列  
便結大黃并桂枝赤芍紅花治瘀血內有塊痛日輕夜重尺脉  
浮時定是風天麻防風羌獨活脉來滑疾又各痰腰背重注走



串維南星半夏白茯苓白芷撫弓二木香藥腰痛雖虛禁參芪寒

涼之劑不宜過久痛須加官桂開痛甚不妨加乳沒秘法引經

猪腰子煮湯煎藥功奇特若還大便秘不通酒蒸大黃不可忽

又有腎著若物纏腰冷如帶五千錢每服四水體重如冰小便利白茯苓

各四草水各三煎空心服

示吉日腰為腎府腎坎象也水火並焉水衰則相火旺而腎

熱火虛則陰翳襲而腎寒水火俱衰土乘邪干均令腰痛宜

青娥丸大茴杜仲故子鹽酒炒各一兩熟地二兩胡桃肉四

兩為末蜜丸空心酒下一方用猪腰子一具剖開入青鹽

三錢杜仲末五錢濕紙包裹煨熟空心食之妙

吹鼻點眼治閃腰痛法 一用木香一錢麝香三分為細末

右痛吹左鼻左痛吹右鼻冷病人手上下和之 一用西瓜

皮陰乾為細末點目內皆精明穴立愈

臂痛

手背因何作疼痛經絡血虛風濕中或寒或痰或有傷秘法活

經湯有用蒼白二木共南星防風羌活秦艽動半夏桂枝羌獨

活補血須用弓歸頌經寒漸艾桂枝添或脈遲痰多白芥瀝汁

送症麻木不仁或硬塊白色脈數臂熱酒炒熱身重酸疼蒼倍進濕若



因判閃定爲傷。桃仁紅花靈仙應氣滯香附及姜黃氣虛黃芪  
人參幸<sub>右脉浮</sub>大無力服時食後引生薑臨服陳酒一盃定

止痛法 一用瓦晒熱熨痛處 一用真岐艾四兩揉成綿  
裹痛處二法均熱主流通通則不痛之法

### 背痛

背屬太陽膀胱經。太陽氣鬱痛不行。通氣防風湯可用。葉本差  
活獨活存<sub>各二</sub>防<sub>風川各</sub>弓一錢及<sub>草荆各六</sub>甘蔓<sub>分</sub>生薑爲引水煎成身重  
腰況加防已脉遲附子葉如神二陳合治脉來滑背心一點冷  
如冰<sub>屬痰合</sub>二陳湯勞役過度常常痛十全大補定功成<sub>四君四物加</sub>  
<sub>芪桂姜棗水</sub>

前服或用補  
中益氣湯

痛風 俗名白虎歷節風 古名痛脾

遍身走痛名痛風血虛氣滯風濕攻濕痰流注脉來滑麻痺不  
仁經絡壅上盛爲風脉浮數下盛爲濕脉濡同日間痛甚爲氣  
滯夜間痛甚血虛凶肥白人多痰蒼瘦火從風<sub>湯各</sub>羌活有神功羌  
活蒼朮酒炒<sub>黃</sub>芩當歸白芍半夏<sub>黃</sub>均扶苓香附<sub>草皮</sub>耳陳用木香磨汁  
水姜增上痛防風白芷妙下痛黃柏牛膝尋熱痰瓜蔓并枳實  
竹瀝姜汁臨服入脉滴血虛生地<sub>川</sub>痛甚原須加乳沒發熱柴  
胡不可無臂痛桂枝加有益小便短濇合四苓骨節疼痛靈仙



力

按走注疼痛。古名痛痹。究其故。血虛不榮內。血瘀不養筋。寒勝則凝滯。濕痰則留結。使榮衛滯塞而不通。何怪乎其為痛也。但痛而走注。非寒痰濕血之所能。其惟風之善行者乎。古人定名。良有以也。秘方用桑枝一小升。細切炒香水三升。煎二升。一日不拘時飲。桑枝性平。不冷不熱。可以常服。并能止嗽。消食利便。屢効。

眩暈

頭眩昏暈病何如。如立舟中氣喘時。眼暗生花。身自轉耳聾昏

倒事無知。氣少血虛。痰作病。風寒暑濕亦須知。內經眩暈

木風木主。丹溪痰火兩相持。清暈化痰湯主刺。陳皮半夏

施各一水。白朮川芎羌白芷。各七分。防風枳實胆星支天麻

須酒炒水姜煎。飲病當除。勞役過度自汗重。黃芪人參氣虛用

去羌芷防風。或失血產後是血虛。常歸生地芍藥中。去羌芷防

歸用補中益氣湯。湯脈數黃連并山枝。遲脈炮姜肉桂重。痰多竹瀝及姜汁中濕

身重增蒼朮。或吐逆。項強不仁風脈浮。有汗桂枝白芍的筋寧

掣痛脈浮緊。寒則無汗紫蘇入。冬加麻黃。夏天煩悶暑脈虛。麥冬五

味香薷益。

醫方類聚

卷二 眩暈

十



麻木

麻木如繩縛初放全無痛痒木之狀。總是皮膚不仁濕痰死血木病成。

氣虛麻木方來富開痰活血治木方川芎茯苓當歸陳皮生

地牛芍藥各一白芥桃仁紅花望各八甘草生薑一併煎竹瀝

姜汁臨服放臂上桂枝不可無牛膝靈仙下部蕩南星二木治

濕痰寒壅經絡川烏壯麻症治法又如何益氣行氣功最多補

中益氣湯為主參芪歸木木香香附川芎羌活青皮桂枝加少許

棗姜煎服定除疴茯苓半夏有痰用黃芩羌活秦艽夾風送浮

者身重脉濡蒼木增濕瘦入脉數黃芩連頌連酒炒肥人附子可

引經還須便製少許用

痺症

痺症有五原歸一。骨痺皮痺筋痺脉痺肌痺其原總屬風寒濕風能走注寒

善痛濕多重著脉來流。或浮或緊故有痛以致麻木皮不仁不

能行動但能食舒經湯用好姜黃四兩洗當歸赤芍共白木各

兩半草炙羌活各一海桐皮二為末三錢生薑入盞半水來煎

八分去渣磨入沉香汁

痿症

四肢軟弱名痿症但能飲食行難任五臟五痿出經書。脉痿筋痿



筋。寧。肉。痿。則。渴。骨。痿。腰。膝。獨。取。陽。明。脾。肺。病。陽明脾肺之府皆。由。酒。色。

不。堪。氣。痿。肺。鳴。皮。王。枯。槁。真。氣。傷。清。心。補。腎。病。自。定。參。歸。養。榮。湯用參熟地當歸白茯苓

苓。陳。皮。白。朮。兼。芍。藥。栢。知。故。子。酒。炒。行。牛。膝。杜。仲。姜酒等分用

甘。草。減。半。水。煎。吞。肥。人。有。痰。加。蘆。半。瘦。人。多。火。用。枝。苓。山炒酒若。挾。

瘀。血。脉。清。弱。桃。仁。紅。花。宜。所。增。食。積。妨。礙。亦。成。痿。食。積。條。中。加。

減。論。

示。吉。曰。痺。痿。俱。能。食。而。不。能。行。症。相。同。也。但。痺。多。實。痿。多。虛。

痺。多。寒。痿。多。熱。痺。為。濕。痿。為。濕。熱。苟。不。明。辨。調。治。自。差。其。要。

在。有。痛。無。痛。中。分。有。痛。為。實。痺。不。痛。為。虛。痿。也。此。為。衰。回。

者。辨。至。于。用。藥。又。當。隨。其。所。挾。看。其。所。急。譬。之。痿。症。雖。虛。若。

二。便。秘。結。熱。燥。腸。胃。能。不。用。大。黃。以。潤。之。乎。痺。症。雖。實。若。因。

勞。役。內。傷。賴。言。倦。怠。脉。來。無。力。能。不。用。其。溫。以。補。之。乎。東。垣。

治。痿。以。黃。柏。為。君。黃。芪。等。補。藥。為。佐。而。無。一。定。之。方。蓋。欲。學。

者。隨。其。所。挾。而。用。藥。也。

癰。症。

卒。時。暈。倒。口。流。涎。身。軟。口。噤。咬。牙。關。聲。類。畜。叫。名。癰。症。五。臟。五。

癰。病。自。煩。總。因。痰。火。塞。心。竅。作畜學者譬之笛孔開閉不同祛。

癰。一。陳。功。不。凡。扶。半。甘。陳。犀。角。屑。黃。連。枳。實。沉。香。截。膽。星。遠。志。



醫宗說約 卷二  
及菖蒲竹瀝姜汁臨服設辰砂為末好鎮心開闔牙。阜鉤藤絕示吉。曰癇與瘧相似。但癇則身軟時醒。瘧則身強直反張如弓。發不時醒為異。仲景云。身熱足冷。頸項強急。惡寒時頭熱。面赤。獨頭搖。卒口噤。背反張者。瘧症也。方具傷寒科中。至于雜症成瘧。變症也。大抵屬痰。屬血虛。血虛參歸養榮湯。見瘧症加羌活防風黃芪桂枝。痰用瓜蒌桂枝湯。瓜蒌芍藥甘草。桂枝水姜煎服。瘧症多用桂者。以瘧為肝病。肝木主筋。桂能緩筋而伐肝。所謂木得桂而柔也。若陰瘧成瘧。難治。國陽救急湯加桂枝白朮。友在傷寒科。

### 癲狂

肝實多怒。名曰癲。錯亂妄為。不可言。心熱多喜。狂呼呌。妄言。妄見。是狂。然難經雖有陰陽別。均為熱症。河間說。從來宜瀉。補不宜。在上吐之病。自歇。病在下者微利之。吐瀉後將餘邪徹祛。癲二陳。湯見甚有功。但得寧靜補心血。天王補心是妙方。莫施溫補。病難絕。飲食過度。病復來。枉咎醫家。不先說清心寡慾。并安神恬澹滋味。善調押。傷寒之病。變發狂。節菴方法真奇訣。見傷寒邪祟欺人。詈罵來。承祖灸法第一節。  
治火亢吐法。治心火亢甚。喜笑不休。用食鹽二兩。放刀頭上。



用。火。燒。赤。研。細。入。半。夏。三。錢。竹。葉。一。兩。河。水。二。大。碗。煎。三。四。沸。去。查。待。溫。入。竹。瀝。半。盃。姜。汁。三。匙。頓。服。鵝。翎。探。吐。熱。痰。卽。愈。下。法。治。實。熱。大。便。燥。結。發。狂。用。大。黃。四。兩。酒。浸。一。夜。水。三。升。煎。之。分。三。服。能。食。脉。沉。實。有。力。者。立。愈。

秦承祖灸鬼法 治一切驚狂譫語踰垣上屋罵詈不避親疏等症。以病者兩手大指用細麻繩扎縛定。以大艾炷置于其中兩介甲及兩指角肉四處著火。一處不著卽無效矣。七壯神妙。

治發狂秘方。用好生犀角四兩剉末。每用一兩加清水十碗。

入砂鍋內熬至一碗。濾淨。再加水十碗。熬至二酒盃。竹葉四兩水六碗煎至二碗。去查加犀角汁同服。四劑立愈。婦人產後血迷心包。亦令癲狂。歌唱無時。踰垣上屋。宜加味逍遙散。用當歸白芍白朮茯苓柴胡生地遠志桃仁蘇木紅花甘草水姜煎服。此屬虛症。宜補不宜瀉。故予拈出。一方加辰砂末。

### 驚悸怔忡

驚悸。忽然心惕惕。如人將捕時。驚惑跳動不已。名怔忡。寤寐神魂多恍惚。精神短少。或多痰健忘之病。因而得。皆緣大恐與大



驚觸事喪志心神失治用四物安神湯當歸川芎芍地黃參神  
枝子黃連炒酒木麥冬酸棗竹茹當烏梅炒米引姜棗臨服研入  
辰砂好時跳時止定因痰二陳合用病自了心下悸動是水停  
猪苓澤瀉不可少

### 健忘

心氣不足事多忘有始無終作事訛發言首尾都忘却思慮勞  
傷致病妨天王補心真妙藥川連酒炒二兩生地黃酒洗四兩當歸麥  
冬五味子栢仁棗仁玄參當天冬茯神并桔梗丹參遠志合成  
方各五錢菖蒲一兩共爲末蜜丸送下定驚恍朱砂爲衣臨臥服

引用燈草竹葉湯

每服三錢

肥人脈滑痰迷竅胆星半夏莫煎

### 虛煩不寐

虛煩不寐是何緣心熱膽寒病自兼痰涎沃心誠可怕加味溫  
膽病當痊半夏竹茹陳枳實茯苓甘草棗仁先遠志人參及五  
味熟地姜棗一同煎臨臥服熱在陽明不得睡竹葉石膏勝如仙  
傷寒條內分明說口渴自汗症相全

示吉曰健忘驚悸怔忡虛煩不寐俱屬少陰故多用安神養  
心之品然須察其所挾挾水者合四苓挾痰者合二陳再察  
所因如因勞役過度或病後而來宜補中益氣湯加紅花入



心黃栢滋腎其病自退。若因思慮過度勞傷心脾而來者。宜  
歸脾湯。蓋思傷脾。脾足則神寧意定也。諸症總不宜涼劑。  
瀉脾土瀉伐心火。火微土衰則痰涎日甚而不可為矣。  
歸脾湯治脾經失血發熱盜汗。或思慮傷脾不能攝血以致  
妄行或健忘驚悸。或心脾傷痛嗜寤少食血虛發熱虛煩不  
寐等症。用人參白朮黃芪茯苓當歸遠志棗仁龍眼肉各一  
錢木香炙甘草各五分姜棗煎服。

黃疸

疸雖分五實歸一

黃汗黃疸酒疸穀疸女勞疸丹溪曰不  
必分五種總是濕熱如禽醬麴相似 蓋是

脾虛胃不實水穀濕熱相鬱蒸發黃腸滿溺黃汁有如禽麴遍  
身黃眼珠指甲俱金色欲除濕熱利小便茵陳五苓湯有力茵  
陳澤瀉猪茯苓山枝木通并白朮山查枳實共并陳山枝少許  
兼滑石姜棗燈心河水煎厚朴兵郎消食積身熱柴胡乾葛增  
腹脹腹皮上子入傷酒白寇共葛根浮腫蒼朮應有益口渴腹  
脹大便難加入大黃去白朮。名加味茵陳大黃湯小便自利大便黑按腹  
則痛瘀血積。桃仁承氣湯中加茵陳見傷寒惡心吐酸胸腹滿右關緊盛是傷  
食。從飲食餘中治二者俱宜勝金丹。見鼓食消血去黃自息腹中無病  
能飲食二便如常不苦瀉惟有身痛脉來大煩燥頭疼苦鼻塞



此因寒濕客頭中。瓜蒂搐鼻黃水出。

秘方搐鼻瓜蒂散。用瓜蒂二錢爲細末。再入母丁香一錢。黍米四十九粒。赤小豆五分。再研極細。至夜令病人先含水一口。將藥半字吹入鼻中。待下。或吐去水便睡。至夜半。或次日取下黃水。則愈。若病在遍身者。內服茵陳湯。

示吉曰。疸症在上者吐之。微汗以散之。搐鼻以除之。在下者引而竭之。大便實者下之。必使小便清白爲愈。病之常治之經也。外有瘀者逐之。蟲積者消之。寒者溫之。病之變治之權也。蟲積如吃泥土。米炭發黃。依蟲症條中治之。陰症發黃。四

逆湯加茵陳。詳傷寒條。凡疸散成鼓者危。黃入手足心。渴而熱甚者難治。

驗黃疸生死法。用二指重按胸前臆中穴。二指左右分開。中間有血色者可治。秘方外治。用生姜一斤搗爛。入酸醋一斤和平胃末二兩調勻。遍身塗之。少頃戰慄汗出。內瀉黃水而愈。

### 斑疹

遍身紅點名曰斑。斑無頭粒疹生頭粒又多。疹有頭粒浮小隨出隨沒先紅後赤。人昏憤。脉來洪大。更心煩。熱傷血分。乘虛出。鮮紅稀朗。方爲



吉紫黑稠密定傷生和解辛涼消毒力將出未出升麻湯升麻  
葛根川芎立其草棗姜水煎服再著紅花亦有益已出之後去  
升麻已下加入牛旁玄參知母吃王苓桔梗同犀角加入大青功妙  
極譫語口渴并自汗竹葉石膏粳米的

驗斑疹蚊跡法以紅紙燈焰病人面部胸背四肢有紅  
者斑疹也疹輕斑重先將姜汁噴于斑上隨輕重用藥若病  
人安靜脉不洪大紅點惟在手足且先紅後黃是蚊跡也切  
宜細察

### 濁症

小便去濁名濁症皆因濕熱為之病白者如米泔名白濁赤者

凝如膏糊經曰水赤屬血今白屬氣肥人濕痰膀胱滲清心蓮  
液渾濁皆屬干熱

子用石蓮去壳人參黃芪赤茯苓地骨麥冬及車前黃苓甘草

功相應已下肥人須合二陳湯二木升柴亦莫剽酒炒知柏脉

數深久而不止升柴進清精金櫻并蓮鬚山萸牡蠣真能任瘦

人血虛因而得赤色居多合四物暑天伏暑用清涼香薷扁豆

兼滑石白濁腎虛草薢飲益智菖蒲烏藥等四未等煎成入少

鹽空心煎服功成穩

示吉曰便濁則降火清痰分利精濁則益腎滋陰固脫關要



也。外有肥人多濕痰。清痰是要。瘦人多虛火。降火爲先。老人因虛寒而致。可求溫補。夏月因伏暑而然。法用清涼。是亦丹溪之法。傳于言外也。

淋

心與小腸爲表裏。心火動時相火起。煎熬精液成五淋。血石膏赤瀉不通。痛不已。欲去不去。住又來。淋瀝疼痛。無人理。清心分利。是良方。犀角黃連枝子。擬滑石木通。共車前麥冬赤茯苓草。抵竹葉蓮心燈草煎。還加青黛痛脫體。溺出砂石。名砂淋。石葦瞿麥葵子行血。淋尿血莖中痛。栢葉藕節生地臨。不痛者爲尿血膏濁。

數膏淋症。茯苓白朮半夏真勞倦病發。是勞淋。人參黃芪歸朮。導管有餘。瀝身又冷。是氣朮香兵榔歸澤真。若是氣淋。脉來溜牛膝煎膏病自平。脉數栢知方有效。下着升柴更神靈。脉來無力。參朮用。大便秘結。大黃行。

示吉曰。二濁五淋俱小便去濁也。濁多虛淋多寔。蓋淋痛濁不痛爲異耳。濁淋俱屬熱症。惟其不痛。大約屬濕痰下陷及脫精所致。惟其有痛。大約從淫慾火動。強留敗精而然。治之不可表同。故男子女人五淋帶下。初起小便痛者。用白茯苓黃各一錢五分。百草霜分五共爲末。雞子清調。蒸熟作丸。白湯



下空心服尿白即愈。毛公威傳此方泄瀉者不可用。

小便不通

小便不通有二症。渴在上焦肺熱病不渴方屬小腸來。膀胱實熱通關應渴者須投清肺湯。赤茯苓、麥、澤瀉、當歸、通草、車前、扁蓄、妙木通、瞿麥、飲無妨。琥珀為水引燈草空心一服是仙方。若還  
不渴小便秘通關丸用知柏各一兩、肉桂為末用一錢熟水  
為丸。桐子例空心送下一百丸。頭兩足時藥行易。已上二症是  
大綱投之不利吐之愈。皆因痰塞中上焦。如王漏然上竅塞而下竅  
閉。法煎二陳探吐之久不通時當提氣。勿用巴豆及牽牛大便

秘結八正

散

濟若兼嘔吐名關格。老人鼓脹總不利。

皆死症

示吉曰小便秘日久則未滿而死。急症也。外治法不可不講。  
一用皮硝一合連鬚葱一根同搗用青布攤似膏藥貼臍。  
上熱瓦熨之即通。一用炒鹽熨臍腹。一用麝香半夏為  
末填臍中。上用葱白螺螄二味搗成膏為餅。母臍上用布帛  
縛定。下用皂角燒烟薰入陰中。白通。女人用皂角煎湯洗陰  
戶。若在胎前名曰轉胞。是胎壓轉尿泡不得小便也。宜穩婆  
托法。詳女科。總之右寸關滑實者多煎二陳湯以吐其痰。  
因痰塞上竅以致下竅不通也。右寸關細微無力或浮大無



力是屬氣虛宜獨參湯補氣經云氣化則能出矣若左脉芤  
潛或小腹有痛塊是屬瘀血桃仁牛膝作丸服若大便黑者  
桃仁承氣湯一單方治小便閉脹急垂危者用自已爪甲燒  
灰水調服只取通瀉之意也

大便不通

心肺清肅腎水節津液充足內不熱大便滋潤自調勻若還秘  
結津液竭大腸無血致成災更兼邪熱因而結壯年氣盛可下  
之大小承氣真奇絕湯見傷寒婦人產後及老人久病之後作虛說  
若用巴豆并硝黃暫時取快禍最烈千金潤燥是良方生熟地

黃當歸貼蘇子桃杏共麻仁四味炒枳殼厚朴黃芩列其草燈

心共水煎秘甚還加大黃劫大黃用酒拌蒸晒九次便通即去之腹痛兵郎水香

開氣虛人參郁李來痰火瓜萸并竹瀝風閉羌活牙卓裁一加郁李

仁老人從蓉麥用產婦弓芍紅花該小便多時或自汗津液枯竭

故人參麥味用扶衰

示吉按丹溪曰西北人壯實開結為主東南人氣弱潤燥為  
要然因其地而分不若隨其症而治蓋便結因風寒熱病者  
雖東南雖老弱非用硝黃不可仲景所謂急下法也便結因  
于病後失血產後者雖西北雖年少亦宜滋陰補養丹溪所



謂潤燥法也。變通而治何病不克。至于結在廣腸。導法尤爲捷要。三法附後。一用猪胆二三個。每個傾去少許。仍入醋在內。用蘆管相接縛定。一頭套入谷道。以手撚之。令病人提氣。如忍大便狀。胆汁入內。卽通。蓋酸苦能益陰潤燥也。一用香萊油或麻油。入猪胆中。如上導法。一蜜導法。用白蜜六七兩。煉稠厚黃色。滴水凝硬。再加入鹽五分。皂莢末五分。和勻。急傾入冷水中。捻如指大三四塊。先將香油抹谷道中。後用蜜條放入。卽通。

### 二便閉

肝腎實熱。二便閉。大便行時。小便利。八正散中。用大黃木通滑石。車前。意藟。蓄。瞿。麥。并山枝。甘草。燈心。水煎。例少壯驟病。服如神。老人虛弱。藥所忌。

外治法。一用蝸牛三箇。連壳研如泥。加麝少許。貼臍中。以手按之。立通。一用白螺螄。搗爛。填臍中。亦妙。一用香豉二十粒。連鬚葱一根。勿洗。生姜一塊。食鹽二匙。同研爛。捏餅烘熱。掩臍上。以帛札定。良久氣透。自通。否則再易。秘方。用白蜜半鐘。白湯泡開。入玄明粉三錢。空心服。血熱便秘。用當歸五錢。煎湯調服。玄明粉三錢。並妙。



脫肛

肺與大腸為表裏。肛門閉結肺熱理。肺臟虛寒則脫肛。瀉痢久  
虛下陷起。老人虛弱小兒元氣不足舉氣湯中參與芪等。婦人  
產婦用力過度故有此症。麻五味已。姜棗水煎。空心服。外治好將熱尿洗。鞋底烘熱捺進。  
去再點冰片亦得體。冰片為末瀉泄脫肛去當歸補中益氣甚。  
有禮大便乾。瀉努力來。是為熱脫。清涼擬。門瀉痛黃柏知母。  
匹物湯。枳殼黃芩病自已。

收肛散用熊胆五分。兒茶五分。冰片二分。為細末。乳調抹肛。  
上熱汗下而肛收矣。熱瀉脫肛者佳。并治痔痛。

三消

心熱移肺。名上消。多飲水。漿二便調。或舌上赤裂多飲火熱在  
胃。偏多食。大便硬。分小便赤。各中消。善食而瘦下消。腎熱。渴飲  
湯耳輪。裏乾。便淋瀝。小便淋瀝如膏狀其各雖有三般異。津液  
乾枯血虛。一天花解毒。治三消。花粉麥冬五味。粒葛根生地及  
川連人參。當歸甘草。吃竹葉蘆薈及燈心。徐徐服下。有神力。山  
枝桔梗。治上消。黃芩石羔中消。入黃柏知母。治下消。姜椒辛辣  
不可食。烏梅蓮肉合煎膏。合本方煎膏人乳牛乳。藕梨汁。再加  
白蜜共煎成。不拘時候徐徐吃。此症皆從燥熱來。能食須防發。



毒物不能食者傳中滿鼓脹等病醫宜識

示吉按渴症有三。總歸無水。外有酒毒作渴。非葛花不除。暑邪消渴。非香薷不愈。喜食炙煇。甘肥令渴。豆豉有效。汗吐下後。胃液不足而渴。惟人參有功。青梅止渴。胃乾暴渴。宜加朽木作湯。熱中消中。當飲此梨。甘蔗性水味。甘酒渴鹽傷。俱解病因不同。歌難盡載。從此消息。亦有補也。朽木土中水中者。良方寸者三十枚。煎湯飲。治肥甘炙煇嗜酒。就辛以致消渴者。佳。喜飲酒。灼人真陰。愛海味。喪人真液。皆令消渴。蔗汁梨汁主之。

夢遺

夜精遺失。多因夢。心火旺時。相火動。清心寡慾。是良方。黃連生地當歸。煩石蓮遠志。共人參甘草。扶神酸棗。用不愈。蓮須金櫻膏。臨服食鹽少許送。

滑精

無夢遺精。是滑精。陰虛火旺。水難存。遺精消火并節慾。保精湯用自安寧。芎歸芍地知。柏炒王連枝。子牡蠣。掃沙參。麥冬并山萸。姜灰少許。元精保不愈。辰砂共龍骨。爲末。臨時調服好。一用固真湯。治無夢而遺。用蓮蕊石蓮芡實。束仁遠志。扶神。



天麥冬桔梗重前龍骨等分甘草減半燈心水煎調辰砂末服 此症大法不可用涼藥不可純用滋藥

脚氣

寒熱嘔逆傷寒意脚膝酸軟疼爲異腫濕脚氣實因濕不腫熱

痛乾脚氣麻者因風必無汗走痛者寒拘急腫爲濕氣身重例

筋弛防已飲子總能司木通防已替木蓋計生地木瓜與兵郎

犀角川芎黃柏酒炒味甘草稍頭用水煎內熱葶連倍生地先煎

後腫倍川芎氣傷先腫後痛犀倍記大便秘結加桃仁結甚加

小便澀時牛膝利有痰竹瀝并半夏風盛泰芫羌活易嘔吐喘

急最爲凶脚氣臨心病所忌

示吉日脾氣虛弱胃氣下陷亦令足跗氣腫蓋脾具坤靜之

德而有乾健之運中氣冲和則升降降濁而無病若勞役久

病脾氣致傷土不制水胃中水穀之氣下陷令人跗腫宜補

中益氣湯升舉其下陷之陽浮腫自愈若以牛膝木瓜之類

治之病日甚矣脚氣外治法最妙一用附子末津調塗湧

泉穴一用川椒一兩葱一握生姜三兩打碎水十碗同煎

洗脚寒濕脚氣疼痛不仁俱治一用木通二兩水煎頓服

治足膝腫痛一日後發疹則愈如夾用他藥不效



疝

小腹急痛連睪丸疝氣原來有七般

寒水筋血氣  
孤癰七疝

總為房勞并

辛苦履冰涉水又經寒素問而下皆寒治

丹溪濕熱法方完煖

腎散中

荔枝核  
炒為末

故子杜仲青皮方烏藥香附及兵郎木通

川芎炮姜益川練肉桂并當歸川椒大茴砂仁入等分為末服

五錢空心酒下功難述

示吉按雲林集云腸中走氣作聲或痛者盤腸氣也少腹陰

囊手按作响聲痛者膀胱氣也臍旁一梗升上釣痛也小腸

氣也小腹下注上奔心腹急痛者腎氣也陰子偏大小者偏

墜也陰子雖硬大而不痛者木腎氣也俱因熱鬱于中寒束

于外宜神効湯用大茴延平益智蒼朮香附當歸山枝各一

錢水香吳萸各七分川烏五分砂仁七分甘草三分姜燈心

水煎臨服加酒脹悶而痛加乳香沒藥瘀血脹痛加桃仁紅

花川芎腎氣上冲加沉香枳壳此方亦穩予一日治二疝

一人升上作痛一人墜下作痛俱悶痛欲絕求方于予并上

者予定故子三兩炒黑丑一兩生硫黃七錢俱為末鹽酒打

麪糊為丸鹽酒送下墜下者予定補中益氣湯加杜仲故子

肉桂炮姜香附川芎二人駭曰疝氣同也何方之不同若是



予曰姑試之至明日而皆愈。

諸蟲

濕熱生蟲古所云皆因飲食不調均牛羊菟驚都生積米泥茶炭等生成面色痿黃心腹痛飲食少進肉不生椒梅湯治諸蟲症嘔吐涎沫腹痛甚烏梅用椒及兵郎枳實木香香附應川練砂仁厚朴肉桂炮姜甘草順等分生姜并水煎先食蜜糖菓後進十五已前蟲向上服之即効如律令望後蟲頭向下行先用蜜糖肉汁滲引蟲頭向上然後用藥

按遇仙丹下蟲之藥也小兒最多蟲症急宜修合用白黑丑

頭末一兩兵郎半生半炒一兩山稜蓬木醋炒各五錢

二錢為細末糖拌小兒一錢大人二三錢酌虛實用之糖湯

送下空心服

耳病

耳為腎竅病屬腎腎虛耳聾不能聽少陽胆經絡繞入耳感受

邪氣耳鳴應醇酒厚味動胃火亦致耳鳴紅腫盛右屬陽明左

少陽紅腫流膿風熱病蔓荊散用蔓木通桑皮蜜赤芍升麻定

生地前胡赤茯苓菊花甘草俱等分姜蜜煎成食後服胆草柴

芩左痛進右聾須合地黃丸川當歸芍藥功成峻風熱熾盛脉浮



醫宗金鑑卷之二十一  
風白濁  
洪制芥防芷芎紫靖

按腎虛耳鳴聾者宜地黄丸加川芎芍藥當歸黃柏菖蒲遠志肉或煎或丸俱妙若耳中紅腫疼痛用葱搗汁滴入即愈若耳中流膿予家秘方白龍丹枯白礬一兩飛過東丹二錢半海螵蛸一錢龍骨二分半射香水片各一分為極細末綿紙條撚盡膿水吹入少許即愈若耳後陷中紅腫恐成天疽急用神仙活命飲合小柴胡消之倘成膿則難治慎之

### 目病

目疾主治有專科五輪五臟肝居少

自睛屬肺曰氣輪身珠屬肝曰風輪大小皆屬心口

火輪上下胞屬脾曰肉輪瞳神屬腎曰水輪

目得血養方能視肝經風熱日生疳

赤腫痛眼稍爛迎風出淚怕日過羗活飲子羗防風赤芍白芷

薄川芎甘草陳皮兼枳殼柴胡乾葛亦相通水煎乘熱先薰眼

徐徐服下有神功山枝黃芩內熱用龍胆連翹肝火攻酒蒸大

黃加錢許釜底抽薪妙不窮不能久視昏花暗腎經真水虛弱

秦又宜明目地黄丸熟地飲子金不換熟地當歸麥門冬枸杞

芍藥川芎丹皮羌活與防風菊花燈草真有幹相火旺時加

知柏氣虛人參黃芪入熱甚黃連及黃芩損者益之自有力

洗眼法一用防風荆芥連翹白芷歸尾甘草枳硝白礬胆礬



少許水煎去查乘熱洗 一用古青錢三文黃連三分杏仁  
三粒艾一葉水一盃煎三分去查澄清一夜次日頻頻洗之  
凡患風熱眼眶腫爛者佳  
治雀盲方蒼朮炒爲末羊肝同食卽愈用齋者豈腐同食凡  
晝明夜暗者佳

鼻病

無形之氣通于鼻鼻塞聲重風寒客傷寒傷風在本條胆移熱  
腦鼻淵責俗名腦漏辛夷散能治鼻淵白芷一兩辛夷蒼耳得各二錢半  
荷五分共爲末每服二錢葱湯食食後服喜飲熱酒肺熱傷赤鼻

爲酒查鼻秘方只用連翹仁四兩爲末湯來吃臨臥服三錢鼻孔  
生瘡氣不通香臭莫辨癰肉塞辛夷川芎與防風木通細辛藁  
本的白芷甘草及升麻分等爲末三錢茶調益外用冰片吹鼻中  
內外兼治法有力

一用狗頭骨燒灰加硃砂少許爲細末搐鼻中癰肉自化

口舌病

口屬脾經舌屬心舌和五味自知音肝熱口酸食亦作酸心熱苦內熱  
脾熱口耳疽亦生腎熱口鹹虛則淡寒亦鹹肺熱口辣自生  
成口乾欲飲皆爲熱喜唾停水胃寒侵內傷勞倦淡無味嗽水



不嘔屬寒陰。蓄血症亦喜上焦鬱火口舌碎。或腫無皮神悞悞。

重舌木舌口乾焦。二寸洪數熱為祟。玄參飲子是神方。玄參牛

旁連翹。貴甘草。桔梗共黃芩。黃連生地。枳殼。白芍。薄荷。炒山

枝。燈草。同煎。祛病累。牙肉腫。兼白虎湯。石羔竹葉口酸胆草柴

青類不愈。牛膝及車前。引火下降。如神。謂大便結時。酒大黃加

酒半盃。不可醉。

示吉曰。口舌病屬熱者多。故古人多用本方。然亂世之民。勞

勞則虛。虛則近于寒。故屬寒者亦不少。其症口舌生瘡。脉來

無力。微遲。飲食少思。大便不實。足冷。服涼藥不効者。是也。

命門無火。浮陽上升。宜八味地黄丸。或用官桂。噙之。總之曰。

舌症。若因勞役。致病。房慾無度。或費心憂愁。而來者。須從各

症本條。合玄參。飲細心。加減用之。實熱口碎。用玄明粉煎湯。

噙嗽。甚妙。外治法。舌腫滿口。不能出聲。用蒲黃。摻之。即

効。一用百草霜。錢許。調服。一人無故。舌上出血。仍有小瘡。

炒槐花。為末。摻之。即愈。一熱症多舌出。有病愈而舌不入。

者。冰片一分。冰舌上。即收。有舌腫出口外。以草麻油。蘸紙

作燃燒。烟薰之。隨即消縮。

齒病



木生干土齒生床

床牙肉內骨

床本陽明齒腎庄下床嚼物大腸脉

屬手陽明動而不休

上床不動胃經當

足陽明止而不動

厚味濕熱陽明病牙床

腫痛理所定竹葉石羔是主湯羔竹升麻知母順玄參糯米及

山枝水煎服時痛自應吸風痛甚是為風羗防荆芷辛芩進齒

齦宣露動搖長腎元虛損地黃峻

虛熱六味丸虛寒八味丸

示吉日牙痛多腫口穢臭屬火者多故本方用涼藥而挾風

者兼風治也外有蠅蛀痛寒痛俱宜外治法一用白芷北

細辛各五分肉桂麻黃草烏各三分真蟾酥分半為細末麝

糊九桐子犬每用一丸咬痛牙下即愈一用防風荆芥羌

花蜂房各一錢川椒十粒細辛三分食鹽少許水醋各半磨

嗽口立愈二方風寒蟲痛俱治一用葶藶咬定痛處一

用川椒章冰為末放碗內上用一碗合蓋用紙糊口不使漏

氣下用稻柴火一握其藥即升上矣取下擦痛處神効

咽喉症

咽喉之位司呼吸人身靈籥緊要極忽然腫痛語言難十八種

病不難入主治加味甘桔湯一切實火總皆息其草桔梗共山

枝連翹防風枳殼益黃芩生地并當歸等白芷薄荷減半入燈

草細茶共水煎山豆根木調服吃冬花粉咽乾用發熱柴胡



亦有中痰甚<sup>黃</sup>喘干蕤竹瀝牛旁玄參生瘡動熱極便秘酒大黃  
虛火泛上<sup>黃</sup>知重此藥總宜徐徐服吹藥外治能蠲痛

示言曰咽痛熱多寒少本湯十有九中若因飲食勞倦無根  
虛火上炎脉遲足冷者非其指所司也炤口舌痛浮火上升  
法治之吹藥外治法 一用胆礬爲末吹喉中吐出痰涎便  
愈 一用火硝一兩五錢明雄黃二錢鵬砂五錢僵蠶一錢  
冰片三分爲細末筆蘸藥捲痛處立効 一用胆礬白礬火  
硝片腦山豆根辰砂雞內金等分爲末用鵝毛管吹藥入喉  
卽愈 一用胆礬五分半枯半生熊胆木香各二分爲細末

用香水煎磨井水調和以鵝翎蘸掃患處立消

針法 喉中紅赤用鍼從旁針之血出則愈旁針不犯瘻門  
穴也 一針少商穴穴在患人手大指外邊指甲後一並葉  
許針之出血男左女右取之如危急兩手俱針神効




治之吹藥外治法

一用胆雞為末吹喉中

治檢之出血畏主本本短之味武急兩手肘檢脈條  
穴出二檢少商穴穴患入手大計以數計甲參一並葉  
檢去關中珠衣用雞絲安檢之血出限愈安檢不亦藥  
用香木煎藥其水醋味以蘇陰蘇蘇蘇蘇立當







醫宗說約 三

内閣文庫		
番號	漢	15475
冊數	4	( 3 )
函號	匣	33. 1



A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

Kodak Gray Scale



© Kodak, 2007 TM: Kodak





膏肓說約卷之三

古吳自了漢蔣示吉仲芳氏述

虞山元虛子嚴 燧玄若氏 叅

矢池自得子毛漢迎方來氏

弟 時行卒芳氏 訂

婿葉舒嵩明韓氏

傷寒賦上篇

人生疾苦。莫重傷寒。岐伯陳傳變之經。內經具載。仲景詳方法之治。金匱斯明。補論方。晉王叔和功大。加註釋。宋陳無已功多。



自宋及元。于今爲盛。集大成。王肯堂之輩。摘精要。陶節菴之徒。考古而徵今。博學以說約。欲明其症。先正其名。霜降後爲傷寒。若溫煖則有冬溫之異。春分後爲溫病。倘暴寒則有寒疫之殊。乃問時疫。因四時天令不正。既名熱病。由夏月暑熱方生。濕溫暑暍。宜分類似傷寒。有辨將行三法。明察六經。太陽則發熱惡寒。頭疼脊強。拘急體痛。陽明則頭額日痛。微寒身熱。鼻乾不眠。少陽脇痛耳聾。寒熱嘔而口苦。太陰腹滿自利。尺寸沉而咽乾。少陰之經。舌乾口燥。厥陰之症。煩滿囊拳。日傳一經。七日尋愈。若言兩感。六日再傳。麻黃桂枝與五苓。治太陽無汗自汗及煩

渴。葛根白虎并承氣。療陽明表症裏症與下攻。惟少陽有汗。下之禁。三賴小柴胡以和解。至少陰有下溫補之症。七看脉足。便以收功。脉沉寔有力。便結宜下。脉沉細無力。足冷宜溫補。大陰有或下或溫之方。厥陰有急下急溫之例。兩感之症。日傳二經。冲和靈寶百全一二。浮緊宜汗。須看頭疼發熱惡寒。沉寔宜攻。還須便結。連臍硬痛。足冷而脉沉細。雖面赤煩燥。可溫胸滿而寸滑沉。或懊懣冷厥。必吐煩渴而小便不利。或飲水即吐。或發黃而利水。是求大熱。而錯語呻吟。或乾嘔不眠。或汗渴而寒涼。是用隨症而治。乃爲良醫。治之失時。變症蜂起。失汗則面赤身疼。怫鬱而不知痛處。



因而大煩。失下則口燥咽乾。熱結而津液內消。兼之痛硬不利。小便如狂不除。不吐懊憹鬱悶依舊。吐衄之後。小便利而大便黑。蓄血居多。頭汗已形。小便難而渴飲漿發黃可待。血有桃仁。犀角黃宜茵陳五苓。陰燥陽狂有異。重斑輕疹亦殊。卒口噤而背反張。剛柔二症。作手足冷而便通秘。寒熱二厥。生呃忒噦逆。陶氏之書。陰陽毒從李氏之論。虺厥手足冷。雖有熱而禁用寒。涼狐惑唇口瘡。辨上下而急求湯劑。汗下禁于動氣隨臍之上。下左右而施苓桂。泄于奔豚審氣從小腹冲心而治。過汗患不少。下早變尤多。表症顯惡寒。悞下則結胸。宿氣懊憹之症。作發

汗恐不徹過多。則肉潤肉苛。筋惕之病。與結胸有大小。寒熱水之稱。痞氣惟痞滿不疼痛之辨。大小湯丸任用。姜根熨法尤良。筋肉跳動為亡陽。肉苛者非溫補不愈。循衣摸床為死症。撮空者用升陽以求痊。便結如何。下攻亦可。雜症互見。隨病施方。嘔吐雖屬少陽。寒當溫。食當消。而火當解。呃忒雖為胃病。寒宜熱。痰宜化而秘宜通。瀉利自行。協熱協寒之故。膿血自便。熱傷血之由。喘有表裏。水飲之不同。喘秘而不惡寒者。下之則愈。痛有寒熱。燥屎之不一。重按而痛漸減者。補之則安。頭搖屬風。有痛宜察。心悸停水。氣虛亦然。寒熱為少陽之邪。便秘者可下。潮



熱主陽明之燥。未結者可和。擾亂爲煩。心熱之諦。憤怒爲躁。腎熱之徵。汗下溫涼不同。陰虛陽寔有別。脉遲厥利不能食。反能食者曰除中。下利臍痛引陰。筋食如故者名臟結。二症俱死多眠神復兆向壁臥有陰寒之虞。衄血紅汗名動陰血爲厥竭之禁。不得臥有數種。陽明是其大端。傳經症不止一方導赤乃其最效。膀胱有冷熱之結。咽痛有寒熱之攻。嗽水者血症與陰寒痰癰者風熱及痰飲。小腹脹滿畜血與溺滴宜分。大便不通陽結與陰結。宜審動搖身振。筋骨不榮。驚悸怔忡。氣虛停飲。三物金沸療咳嗽而湯異功同。白虎五苓治口渴而功異法。舌胎分平。

表裏。表則白滑裏生黑黃。體痛介乎陰陽。陽則煩疼。陰如被杖。汗出不止曰漏。大汗後亡陽所生。頭旋眼花曰眩。汗下後陽虛所致。項強爲表症。結胸如痊者宜陷胸。凡頭痛屬三陽。嘔吐涎沫者爲厥陰。痛鬱胃直視非佳兆。瘖瘖不言豈易爲遺尿者有熱有寒。寒則死而熱可治。譫語者有虛有寔。寔則下而虛難醫。舌卷囊縮厥陰亦辨。陰陽手足搐攣汗出又逢風露。曠日持久變症有三。汗吐下後仍不痊。壞病方投。鼈甲飲行住坐臥皆不定。百合須求百合湯。前熱未除復感寒。寒熱往來號溫瘧。如何治療。原用柴胡前症已明。瘥後宜謹發願。豌豆何今日之毒有。



餘錯語昏沉。咎當初之汗不徹。勞復食復。尤可怒。調中鼈甲先。  
害女勞易病。悔誰知。逍遙燒視有驗。浮腫因嫌脾氣弱。水濕不。  
流。喜唾方知胃有寒。津液不納。飲酒必然將病復。虛弱知前汗。  
下傷類傷寒。症有五。治食積于平胃。化痰飲于二陳。補中益氣。  
治虛煩。加減續命。醫脚氣。惟有桃仁承氣。兼治瘀血損傷。再宜。  
商風暑濕多眠。身重風溫可用。葳蕤多汗妄言濕溫。原需木附。  
中暑中暍之症。香薷飲宜投。傷濕風濕之流。羌活湯有效。普濟。  
消毒飲。專療大頭六神。通解方能司。晚發內外有別。男女須分。  
發寒熱而天癸適來。知晝明而夜譫語。服寒涼而經水適斷。防。

蓄血而腹滿。疼胎產之間。毫厘千里。胎前之治安胎。是真四物。  
冲和治太陽。不如慈蘇飲爲穩當。紫蘇大黃下秘結。不如外導。  
法爲萬全。少陽陽明。柴葛雙解。小腹外護。青黛井泥。方見直中  
真寒妊娠患之絕少。附子姜桂炒製用之。不妨溫毒發斑。升翹。  
加于四物。自汗口渴。白虎倍用人參。月滿既生。治法又異。胗脉。  
偏喜沉細。若浮緊反爲不佳。製方切忌寒涼。雖身熱還須禁用。  
欲發表之劑。加羌蘇。慈于黑神。攻大便之方。添酒大黃。于產室。  
剛柔二症。五積入麝。成功口噤。中風聖惠。愈風乃効。喘急參蘇。  
飲。人參蘇木眩暈二四湯。二陳四寒熱宜補。宜消。譫語血虛血。



寔未治雜症丹溪有言勿拘風寒前哲有論大綱細目幸此篇之備陳心要秘傳容後章之再布

傷寒賦下篇

運氣加臨歲時各異六經傳變旦暮不同察色聞聲為先切脉審症莫後觀其形体參決死生青色為寒兼主風痛之候赤色屬熱須防戴陽之虞脾土色黃有晦濕明熱之辨肺金色白主氣虛血脫之災黑色為陰主寒主痛光明潤澤青黑逢之亦可生沉晦天枯紅黃見之亦有死相生者吉相尅者凶分部位而觀成敗靈樞甚詳別死生而論外榮內經明悉望色曰神聞聲

曰聖口出無倫為譫語無稽怒叫號狂言外感有餘出言壯厲且先輕而後重內傷不足語言懶怯且先重而後輕語不接續曰鄭聲無人始言曰獨語鼻塞身重自屬傷風聲啞唇蒼定因孤感口噤攣搐為瘳症鼻鼾語塞是風溫錯語呢喃出言不正胸中汨汨因有水喉中漉漉定為痰症見前篇不必再及脉因未悉次第推求表則浮而裏則沉中為少陽之候遲則寒而數則熱緩為胃氣之和動數大滑浮為陽為熱沉濇弱微弦為陰為寒脉象先分四時順逆方驗陰陽急辨有力無力須知陰症見陽脉者生真陽來復之兆陽症見陰脉者死正氣衰微之機



汗後脉安靜爲痊躁亂者不吉溫後脉漸出爲愈歇止亦凶大小疎數不常定爲死祟病進病退有別症察陰陽尺脉無力而虛汗下宜禁寸口無力而弱吐之則亡六經之脉見於前審形之法陳于後凶者身重如山石吉者身輕如轉丸尋衣摸床肝熱乘肺胃心火手過汗陰虛手足牽引曰風頭重視身曰飢揚手擲足揭去衣被陽可知倦臥神昏引衣自蓋陰爲的鼻爲肺竅忌青黑而紅黃者仕古乃心苗喜紅滑而黑刺者忌中暑則板齒燥脾熱則唇口焦唇口黑青陰寒之故唇口腫赤熱極之徵病愈目皆黃睛黃者發黃之漸病重目直視稍動者痰飲之

結喜陽症之目開惡陰症之目閉心胸滿悶察痞氣而大小結胸小腹脹膨分畜血而大小便秘擬似須別活法宜精太陽有風有寒自汗無汗之故陰症有虛有寔傳經直中之分傷風見寒則汗多脉浮而緊傷寒見風則汗閉脉緩而浮前經未盡而過經表在者併病之例三經不傳而齊病自利者合病之條有頭疼而發熱脉沉太陽脉似少陰而反重無頭疼而脉沉發熱少陰症似太陽而反輕重爲正氣衰微乾姜生附不可緩輕爲表邪浮淺麻黃附子正宜投陰症似陽固多陽症似陰間有脉沉足冷知身熱面赤之症非真重按無根識數大洪浮之脉是



假稀糞傍流而痛硬必非陰寒手足逆冷而乍溫自知反化陽  
狂莫作陰躁蚊跡勿認疹斑發狂重于如狂傳經輕于直中發  
黃有血濕之辨傷寒有內外之名夾氣夾痰幸節菴獨究內傷  
外感按東垣始明勞力傷寒似虛煩夾食傷寒兼食積從脉不  
從症莫疑從症不從脉當曉識病于未來世人方羨斷死生于  
現在神鬼來通鼻孔燥乾欲飲水者衄之兆頭上汗出小便難  
者黃之基腹痛為自利之先鋒自利而痛者恐白膿之下惡心  
為嘔吐之鄉導不食而饑者防虵厥之憂心慄為正不勝邪倦  
臥而漸成寒逆身戰為邪不勝正汗出而預報安痊心動為慄身大動為

若身微動為振振為正氣虛寒

足冷耳聾咳嘔悶煩汗下不解斑將至妄語

悲莫煩燥少臥神志不寧狂欲興痞積于腹中動氣之本氣動  
于臍下奔豚之原小便利者瀉將痊汗自出者便必硬微浮緩  
而不嘔清便自安肌表熱而大煩作汗必解邪氣欲傳脉緊盛  
未來之病循經可推邪氣不傳脉靜和病愈之期屈指可算未  
知死症焉將全生陰陽毒過七朝兩感傷寒六日黑斑不治厥  
竭須亡陰陽交及摸華衣唇吻青兮面顴黑舌卷囊自縮何堪  
耳聾遺尿并失尿更添昏亂欬逆不已汗喘不休結胸症具兼  
煩燥臟結亦死陰陽易病女勞復吐舌真凶二陽合病忌弦長



汗後脉疾名臟厥。重暍除中。口張目陷。如此之流。天命何咎。若欲奪命千萬一求全之毀常來。必須審症于再三。百中之發有望。

說約歌

示吉日傷寒主方。陶節菴先生提綱舉領。其集四十。可謂約之極矣。胞與堂編成歌括。以便學者。豈非先得吾心者乎。予更採名家之秘。并獨得之法。增補于後。同志者庶無遺珠憾也。

太陽經

足太陽膀胱經起于目內眦。從頭下後。項連風府。行身之背。

症不同。方各異。四時傷寒各有例。惟有冬月正傷寒。不與春夏秋同治。發表實表兩妙方。用在三冬無別制。正傷寒正傷風。表虛表實不相同。表虛自汗脉浮緩。疎邪實表有神功。表實無汗脉浮緊。升麻發表自然鬆。背惡寒身發熱。頭疼脊強無休歇。俱屬太陽膀胱經。有汗無汗須分別。有汗表虛脉浮緩。無汗表實浮緊列。

正傷寒

霜降後春分前。天令嚴寒。萬類深藏。觸犯其氣。而即病者。名正傷寒。頭疼發熱。惡寒。項脊強。無汗脉浮。

紫

升麻發表

湯各卽麻黃湯加味

枝

桂麻黃升

芷川芎

甘草

羌活

防

杏

共

咀

槌法

升麻發表

湯各卽麻黃湯加味

枝

桂麻黃升

芷川芎

甘草

羌活

防

杏

共

咀

槌法

升麻發表

湯各卽麻黃湯加味

枝

桂麻黃升

芷川芎

甘草

羌活

防

杏

共

咀

槌法



妙。豈乾豉加一撮引葱姜。寒熱頭疼無汗喘去升加葛是奇方。發

熱惡寒身體痛除杏加芍紫又加蒼身痒面赤小便數減去芷白杏

加柴芍頭悶寒熱胸飽悶枳壳桔梗加按證服之無汗病難痊

汗多又恐生別病。

示言按經曰陽之活以天地之雨名之。病人得汗熱除猶天

氣鬱熱一雨而涼也。凡服此劑外用厚被蓋覆其身及手足

取汗。汗出不可驟動待汗乾方可揭開。凡口苦舌乾或吐衄

亡血或淋瀝瀉痢或臍旁動氣或風溫濕溫中暑或瘡痛或

產後或經水適來適斷或陰虛勞倦或尺脉微弱並不可汗。

俱禁此湯。服此湯復熱脉燥亂者死。汗出不至足者死。

正傷風冬月嚴寒水冰地凍傷風卽病自汗者名正傷風

碎和實表湯桂枝芍藥羌活防白朮同甘草姜三和棗二膠飴

二匙共煎濃亮梗加之柴杏能消喘止汗黃芪腴理封飽悶還須

添枳桔玄機能有幾人通。

服此藥後進熱米湯一碗以助藥力。溫覆一時。遍身微汗者

佳。切忌如水流漓反生別病。一服病瘥不必煎查。盡劑病猶

在。再作服。蓋欲中病卽止也。凡小便數者善飲酒者及春夏

秋傷風俱忌此湯。



春夏秋三時感冒

春夏秋另有方。通用羌活沖和湯。春溫夏熱秋治濕。隨時加減。妙難量。病症與冬皆相似。淺深表裏。脉中詳。脉有浮。脉有沉。半浮半沉。表裏尋。有力無力。辯虛實。或溫或寒。細酌斟。更有汗吐下三法。隨宜施設。莫沉吟。脉浮為表。脉沉為裏。症有力為實。宜寒。症無力為虛。宜溫。此傷寒感冒。大概治法。羌活沖和羌防風。其芩蒼芷地。芫芩姜棗。槌加葱。擣汁。三時發汗。自然鬆。心胸飽悶。除生地。宜加枳桔。定寬中。石膏知夏用名神木。湯不能發汗。紫蘇攻寒熱。喘加柴胡。杏汗後不解。大黃通惡心。半夏并姜汁。夾食砂仁厚朴同。去生地黃。三

時自汗。脉浮緩。寒熱頭痛。即傷風。實表去蒼。加白朮黃芪。止汗。

却收功。自汗去葱。此名加減沖和劑。雜症還當一歸空。自汗不止用。

桂芍小柴。合用是良工。

此湯治春夏秋。不分有汗無汗。太陽症在者。用此解利。可代。

麻黃桂枝青龍各半等湯。元氣本虛及勞力冒寒。傷寒見風。

傷風見寒。用之皆効。

陽明症。陽明經起于鼻。絡于目。循于面。行身之前。其症微惡寒。頭額目痛。鼻乾不眠。

陽明症。不得眠。鼻乾目痛。病之緣。惡寒身熱。微洪脉。此係陽明。

胃經傳。柴葛解肌湯。一服。即葛根湯加味。猶如渴極飲甘泉。解肌湯。







少陽症

起于目銳眥上頭角絡耳中循胸脇行身之側

少陽症。嘔而苦。耳聾。胸脇多痛。楚。脉來弦數。胆之經。本經切禁。

汗下吐病在半表半裏間。柴胡雙解飲方妥。小柴胡湯加減 雙解飲

用甘參陳乾葛柴胡半夏王加入棗姜棰法妙。艾汁三匙。藥更

神。嘔吐竹茹姜棰汁。小水不利。茯苓入脇痛。青皮應速增。痰

加貝母瓜蒌實。寒熱似瘧。桂枝用。渴人天花知母共。嗽加五味

金沸草口齒無津。石羔重。心胸飽悶。未經行。非是結胸。理自

明。表邪至胸未入腑。只用小柴枯枳增不効。陷胸加枳桔。小陷胸湯

瓜蒌川連 合用柴胡功最靈。壞症本方加龍甲。虛煩竹葉

妙。粳精本經病與陽明合。芍藥葛根二味新。熱入血室。歸紅

者。男加生地。更調停。老婦傷寒無表症。熱甚硝黃酌量增。

按傷寒汗吐下後。仍不瘥。名曰壞症。前熱未除。復感寒。

熱似瘧。名溫瘧。本湯加桂枝芍藥。寒多倍桂。熱多倍芍。女

人傷寒。經水適來。適斷。晝則明了。夜則譫語。如見鬼狀。名曰

熱入血室。

太陰症。如于足大指上行至腹絡于咽連舌本循身之前

太陰症。脉俱沉。病形一一要詳論。沉而有力宜當下。沉而無力

又宜溫。陰症有二。若初起頭疼發熱。後變便秘結煩渴。脉沉有力。是陽經泄邪。傳入陰經之陰症。宜下之。若初起無熱。不

是陽經泄邪。傳入陰經之陰症。宜下之。若初起無熱。不



渴就便溺寒自利足冷脉沉無力是口渴咽乾腹滿痛桂枝大

黃湯可用身目發黃頭汗出茵陳將軍湯最重無熱自利臟寒

甚加味理中湯是聖太陰寒症勢沉沉回陽救急湯為正

治腹滿痛咽乾渴手足溫便結脉沉有力

桂枝大黃

湯名

枝并赤胡枳

桂枝芍藥實大黃姜棗着腹滿而喘不惡寒加入

腹皮去甘酌板郎磨水入三匙熱服須臾病可却

治頭汗腹滿小便濇大便秘發渴脉沉實身目發黃

茵陳將軍

湯名

陳

黃厚山大

茵陳實苓朴枝黃甘草入推法燈心三片姜太陰

頭汗此湯的大便自利去朴黃加入滑連腹皮益

治自利不渴手足溫身無熱脉沉無力

附吐

奔豚

嘔逆

動氣

加味理中

湯名

參最尊炮姜肉桂茯苓陳白朮甘草同姜棗一匙

壁土入湯吞食即吐訖餓不食川椒烏梅細辛吃

去甘草

便實

大黃蜜少加腹滿時減去甘得利後身疼附急溫嘔加半夏香

姜汁自利腹疼更有方木香姜汁磨勻入動氣奔豚白朮除甘

爛水煎原有力呃忒丁香并柿蒂熟附沉香磨汁食

治直中陰經真寒症無熱不渴便惡寒四肢厥冷戰慄腹疼

吐瀉手足甲青唇青或舌捲囊縮脉沉無力或至無脉

回陽救急桂人參熟附炮姜共茯苓五味陳皮甘草半姜煎入



膈逐寒凝嘔吐涎沫小腹痛鹽炒吳萸妙入神無脉應加猪胆  
汁吐加姜汁藥方行

少陰經

始于足心上行貫脊循喉絡舌本下注心膈行身之前

少陰症脉亦沉有力無力分下溫舌乾口燥腎水涸或利清水  
心硬疼腹脹達臍土勝水六一順氣有方在不瀉惡寒身厥冷  
腹疼吐瀉病沉沉此是陰寒深入裏回陽救急須尋

厥陰經

始于足大指上環陰器抵小腹循臍上口唇

厥陰症脉又沉溫下同前一様論舌捲囊縮并消渴四肢厥冷  
乍還溫煩滿便實多屬熱六一順氣可旋吞口吐涎沫四肢冷  
嘔逆不渴腹痛梗此是厥陰具寒症回陽救急湯已整少陰厥  
陰治略同二湯用去人能省

兩感症

兩感症日雙傳一日太陽少陰連腎與膀胱沉洪脉口乾頭痛  
熱寒兼二日陽明與太陰沉長之脉胃脾經目痛鼻乾腹自滿  
大便自利不安寧三日少陽厥陰聯肝膽之脉見沉弦耳聾脇  
痛囊卷縮古人不治命由天幸節菴訂妙方不論陰陽兩感傷  
設立中和靈寶飲胡活自乾細川一服兩感雪加湯

中和靈寶飲柴羌胡活自乾細川芷蒿辛芳生地防其草羔苓醫兩感煨姜黑



豈索神方更明表裏多少病。治分先後細推詳。表病多而裏病微。麻黃葛根湯最奇。表緩裏急先攻裏。六一順氣不須疑。麻黃葛根湯治表葛麻黃芍藥。乾白芷。黃芩。大黃。一順氣方見上將來攻裏不重提。

發熱下利身疼痛。脈來沉細。兼無陰寒中。不渴。噤臥又昏沉。回陽救急溫經用。治分表裏辨寒熱。節菴權變人欽重。

真寒症。直中陰經

直中陰為真寒。面如刀刮吐瀉難。口鼻出氣如冰冷。脈來遲緩是其端。手足指甲皆青色。舌捲囊縮做一團。針用葱白熨臍法。

內服回陽救急安

逆結症。即熱結膀胱太陽傳裏症木痢煩渴小水不利

小腹滿溺秘結或短或赤口枯渴。惟有秘方導赤湯。下集黃熱。

憑斯洩。導赤白朮澤瀉。滑其桂枝。茯苓。山枝仁。入鹽二字依槌。

法。黃引燈心二十莖。燈草木通消水結。引飲過多胸身目黃者

入茵陳。小便不利兼頭汗陽脫之故發黃因。

熱結症

熱結症醫須別下利清水身又熱。謔語發渴和裏傳。心下硬痛無休歇。此因熱邪傳裏胃中燥屎結實此非內寒而利乃自飲湯藥傷流清黃急下之無熱六一順氣



通有熱黃龍湯一貼。黃龍枳實共硝黃厚朴當歸甘草當人參。枯梗引姜棗棗加鉄銹水調湯體虛人老芒硝去還須熱服。病無妨。有熱表虛也故用人參。

三陽合病

三陽合必自利。莫作傍流清糞例。利下黃赤協熱來腸垢臍熱。治有異。古人法用黃芩湯。全生集載因有意。黃芩湯用芍黃連甘草藥水來煎。發熱柴胡瀉白朮腹痛芍藥炒來添小便。赤色茯苓用嘔痰半橘得安然。太陽頭痛加羌活。陽明乾葛不得眠。少陽脇痛柴胡。療斑爛青蠶飲相兼。溫熱時疫多此症。即

卷原議小胡先

按三陽合病必自利。固非陰寒。又非熱結。不可誤溫。誤下只宜本方合小柴胡湯治之。此症淺近。故殺車槌未收此方耳。予看溫熱時疫。此症多兼發斑。譫語喘急發渴煩燥胸滿等症。皆以本方加減治之。俱愈。莫以淺近而忽之。

挾血症

不惡寒頭不疼。知病不從太陽經入也。身熱發渴。語無倫。小便通利。大便黑。或投涼劑。命難存。血鬱心脾。如見鬼。當歸活血是生門。當歸活。血歸甘草。參地桃紅。柴枳。芍炮姜。肉桂。引生。姜入酒三匙。



乾肉  
拾法著姜桂桃紅三服除加入木苓調補藥。

按此方治內傷瘀血類傷寒也。古人類傷寒惟四症節菴增瘀血而為五補古人之未備。

鼻衄症

鼻衄血久不止熱甚偏血乃如此內脹生地苓連湯舂於鼻上搭水紙再用炒黑山枝末吹入鼻中熱毒入深致吐血亦當急用此湯便生地苓連連結枝柴芩地芍甘施犀角大棗磨京墨茅汁藕汁磨墨知韭汁磨墨調服亦可如無犀角以升麻代之若還吐血去桔梗阿膠加入妙無如錯語失神因失血指空閉目亦能除。

瘀血症

治熱傳入裏上焦瘀血

瘀血症上焦熱煩燥嗽水不下噎熱極又恐血妄行犀角地黃湯最切。加味犀角地黃湯地犀丹草歸陳桔紅花芍藥引生姜棧法取汁用藕節韭萊汁亦可

蓄血症

熱傳裏有蓄血其人如狂膀胱結譫語燥渴身目黃小腹硬滿兼痛絕小便自利大便黑桃仁承氣從來設。桃仁承氣飲硝黃桂實青柴茸芍當桃仁姜引除瘀血三匙蘇木汁神方血不去時加水蛭蟲同用病無妨。脈沉有力者用



發斑症

身似硃眼如火發斑狂叫無人我鼻集面赤汗不乾三黃石膏湯最妥  
石黃山黃黃三黃羌活枝連芩淡豉麻黃姜棗尋槌法細茶加一撮更入辰砂末自靈六脉洪數并燥渴三集表裏熱驅平

斑爛

斑既出休發汗重如錦紋神氣亂血熱不散乘虛出消斑青黛金不換病初汗下兩失時誤投熱藥成斯患  
王參消斑青黛飲柴連甘草人參知母玄生地羌枝犀角黛來姜爲引水同煎一匙苦酒槌調服便實除參黃要兼加大黃

陽毒症

陽熱極發斑黃目赤口渴自煩狂便閉舌捲囊更縮脉數三黃巨勝湯  
王王山王三黃巨勝湯六黃芩連枝栢石羌芒姜棗同煎槌法妙泥漿和服是神方

陰陽毒症

陰陽毒更有方陽毒面赤如錦粧咽喉疼痛并吐血陰毒面目青色當咽痛通身如被杖俱過七日定然亡五日可治用何藥仲景升麻鼈甲湯  
黃川升麻鼈甲用升麻鼈甲雄黃甘草歸蜀椒煎頭服陰毒除去雄椒差



示吉按先師李士林曰。仲景所謂毒者。感天地惡毒之異氣。入于陽經爲陽毒。入于陰經爲陰毒。故其立方。但用解毒之品。未嘗以桂附治陰。硝黃治陽也。在陽毒反投蜀椒者。椒木解毒之品。從其類而治之。陰毒反去蜀椒者。以升麻。鼈甲。既屬寒涼。又覺蜀椒爲贅矣。後世名家遂以陽毒爲熱極而用寒涼。陰毒爲寒極而用溫熱。殊不知仲景療陽症。狀極其熱。而藥極其寒。療陰症。狀極其寒。而藥極其熱。已無餘蘊。又何必別出名色乎。按此症過五日不治。極爲重病。李氏發前人所未發。活人多矣。因憶昔年人多吐血而暴亡者。醫終不識其何症。豈爲不善讀書者悞耶。

陽厥症

陽厥症。指尖溫。心煩便秘。語無倫。脈來沉細。并有力。六一順氣可煎吞。

陰厥症

陰厥症。透身寒。二便自利。心不煩。唇指帶青。身戰慄。蹠臥腹痛。口流涎。脈來沉細。兼無力。回陽救急病能安。手足溫利。無別症。加味理中湯是聖。嘔涎腹痛。鹽炒黃。無脈。一匙猪膽。進嘔吐不止。加姜汁。泄瀉黃。芪升麻。勝。



二症

剛柔症屬膀胱口禁如癰身反張手足攣搐頭面赤頭搖不定  
項又強無汗惡寒名剛症有汗不寒柔症詳二症俱宜如聖飲  
只依此法最為良如聖飲風活白葉草夏防羌芷芍當歸甘草胡王芒硝黃芩歸身黃芩柴芩  
其劑引生姜槌法竹。瘳姜汁着柔症桂水定宜增剛症麻蒼方  
的確便實口噤又咬牙急用將軍糞自落。

按症與癰相似而雜症成瘳多虛多痰治法與傷寒異詳辨  
于癰症條中

陰格陽症

陰格陽難辨詳陰極發燥面戴陽欲赴井中脉無力急服回陽  
反本湯。回陽反本用炮姜甘草麥冬五味良陳皮人參熟附  
子臘茶葱葉七莖黃五匙黃蜂蜜連少許冷服更入泥水漿無脉  
再加猪膽汁嘔加姜牛病無殃。

如狂症

初得病原無熱狂言煩燥不安貼熱結膀胱如狂症若還誤下  
命當絕。太陽本病自經傳桂苓飲是神仙訣。桂苓飲是猪苓  
澤木桂紫蘇草母黃甘知栢山枝滑石共生姜服之微汗真奇特。

按此方與逆結症相等節菴另出名目者以逆結從太陽經



傳裏熱結膀胱。故云。溺閉結口渴。如狂症。因邪熱直入膀胱。而為病。故云。初起表無熱如狂。均用利水藥也。然逆結治水為急。故用五苓加山枝滑石。如狂治熱為先。故更用知柏以治下焦蓄熱也。同經異病。方似法殊。用者細心思焉。胞與堂復增紫蘇。亦取微汗之意也。

### 過汗口渴症

身熱渴汗不鬆。經汗愈渴。脉微洪。陽明裏熱消津液全賴如神白虎功。本方已見陽明症。心煩須用竹茹。攻背寒去枝人花粉。無汗斯湯切莫逢。

### 亡陽症

亡陽症。因汗多。頭眩振振病不和。肉潤筋惕。虛之極。溫經益元。莫蹉蛇。溫經益元。參芍歸地黃。甘草附子。須煨白朮。扶苓同肉桂。棗美糯米法依槌。飽悶地除加枳殼。瘦人去芍法真垂有熱。即當除附子。自利不止。米升追。更加壁土。除歸地。止痢神功在補脾。姜炒半夏能除嘔。渴用天花法更希。汗後惡風表虛甚。除去桂附地黃奇。加入桂枝膠。館效衛虛亡陽汗可醫。

### 無陽症

無陽症。細詳定。頭疼發熱惡寒甚。不能作汗。係陽虛。愚蒙又不



辨時令。妄用麻黃必害人。再造飲治須更定。草白肉黃再造茸芍桂芪  
參熟附活風川防芎細辛其有煨姜三片和棗二枚加重冬月不便氣和勻。夏天  
附子細辛去。加入其有苓冬月不知母必加靈必加

### 戴陽症

身微熱。頭不疼。無寒不煩。面赤。躁悶。飲水不入口。虛火炎炎。  
勢若焚。只因汗下傷元氣。慎投涼劑必死益元湯服必安寧。益元參  
附味乾姜子五甘草冬芍藥冬強黃冬連冬茯苓冬并知母冬生薑冬大棗冬水煎  
嘗三匙童便冬葱白冬二枚冬法冬頓冬服冬為良。

### 撮空症

撮空症仔細詳。休投風劑把人傷。叉手當胸言語亂。昏憤循衣  
弄機床。只因肝熱來乘肺。升陽散火即安康。升陽散火白當芍歸  
參冬甘草冬神柴胡白王木冬苓冬陳皮冬麥冬冬姜冬東冬入冬水煎冬槌法冬者冬真金冬痰加  
姜汁炒冬半冬夏冬洩瀉冬升冬麻炒冬木冬靈冬天冬便冬濕冬實冬諸語冬渴冬流通冬必定用  
將軍。

### 懊懣症

懊懣症屬虛煩。心中鬱悶不舒散。反復顛倒無眠睡。懊懣懊懣  
病非凡。皆緣懊下陽邪陷。枝子豉湯探吐安。枝子豉湯枝子  
豉。先煎枝子後豆豉。服後得吐心中暢。不吐再服不可遲。下後



心煩并腹滿。再添朴實。又何辭氣少。原加炙甘草。嘔吐姜汁是所司。

按表症。誤下。陽邪陷于心胸之間。輕則懊憹。重則結胸。痞氣。總之心中不安。欲吐不吐者。本方吐之。或以手探吐。

下膿血。

身發熱。痢膿血。莫作陰寒漏底說。溫熱積中成下痢。王連阿膠湯可絕。王連阿膠。芳當歸。白芍。生地。烏梅。隨甘草。地榆。水煎服。京墨磨汁。病可追身熱。柴胡。渴乾。葛。脉弱。人參。白朮。推示吉曰。陰寒腹痛。病後必下膿血。須服桃花湯。用赤石脂炒。

粳米。炮姜。水姜煎服。昔年毛方來兄。忽患真寒症。腹痛自汗。四肢厥冷。脉絕。諸醫束手。予用回陽急救。而痊于時。吳石虹尚在曰。此症暫愈。後必下膿血。則危矣。數月後。果下痢如魚腦。全無臭氣。投之參附。則不應。忽思三物桃花湯。仲景豈欺我哉。以三物為丸。與之三四服。愈矣。

虻厥。

虻厥症。手足冷。誤投涼劑。人必損食。即吐。虻不食。饑雖有熱症。寒不穩。椒梅。安虻理中湯。酸苦辛。辣。虻自隱。思甘草研物。蓋虻靜見苦則安。得辛。安虻理中湯。參。朮。烏梅。川椒。炮姜。入白茯苓。諫則頭伏于下。



姜用水煎手足冷甚附子益嘔加半夏及陳皮臨服更加生薑汁虬吐不止苦練根黃連細辛亦相得大便秘結加大黃但得微利人安逸

狐惑

狐惑症是蟲病。狐蟲食肛下唇瘡。兼聲上唇有瘡或蟲應。乾是蟲食共臍面色乍白乍黑赤惡聞食氣眠默默舌白齒晦甚緩人黃連犀角湯為的。黃連犀角其烏梅加入苦參水煎食。桃仁槐子連艾葉并治匿症齒色黑。

越經症

睡夢中忽言語無病昏昏神不主湯粥與之隨口吞形如酒醉多不舉心火尅金越經症導赤各半湯急取導赤各半茯神參滑石黃連枝草麥冬知母同犀角。棗姜槌法入燈心。

食積症

食積症類傷寒發熱惡寒頭痛難惡心嘔吐身無痛。加減調中飲可參元元欲吐同霍亂探吐之法即能安。皮厚草蒼調中陳朴并二朮。白薑棗山查麴枳實黃連乾姜引用姜木香磨汁消其積。腹中疼痛加桃仁熱結大黃能蕩滌減去白朮并山查草朮乾姜亦無益胸中飽悶加枳殼莫用甘草及白朮。霍亂須將阜末



五分鹽和水一碗探吐為良策

脚氣症

脚氣症類傷寒。頭疼惡寒身熱攻脚膝軟疼難轉動嘔逆身痛。便不通暑中三陽患必熱寒中三陰患冷同風浮濕弱脉中辨。補劑淋洗禁不用病起脚膝名脚氣加減續命湯係安加減續命羌防芍麻桂甘草二朮着防已燈心二十莖東姜汁依槌法脉數去桂與麻黃杏仁相柴胡熱可却寒中脉遲加附子牛膝木瓜濕脉弱風浮加獨虛加參便秘大黃立能謬。

挾痰症

挾痰症類傷寒。身熱昏迷頭又眩涎出口中氣上喘七情內病之緣。神出舍空言語亂加味導痰湯可痊。加味導痰湯牛膝甘草實梗陳耳葉枳桔茯苓白朮南星姜棗引竹瀝姜汁入和吞痰飲似崇功誠妙年壯氣盛吐法行。

勞力感寒症

虛煩症類傷寒。莫與傷寒一例看。頭疼寒熱口微渴兩腿酸疼舉步難澌澌汗出身作痛浮虛無力脉中看。若悞汗之輕變重。切記臨時仔細觀氣血內傷寒外感調榮養衛是神丹。調榮養衛參芪定生地芳陳白朮並柴辛甘草歸羌防槌法入荊姜。



榮應元氣不足略加升口渴天花知母進煩熱竹茹與山枝喘  
 嗽去辛還用杏汗多桂芍減升辛乾嘔姜汁半夏正減去地甘  
 少莖果飽悶消除枳桔勝咳嗽辛防宜減之瓜萆貝母消痰盛  
 腹中痛疼去莖木乾姜芍藥方投證血鬱內疼大便黑桃仁紅  
 花滌其病減莖芍木防莖辛痛甚大黃瘀血盡

色復症

病新瘥思淫慾男女私交將病復陰陽易症最難醫補末逍遙  
 宜用速逍遙人參及黃連韭根犀角地黃兼滑石柴胡猥鼠  
 箕耳草竹茹知母全姜三棗二水煎用硃礬燒灰錢半重和服

再加童便良小便利愈陰頭腫視補用近陰處一塊男用女視女用男視腹痛震  
 竹茹添有粘汗出方為中無熱脉虛足又冷知連知滑不須  
 用再去地黃并犀角加入桂附肉子白當歸送少加水通以引經陰寒  
 之症誠能動

按傷寒瘥後血氣未平犯色慾而病復者各女勞復若因淫  
 慾之後無病人反得病者名陰陽易在男子則陰腫入小腹  
 刺痛在婦人則裏急連腰膝重引腹內痛大熱昏沉錯語失  
 神眼中生花百節解散熱氣冲胸欲死此湯並治節菴口額  
 黑身黃者難治舌出數寸者死



百合瘵後昏沉錯語勞復食復等症

勞復症及百合新瘵勞傷血氣弱熱纏經絡更昏沉錯語少神

煩熱渴新病瘵食復症脾虛氣弱不能勝重則吐下輕則消

柴胡百合總宜任柴胡百合合人參知母柴芩其地陳茯苓

棗姜槌鼈甲煎來溫服効如神天花粉用能除渴胸中煩熱

用枝仁頭若微疼羌弓入飽悶須加枳桔勾嘔宜半夏姜汁炒

食復黃連枳實平便實大黃除燥結虛煩竹葉竹茹清黃連乾

嘔不眠頻錯語黃連犀角病安寧麻黃杏仁咳喘用虛汗黃芪

臍理凝心中驚悸為血少扶神遠志當歸好脾倦必須增白朮

腹如雷鳴噎噎姜討水停心下加猪苓勞熱鼈甲醋炙我時熱不

除勞復症葶藶烏梅艾汁

晚發症

三月間晚發病時行寒疫身痛甚頭疼身熱并惡寒口渴無汗

病不順脈來有力兼浮緊羌活中和投不應槌法六神通解湯

人壯氣實須臾定六神通解石羔芩滑石麻黃耳草辛蒼朮

羌芩和豆豉姜葱熱服汗周身頭疼惡寒症皆罷反怕熱時

使不行大渴大熱并譫語大黃枳實柴胡增除去麻黃并蒼朮

槌法兵榔磨水吞臨服兵榔水調和服



大頭傷寒

大頭病是天行發熱惡寒頭痛疼一服黃黃苓連消毒飲胡連壳梗活風芥白。黃黃。煎干草。痰火喉閉  
悉安寧。苓連消毒飲胡連壳梗活風芥白。黃黃。煎干草。柴翹枳桔防荊芷饒人常苓連芳射其牛  
旁竹瀝生。姜汁共調大。黃先利一二次。後服參歸毒自消。

黃耳傷寒

黃耳病類傷寒耳中策策痛不安惡寒發熱風入腎脊強背直  
如瘕般如瘕。荆防敗毒誠有効補天石載病情探荆防敗毒荆防外風  
羌獨活如胡柴前如胡草方川如胡芎如胡桔梗如胡茯苓如胡妙細自辛自芷蔓共原威湯方  
味再添味蟬蛻味黃味苓味芍味紫金皮用病無妨寒勝宜投小續命白附

美天羌獨如胡帶

外治法 用苦參磨水滴入耳中 或用猴姜根汁 或用

苦薄荷汁土木香汁滴入耳中

赤膈傷寒

胸赤腫又疼痛發熱惡寒病甚重頭疼體痛類傷寒損荆防敗毒  
誠有用本湯加入損苓黃連瓜損蓼玄參赤芍中升麻并用紫金皮  
大便燥實將軍送外治須用三稜針刺腫出血能蠲痛

示吉日吳門戈氏專司傷寒有補天石集集中惟此二條類  
傷寒秘而不傳予于張孟如處得之附後



胎前傷寒

宜清涼忌溫熱

太陽症是胎前發熱惡寒頭痛先脈來浮緊身無汗慈蘇飲服自然痊。慈蘇飲用二錢芍慈頭帶廿一紫蘇攻錢三生薑三錢須搗爛水煎熱服汗來鬆無汗加醋仍熱服厚被蓋煖汗不同示吉曰胎前表症無汗不可輕與發表以本方代麻黃羌活等湯溫熱時疫同治以慈能解邪又能安胎也古人用四物合冲和湯治之然歸芍走陰尤恐引邪入內不如慈蘇飲為穩當如終無汗再用古人法可矣。

妊娠病陽明兼鼻乾目痛夜不眠煩渴身痛并自汗紫葛引子

得安然

柴胡葛根并知母

各一錢五分

大青山枝各二錢石羔升

麻

各一錢

及葱白

二七

生薑大棗一同煎若不急治胎即落外護

之法妙難言

妊娠病少陽症耳聾脇痛口苦應惡心嘔吐脈弦數雙解飲服

人當定

柴胡黃芩及川芎

紫蘇知母

甘草

陳進枳殼桔梗芍藥

皮

同煎姜煎服病自順嘔痰半夏及前胡脇痛青砂不可聽口渴

不眠竹葛增不愈

蔗枝法可信

石山

妊娠病入三陰大便熱結不能行口渴惡熱并煩滿沉實有力

脈來因若還不下胎即落大黃紫蘇飲方靈

大黃酒製腹皮

諸余兌句

卷三胎前傷寒

三

三



洗蘇梗川芎陳皮理當歸芍藥枳壳兼甘草慈姜病自已便通

之後胎無恙安胎等劑宜服起

示吉曰攻下傷血終防犯胎然秘結不下固不利於子其母

命亦隨之而亡本湯亦不得已也予屢遇此症先用蜜湯與

之外用密導法猪胆導法閉結目下胎元保全所活甚多若

導之不効方用本方然大黃酒製亦無害也針護法其功不

少熱病傷寒即宜用之導法見大便秘條後

護胎法用井底泥伏龍肝青黛等分水調塗臍下二寸許

如乾再塗

溫毒發斑

按王峯李氏曰妊娠傷寒過經不愈發斑如錦

紋用四物湯加升麻連翹防風黃芩柴胡若發斑煩渴非

人參白虎湯不愈若斑見而復隱者元氣不足故也倍參則

復出矣

中寒症

胃氣素虛寒邪直中陰經其症惡寒吐瀉四肢厥

冷踈臥口吐涎沫妊娠此症亦少以其氣血調和乃能受胎

萬一有之姜桂附子不能無用節菴曰附子姜桂雖熱炒製

無害必加王連耳草兼製沉香墜之亦經所謂有故無殞之

意乎



產後傷寒 在月內惡露未淨時從此而治宜溫熱忌寒涼

身發熱頭又疼惡寒無汗表症成脉來浮緊法當汗產後又非

一樣論豆淋發表湯奇効若得微汗即身輕 荳淋發表紫蘇

芩羌活茯苓白朮同當歸蒲黃須炒黑熟地姜灰甘草通丹皮

香附及陳朴黑荳炒黑酒煎濃生薑薑母爲引子臨服重便入

一鍾頭疼不愈加葱白冬月無汗麻黃攻不可用多傷風自汗紫蘇

去桂枝芍藥暫通融嘔吐半夏蒼姜汁腹痛延平烏藥容

示吉日產後榮衛俱虛寒邪湊之即病其痛與平人相符但

其脉不宜浮緊有力若診得微細勿作陽病見陰脉論盡

後微細脉固當如是耳製方最忌寒涼以血得寒則凝恐停

血爲害并非所以扶生生之意丹溪云產後毋得令虛當大

補氣血雖有雜症以未治之若大發熱必用姜灰輕者用茯

苓淡滲其熱一應皆寒發表之劑皆不可用此言誠爲至當

但產後寒熱譫語癰瘡等症屬血虛血實飲食三者爲多如

去血過多胸脇少腹無痛處或空痛手按則減此血虛也如

敗血不行惡露不散腹中疼痛手不可按此血實也如產後

脾胃尚虛飲食過度後至胸腹飽悶惡心作酸惡聞食氣此

停食也血虛宜補血血實宜行血停食宜健脾胃消食治詳女



科本條下切不可概認風寒而作外感治之。豆淋酒以黑豆炒焦黑將黃酒乘熱淋之。入藥內同煎。發散風寒。生新去瘀。實產後之聖藥也。

陽明少陽

和解症另有方濟生加減柴胡湯。產後血羸發寒熱飲食少進。腹脹忙陽明不眠少陽嘔隨症加減保無妨。加減柴胡紫陳參酒炒白芍川芎勻甘草丹皮并半夏生薑大棗水煎吞口渴不眠加乾葛竹葉知母亦須行。去芍惡露未淨加生地荆芥炒灰香附靈胸中煩滿加蘘桔。瓜梗不嘔去。半夏腹痛延乎姜附與血。

夜尤甚四物合用莫因循。脈必微津液不足生煩渴麥冬竹

知味臨。去半錯語心煩不得睡竹葉辰砂知母精嘔加姜汁

去甘草熟入血室紅歸行。花當一加生茵陳山枝發黃用斑爛玄參

青黛等。一加半旁子升麻治斑欲出未出者

三陰經

三陽邪傳三陰燥渴大便不通行腹滿硬痛脉泥實將軍四物莫沉吟。將軍四物歸生地酒炒大黃白芍。川香因芍附丹皮柴茸

草生薑煎服即身輕。新產姜灰山查用兼行導法更為神。按此用大黃轉藥必須看腹中硬痛非凡燥渴日數已久方



可用之若燥結在廣腸諸胆導法尤妙蓋產後陰血已虧用  
大黃恐復傷其血變生他症耳

中寒

胎產後真中寒手足厥冷心不安口噤不言人不省甚末四兩  
細切完二升陳酒煎至半服之奇効自新歡

按產後中寒宜用蒸臍法外用薰法用吳萸紫蘇葱頭煎湯  
于密室中放桶內熱時薰既而洗之甚効 外感脈法 產

後因得熱病臨脉細四肢煖者生脉大忽然肢逆冷須知其  
死莫留停

却病辟瘟法

論曰冬時嚴寒萬類深藏蟄蟲周密君子居室恐觸寒威而生  
病也蟄蟲尚知衛生可以人而履霜蹈冰自殘其命乎倘有不  
得已之事不能免于冲風冒雪者宜飽食飲酒以敵其威苦時  
行疫厲互相傳染辟疫之法又所宜講經云聖人不治已病治  
未病不治已亂治未亂此之謂也

一用水飛雄黃男左女右吹鼻孔中 一用透明雄黃一塊  
五錢重者絹包繫頭頂心妙 一取貫仲浸水飲之 一用  
赤小豆同糯米浸水缸中每日取水用之



發汗法

人之寒氣自表而入。亦當自表而出。發表之道所由作也。凡頭  
疼發熱惡寒。項背強身。體痛拘急。拂鬱面赤身痒。脉浮緊。或浮  
數無汗者。俱屬表症。經曰在表者汗之。若在深山窮谷無葉處。  
先用薪火燒地。良久掃去。以熱水洒之。取蠶沙。栢葉。桃葉。少加  
加糠麩。鋪所燒地上。約厚二三寸。加蓆令病人臥于上。飲七沸  
湯一碗。多被密覆。汗即至矣。候周身及脚心俱透即愈。七沸  
湯用水七碗燒鍋令赤。投水待沸。取起。再燒再投。如此七次。取  
湯一碗乘熱飲之。又法傷寒及溫熱病不得出汗。用擣姜汁

經裏周身擦之良法也

止汗法

自汗表虛汗多亡陽。桂枝止傷風之汗。黃芪止氣虛之汗。當歸  
止血虛之汗。內治法也。外治法。凡傷寒溫熱病汗不止。將髮  
披水盆中。足露于外。宜少蓋。外用龍骨牡蠣糯粉麥麩白朮為  
細末和勻。周身撲之。其汗自止。一用蚊蛤為末。津調塗臍內。  
亦妙。

吐法

經曰在上者因而越之。吐法是也。凡病在膈上。或胸滿多痰。或



食在胃口。或胸滿微煩。或胸中懊憹。或胸中痛。欲按。或寸口脉滑。或寒氣在胸。煩滿。或寸脉沉伏。或乾霍亂。心腹刺痛。或中風塞痰涎壅甚。或下利日數行。寸口脉滑。悉皆可吐。一用瓜蒂散。瓜蒂赤小豆等分。爲細末。先以水二鍾。煮香豉。一合作稀粥。去滓。取三分之一。和散一錢。頓服之。不吐少少。又加得快。吐乃止。諸亡血虛家不可用。猪苓散。溫病身不熱。煩渴發狂。小便不利。用猪苓。茯苓。澤瀉。滑石。阿膠各一錢。爲末。白湯調服。仍以涼水一鍾飲之。以鵝翎探吐。吐痰法。用皂莢末射香細辛生礬爲細末。姜汁調二三分。灌下。後將鵝翎蘸桐油燃火。

### 米探吐

#### 止嘔吐法

嘔吐不止。用炒粳米一撮。入各藥中同煎。後加生姜自然汁。傅送。隨用竹管重納內。關其嘔。卽止。惟胃實嘔吐。不可用米。恐反助邪氣也。

#### 導法

經曰。病在下者。下之。諸承氣湯所由設也。然或遇年老氣衰婦人新產及久病之後。下不可不下。不可所以不能已。子導法也。用好蜜煎膏。滴冷水中。卽硬爲度。入射香細辛皂莢末和。



三捻成條如指大浸冷水中候硬推入穀道中即通  
猪胆一枚傾去一半入香油小鍾以蘆管套進以一頭推入  
穀道中放胆汁香油流入燥屎自下

止痢解大黃芒硝法

服黃硝而下利不止將參朮乾姜甘草熟附白茯苓子肉寇粟  
壳陳皮并麻水通身按摩心小腹臨服入炒鹽土一匙調下

救陰寒法

治陰寒嘔逆吐利腹痛身如被杖四肢厥冷過于肘膝或沉不  
省六脉或沉或絕心下脹滿結硬堅冷如冰湯藥不受面唇指

甲青黑或鄭聲古卷囊縮煩燥冷汗不止腰背腿疼 蒸臍

法 熨臍法已見中寒一用吳萸二三合麩皮一升鹽一合拌

勻炒熱以絹包腹中上下熱熨之自然有効 一灸氣海穴在

臍下一寸五分丹田在臍下二寸關元在臍下三寸用大艾炷

二七壯 一用胡椒爲細末蜜丸塞馬白肉一時許自然汗出

而愈 用諸法後無汗者有汗便秘者溺通逆冷者溫煖昏沉

者清爽絕伏者漸出卽爲生兆仍灌入姜汁炤前用藥 脉伏

絕者先用姜汁好酒各半盞熱服脉來可治 或用艾湯調硫

黃末三錢出汗而愈



去舌胎法

用薄荷水浸青布于舌上洗淨後用生姜切片蘸水時時刮之其胎自退再用薄荷搗浸凉水時時嚥嗽以免乾燥之患

治鼻衄不止法

用水紙搭在鼻中隨用山枝炒黑色牡蠣龍骨火煨京墨百草霜共爲細末加血餘燒灰各等分用茅花汁濕蘸藥入鼻中卽止如無茅花將紙燃銹釘水濕蘸前藥末入鼻中亦妙 再用茅根側柏藕汁三味搗汁磨京墨入本湯請服

治陰寒呃逆不止法

用乳香硫黃各二錢爲細末用好酒一鍾煎數沸乘熱氣使病人鼻嗅之外用生姜擦胸前最效 灸期門法見呃逆條

熨結胸法

一切寒結熱結水結食結痞結痰結支結小大結胸痞氣俱用生姜搗爛如泥取查炒熱絹包漸漸揉熨心胸脇下其痛滿豁然自愈如姜查冷再入姜汁再炒再熨揉之以愈爲效惟熱結用冷姜查再入揉之不可炒熱

看斑法

一切發斑用紅紙撚油燈焰看病人面部胸堂背心四肢有紅



點起者乃發斑也。若大紅點發于皮膚之上，謂之斑。小紅點行于皮膚之中，不出起者，謂之疹。蓋疹輕而斑重也。先將姜汁噴于斑上，已發後，照輕重陰陽寒熱虛實用藥。

救發狂法

一切熱病發狂，不可掩閉床帳，務用揭開，放入爽氣。良久，隨用銅鏡按在心胸間，熱勢稍退，即除。若傷寒溫熱發狂，渴不止者，將朴硝一斤研細，用水一盆，將青布方圓一尺許，三五塊浸于硝水中，微攪半乾，搭在病人胸堂，并後心上。頻易冷者，搭之，如得睡汗乃愈。一切發狂奔走，勢不可遏，須于病人處生火，一盆用醋一碗傾于火上，其烟冲入病人鼻內，仍將姜汁噴于病人頭面身體手足，即安。方可察其陽狂陰燥用藥。

治吐舌不收法

舌出不收，用麻黃湯洗淨，將冰片、牛黃、射香研末，點舌上，即收。

治大頭傷寒法

用芙蓉葉、二桑葉、車前、赤小豆、白欬、白芨、大黃、黃連、黃柏、白芷、雄黃、朴硝各等分，為末，用蜜水調掃腫處。

治咽喉腫痛法

用青黛一錢、白礬五分、寒水石一錢、紫車前、山豆根、玄明粉、朴



人煎酒良藥手虽暗受古何察其明并創製中藥

古吳自了漢蔣平吉仲芳氏述

天池名得子毛漢迎方來氏叅

長洲學人馬化龍凌凡氏

姚江後學毛 憲公威氏

小兒色診說

夫女子稟少陰之氣而生。合少陽之數而化。丈夫逢少陰之數而化。稟少陽之氣而生。少陽之數次于七。故女子二七癸至。可爲人母。少陰之數次于八。故男子二八精通。可爲人父。若是則



爲成人診以大方脉法如未至二七<sup>十四</sup>二八<sup>十六</sup>之歲惟以

小兒論不可與大人同日語矣錢仲陽云若憑寸口之浮沉必

乃橫亡于孩子故小兒半歲之際心鑑有按眉端之法甚善其

辨脉紋以斷病自此以後未及三週者錢氏看三關察五色辨

脉紋是法尤不可廢三歲以下始以脉診焉然亦不過以一指

按高骨分其三部定其息數而已若再加一二歲方以一指空

轉尋其三部以關爲準七八歲移指少許自九歲而後診以二

指次第依三關部位尋取其浮沉遲數陰陽冷熱自無避情矣

從此而至二七二八之歲方以三指炤內經脉法診之古人云

寧醫十老人莫醫一小兒老人雖榮衛俱衰而口尤可宣小兒

既血氣未足又兼口不能言苟其疾病惟賴三關面色而洞其

臟腑之微不亦難乎

心鑑按眉端法

小兒半歲者以名中食三指按于髮際額前眉端之間兒頭在


左舉右手頭在右舉左手食指爲上中指爲中名指爲下三

指俱熱主傷風邪鼻塞氣粗發熱咳嗽三指俱冷主外感風

寒內傷飲食發熱吐瀉食中二指熱主上熱下冷名中二

指熱主夾驚之候食指熱指胸中氣滿乳食不消





面部驗色主病

小兒面赤爲心病面青眼青肝病認面白肺病脾病黃面黑腎病爲相應青主驚積欲發風紅爲痰積驚悸甚黃主食積疳

初患驚瀉印堂青黑腹痛

夜啼頻淡白泄瀉食不化紅主啼哭被火驚黑色見時爲客忤

三根黑黃死來侵年壽平陷亦主天

青色發熱更生驚黑主瀉痢紅主燥危俱微黃隱隱始爲平黃甚主霍

亂傷乳胃逆人中黃青主下痢乳食妨噯氣酸腐長不進黑色

蟲痛定須防  
食時被驚承漿青黃主吐逆血痢因黑色驚風

乾燥而

皺脾熱極消渴煩熱并不寐大便不通下之則兩眼黑睛黃

白晴青時主驚風黑晴紅黃傷



寒劫。兩眉青色是為平。紅主煩燥夜啼。勤黃主霍亂并吐瀉。  
 久痢紅者定傷人。兩額赤色肺有熱。太陽青時二次驚。  
 自太陽入耳死。紅色見時主血淋。客忤之病兩臉青。食痰喘。  
 急黃色親赤主風熱須發散。兩額赤時傷寒毒。額間赤色。  
 心經熱煩燥驚悸不必說。青黑腹痛又驚風。痙攣叫啼何時歇。  
 微黃驚痺自古傳。純黑之時命已絕。左臉青赤肝風熱項強。  
 煩悶病之訣。驚搐腹痛定黑青。細心推看心能決。風邪發熱。  
 右臉赤咳嗽便閉并氣急。青白惡心或咳嗽。青黑驚風腹痛極。  
 或盤腸。脾胃熱極鼻色赤。小便不通深黃色。鼻中乾燥及氣粗。  
 內吊。血之症因而得。脾虛泄瀉若何形。乳食不化鼻淡白。脾土受。

寒色自青。土木尅黑為死候。君須識。小便不通顏間赤。膀胱與  
 腎氣熱結則。耳後微赤屬少陽。本經風熱宜知悉。睡中驚悸  
 若咬牙微黃之色法無失。耳輪乾燥是骨蒸。口渴盜汗肝熱  
 極。兩頤青時主吐蟲。古人望色從來的。

虎口  
三關  
脈紋



第一節寅位風關  
 第二節卯位氣關  
 第三節辰位命關  
 虎口又手處是也



示吉按水鏡曰寅關脉。初見易治。卯關脉見病深。辰關脉見者死。若三關通度。是為極驚。虎口脉紋亂者。主胃氣不和。若青驚積發病。

三關脉色如何斷。紅黃隱隱是為常。非病脉也青色為驚人。與獸紅色傷寒咳嗽搶。又主水驚脾虛色黃。乳不化。又主雷驚紫色瀉痢熱多張。白色為疳黑中惡。黑主人驚紅黑相兼。痢不良。青多白痢紅多赤痢紋如線直青紅色。乳食傷脾。驚熱。償左右一樣驚積發。三條四散。肺風痰。

### 小兒脉法

小兒三歲方切脉。一指三關。定數息。一息七至。號平和。加則為

數。熱是責。減則為遲。冷病侵。浮則為風。沉為積。左手人迎主外。感右手氣口主內疾。外候風寒。暑濕傷。內候痰積。停乳食。浮緊無汗。是傷寒。浮緩有汗。傷風則浮。大多因風熱盛。沉緩元來乳食塞。沉緊腹中痛不休。弦緊喉間作氣急。促急驚風。搐搦主弦。滑風癇人強直。大小不常。鬼崇侵。二便秘時。脉牢實。軟細之脉有疳蟲。上下失血。脉弦悉虛。濡主氣兼慢驚。沉緩為冷泄瀉。得沉數。骨蒸時內熱。客汗邪氣。脉弦急遲。瀉胃腕自不和。弦長肝肺有風入。已上脉訣。出名。家再參紋色。方無失。

薛立齋曰。小兒血氣未實。驚則氣散。氣散則脉亂。必當參三



部五脈三部者面上氣色虎口脈紋寸口一指之脈五脈者  
上按額前下診太衝并前三部也

心誠賦

欲保赤子全仗心誠。口不能言其疾苦。脈難以決其浮沉。外感  
六邪。風寒火邪易襲。內因諸症。心肝脾臟為多。小兒多啼則傷  
肝多驚則傷心  
多食則傷脾。欲觀氣色。先分部位。左頰屬木為肝。右頰屬金為  
肺。天庭高為心火之位。承漿低為腎水之區。脾土中央。鼻為通  
氣。肝青腎黑。木水之色主驚寒。肺白心紅。金火之色為虛熱。土  
色黃現。疳食症多。欲窮其變。再察五官。鼻雖中央。肺竅通。聲重  
鼻塞風寒可見。唇雖赤色。脾氣應。燥腫生瘡。脾熱白。詳舌乃心  
苗。紅滑順而乾黑者熱。舌乾主心熱乾  
黑則熱極難治目為肝竅。赤腫熱而有  
神者生。胃流注于雙頰。風熱內攻則紅腫。腎開竅于兩耳。腎元  
憊損則黑枯。繞耳經絡足少陽。暴聾紅腫其過在膽。牙床經絡  
二陽明。上床足陽明  
下床手陽明齒遲枯燥。病歸乎腎。再觀其外以知其內。  
已下活  
幼指南紅氣現而熱蒸。青色露而驚悸。如煤之黑。中惡之因。  
似橘之黃。今脾虛之謂。白乃疳勞。紫為熱極。青遮口角。扁鵲難  
醫。黑掩太陽。盧醫莫治。年壽赤光。今多生膿血。山根青色。今頻  
見灾危。瀉痢而帶陽者須防。咳嗽而拖藍者可畏。疼痛方殷。面



青唇撮眉自感驚風欲發面赤目直睡多驚火光燄燄外感風寒  
白氣浮浮中藏癰積乍黃乍白兮疳熱連綿又赤又青兮風邪  
緊急察之若精治之得理鴉聲魚口枉費精神肉拆皮乾空勞  
氣力氣色頓移形容變異氣乏則脾冷腎虛則滯頤面目虛浮  
定腹脹而氣喘眉毛頻蹙則肚痛以多啼虵出兮脾胃將敗蠱  
蟲兮肝臟先虧苟瞑眩而弗瘳總虛扁而何益手如數物兮肝  
風將發面若塗硃兮心火已熾坐臥愛冷兮煩熱之攻伸縮就  
煖兮風寒之畏肚大脚細兮脾欲困而成疳瞠目張口兮熱已  
危而必斃弄舌脾熱解顙腎憊重舌木舌兮虛熱積于心脾哽

氣喘氣兮寔火浮于肝肺齟宣息露必是牙疳哺露丁奚多綠  
食積唇乾自作渴腸鳴必自利夜啼分爲四症變蒸週于一歲  
心熱欲言而不能脾虛無時而好睡病後失音者腎怯咳嗽失  
音者肺痿肚痛而清水流出者蟲腹疼而大便酸臭者積口頻  
撮而虛寒舌長伸而火熾龜胸兮肝火乘于肺膈鼈背兮腎風  
入于骨髓鼻乾黑燥兮火甚金衰肚大青筋兮木強土潰丹瘤  
瘡疥皆胎毒之連纏吐瀉瘡痢乃食積之滯滯不能吮乳者熱  
在心脾常欲俯臥者火蒸脾胃喜視燈火者煩熱在心愛吃泥  
土者疳熱在脾腹痛寒侵口瘡熱積臍風忌于一臘火丹畏于



遍驚自熱生。痼因痰致吐瀉而精神好者則危。瘡痢而飲食減者則瘳驚本心生。風由肝致搐合左右兮。症有順逆。藥分補瀉。今病有虛實。急驚也。由于積熱之深。涼瀉偏宜。慢驚也得于大病之後。溫補為貴。頭搖目攛而氣喘兮。上工莫醫。口噤鼻張而氣冷兮。神丹何濟。閉目兮。無魂狂叫兮。多祟。不知吞吐者死。反加悶亂者危。且如病則熱起。熱則驚生。或制熱以熱。或攻熱以寒。襁褓未寧兮。但調其母。匍匐不快兮。當固其元。奈何瀉久成痢。積久成疳。瘡久生癖。驚久成痼。未致留連兮。攻之宜速。已見沉疴兮。治之宜緩。腸胃秘結兮。急瀉而已。氣血虛乏兮。急補而安。此皆指南之活幼。何疑治病之萬全。

示吉曰。小兒之病。口不能言。故曰啞科。惟賴望色驗症。察紋切脉。以知其臟腑之微。實難事也。故庸工治病。遂拘小兒病食上起之說。概施消導攻伐之品。實者偶爾中病。虛者遂至重虛。良可憫也。卽有智者。不遵古人之遺意。常恃一己之聰明。或致弄巧而成拙。以致智愚相去。其間不能以寸。此故維何。皆因不辨明其寒熱虛實。外感內傷之故也。予不揣愚陋。將六症分明于後。一見了然。使無疑似之嫌。如兼他症。隨症加減。又存司命者之方寸耳。



凡見小兒頭疼發熱。鼻塞聲重。咳嗽。手背熱。惡風寒。皆屬外感。無汗。脉浮緊。傷寒。自汗。脉浮緩。傷風。暑月吐瀉。作渴。齒燥。脉虛傷暑。浮腫洩瀉。身重。小便不利。脉濡細。傷濕。舌乾口燥。唇焦面赤。或聲啞。脉數。傷熱。

凡見小兒嘔氣。飽悶。作酸。腹膨。不思食。及惡聞食氣。下洩臭屁。惡心。乍吐乍瀉。或寒熱。或腹中硬塊。作痛。手心熱。脉弦滑。俱屬內傷飲食。已上二症最多。

凡見小兒發熱。無汗。表實。大便閉裏實。心胸飽悶。腹中膨脹。惡心。嘔氣。吐出酸水。手足有力。腹痛。手不可按。脈洪實。有力。俱屬實症。

力 俱屬實症。

凡見小兒面恍白。無神。懶言。氣短。不思食。腹膨。不痛。二便如常。喜臥。眼喜閉。手足無力。慢驚。久吐胃虛。久瀉脫肛。脾虛。自汗。表虛。自痢裏虛。脉來微細。無力。及行遲。髮遲。齒遲。解顱。鶴節。俱屬腎氣未成。元精不足。已上俱屬虛症。

凡見小兒發熱。手足心熱。面紅唇乾。舌乾口渴。口上生瘡。口中熱臭。大便秘。小便赤黃。或痢下黃赤。肛門焦痛。喜飲冷水。喜就涼處。腹中熱痛。脉來洪數。俱屬熱症。

凡見小兒面白唇青。手足冷。口中冷氣。或泄痢清白。無熱不



渴。腹痛悠悠無增減。或惡心嘔吐。喜就煖處。脉來沉遲無力。俱屬寒症。

已上諸症。每症不必悉具。凡見一二。便作主張治之。若二症三症兼見者。須照本條斟酌盡善。自能中病也。

小兒百病歌

初生小兒宜珍攝。溫涼得體自和悅。初生小兒宜用老人舊衣。有壽。夏月宜夾衣。獨臥。冬月宜穿薄綿襖。置大人懷中。以就煖。氣因小兒陽氣尚微。即看重裘。其陽氣不能自煖。多致凍壞也。冬月初生。黃連忌用。太寒故也。三朝內服化毒丹。名為開乳解胎熱。臍帶落後。須炙乾硃砂相和。為細屑。最能稀痘。更還元胎毒。胎熱從此絕。

臍帶落後。置新瓦上用炭火四圍燒至烟將盡。放地上用瓦蓋蓋之。存性研末。預用透明硃砂末水飛過。如臍帶灰四分。硃砂末二分。和勻。煎生地當歸濃汁少許調和。前二味抹兒上。臍間及乳母乳頭上。一日之內服盡。次日大便遺下穢物。終身無疾矣。滿月之後有變蒸。微寒微熱吐乳生。唇有白泡三日愈。若夾

風寒逐樣尋。變者異常蒸者發熱。小兒自此氣血發榮。性情有異。一二日其熱自退。若夾他症而不愈。有食則消食。是風則行痰。有驚則安神可也。若變蒸而妄投藥餌。則誤人最大。慎之。

眼閉面赤名胎熱。炙啼煩燥熱不歇。口中氣熱。甘草一黑豇及燈心

七莖豇二子。竹葉煎湯頻頻呷。乳母面色青白四肢寒。口冷腹痛。

胎寒說。當歸黃芩及桂心。細辛龍骨白芍訣。等分為末服一匙。乳汁調下寒能絕。此症兒大便青黑身起寒慄。因母孕時受寒。



臍帶斷後風濕傷臍腫硬直臍風。臍有青筋冲心者。燈火急

救始無妨。臍有青筋行肚却分兩岔行至心者必死急用燈草

壯肉服小紅五通膏貼功誠妙。生地姜葱白當上子田螺各

等分五件共搗搭臍傍。敷臍四傍一指厚。拘住一時有屁下泄

風邪入臍心脾熱唇青舌強撮口訣齒根上下粟米瘡膏布蘸

水擦破截。小兒口撮緊閉不吮乳。皆因齒根生小泡子痛極也

青布蘸雪水擦破。即開口便安。甚者用牛黃一分爲

急驚

小兒急症急驚風。緊閉牙開氣不通壯熱涎潮目窳視反張搐

搦頰唇紅二便閉結法當下驅痰清火有神功。輕用小牛黃丸

下後不止夢中驚悸宜玉樞丹驚定即當調胃氣莫仍尅伐與推攻

慢驚

慢驚之症實非驚吐瀉亡陽病後成。脾胃損傷肢體冷虛痰泛

上目無神口鼻氣微時驚悸手足瘈瘲命將傾。加減醒脾湯可

治人參白朮白茯苓木香天麻并半夏膽星甘草橘皮靈倉米

棗姜煎服効。姜蠶全蝎逐痰增不愈六君加附子。煖回痰降自

全生。

示吉曰。急驚者內傷乳食外感風寒內熱痰壅腹脹便秘脉



數有力故宜瀉。宜攻慢驚者。久吐之後。名胃虛驚。久瀉之後。名慢脾驚。或服尅伐過多。或投寒冷太甚。以致元氣衰憊。虛痰泛上。不投溫補。何以挽回元氣。無何有之鄉耶。古人云。似風而無風。可驅似痰而無痰。可逐。信然也。

疳疾

小兒疳疾。從何起。乳母寒熱失調理。肥甘過度。喜怒偏生。冷油膩不得體。或因吐瀉及痢瘧。或熱或嗽。病不已。以致脾胃中氣傷。溺如米泔。又不長。皮黃肌瘦。髮更直。肚大青筋。腹痛。映好食。泥炭并茶米。諸蟲作痛。樂須嘗先服珍珠丹。一服。或用小追蟲

取積最為良。連薔肥兒後調理。蒸餅礬丸。細酌量。并治丁

發熱

小兒發熱病不一。傷寒無汗惡寒極。手足稍冷。面色青。兼不左額青紋可認識。傷風惡風且自汗。手足稍溫。面光赤。二症宜傷食胸膈又飽悶。吐瀉腹疼。面黃色。右額青紋。目胞腫。夜熱晝涼。無定跡。便秘小牛黃丸驚風發熱。三根青。手心有汗。時驚惕。紅小金錠選用。九抱龍丸紫疳積發熱。是骨蒸。背熱不止。盜汗生。有積先服小乾蟾肥兒丸。兒丸唇有白泡。變蒸熱。耳冷微汗。又虛驚。腹痛啼叫。或吐。覘週歲之後。無此形。不須諸熱表熱通神散。內熱化毒。身發熱



自能平

內熱手心熱口乾唇紅便秘

痧疹斑

小兒痧疹屬風熱煩悶集躁啼不歇汗下之後熱轉增痧疹將

發醫之訣頭粒細小痧疹來紅點無頭斑症列欲出未出須升

散牛旁升麻乾葛升防風升薄荷升及甘陳水姜煎服古方換已出

之後去葛麻加入玄苓定不差知粉支連能消熱咽喉疼痛黛

桔梗拿大便秘結大黃用自汗口渴石羔查

一方治痧子不發用櫻桃核打碎泡湯與之

風寒

風寒之症若何成頭疼發熱咳嗽生傷寒無汗風自汗鼻塞身重拘急形解表先服通神散若夾驚痰細酌斟

傷食

乳食不化自飽悶噯氣作酸或吐甚下洩臭屁不思食沉香末子藥可進大便結者小牛黃食隨利去法有信

嘔吐

乳食傷胃則嘔吐食消吐定法所布沉香末子是總司用濃姜湯調下

不愈定吐飲功大半夏陳皮及藿香神麥芽厚朴水香助水煎臨

服加姜汁口渴身熱黃連入身冷不渴炮乾姜脉遲厥冷參朮人自



益夏月香薷滑石添大便秘時兵柳吃

秘甚者用小牛黃丸姜湯化下

泄瀉

乳食傷脾泄瀉症。健脾消食利水應。沉香末子亦可施。實脾利

水煎方定。蒼朮白朮白茯苓山藥。薏苡甘草順澤瀉。木通及水

香砂仁煨姜陳皮進。有熱須增姜炒連。無熱肉菓炮姜性。姜用少許

食積腹痛。麴麥芽查卜實朴兵榔令。

暑

夏月吐瀉多。因暑加減香薷飲可止。香薷藿香及木香。厚朴陳

皮。麴麥始半。夏茯苓并木通。薏苡蒼朮滑石同熱加黃連去蒼

朮。瀉多炒芍亦良。丁有食山查。枳實妙。臨服姜汁助成功。

按燒針丸。治小兒吐瀉甚効。用東丹硃砂枯白礬等分。爲細

末。棗肉爲丸。丸如黃豆大。每服三四丸。戳針尖上。燈火上燒

過。研細。涼水調服。外用菜豆粉。以雞子清調成膏。如吐塗兩

腳心。瀉塗顙門上。止則去之。

痢

痢疾皆因傷濕熱。白傷氣分。赤傷血。新積多血。久積膿。初起腹

痛下之訣。通因通用之法。用小牛黃丸。表熱太甚。姜茶煎。內熱

口渴。香連截嘔逆。禁口用石蓮爲末。調下。病能絕。



姜茶煎 用生姜切片。細茶各三錢。井水煎服。痢而兼外感者用之。血痢加連根韭菜汁酒調服。

香連丸 治內熱口渴。肛門隻痛。用川黃連十兩切片。姜汁拌炒。廣水香二兩為細末。神麴糊丸。如菉豆大。每服三五七分。量大小酌用白湯下。

石蓮散 石蓮肉炒去心為末。每服一二錢。陳倉米飲調下。如嘔加姜汁一匙同服。

久痢塞劑 用栗壳木香。榴皮細茶。烏梅肉各二錢。白蜜砂糖各五錢。紅痢多。糖白痢多。蜜水二鍾煎八分去渣服。大人亦用。

瘧疾

小兒瘧疾名童瘧。初起消食痰涎却。便秘腹痛。小兒黃。屬乳食發熱無汗通神畧。屬風寒外感。六七發後截法。精天靈散用真靈藥。

天靈散 用天靈蓋燒存性為細末。黃酒調下五厘。瘧立止。一用斑毛一個放小膏藥上。侵晨貼眉間印堂中。瘧止揭去。

咳嗽

有聲有痰名咳。嗽風寒邪氣。肺經受若兼發熱及頭疼。通神解表功方就。火鬱肺經聲不轉。瀉白噲化丸能奏。痰塞喉中喘急者。巴豆塞鼻如神有。



小兒痰喘用巴豆一枚去壳搗爛作一丸綿花包裹男左女  
右塞鼻中痰即降下而愈

一方治咳嗽喘急甜梨一箇刀切勿斷入蜜于內麵裹灰  
火煨熟去麵吃梨

一方用白蘿蔔汁半鍾蜜半鍾飴糖半盃姜汁十匙蒸熟不  
拘時吃并治老年痰火

### 肺脹喘急

小兒肺脹喘嗽多人看作風喉。大黃兵郎二牽牛人參分兩等  
勾五味研成細末蜜水調量稀稠每將一字下咽喉不用神針

### 法灸

雲林云肺脹喘滿胸高氣急兩脇搖動陷下作坑脹悶亂嗽  
聲嘔不鳴痰涎壅塞俗云馬脾風不急治則死本方主之

按幼科陳見田秘本肺葉脹以致喘急眼胞上下臥蠶紋起  
用防莖散見雜症水腫條

### 浮腫

遍身浮腫是屬溫燥脾利水并消食腹脹便秘珍珠丹內消食  
積沉香子末益不効平胃皮子飲厚朴陳皮炒蒼朮腹皮姜皮茯苓  
皮車前卜子兵郎則神麴澤瀉及麥牙水香水通桑皮力砂



仁炒末水煎來小便利時腫自息

一方用黑丑半生半炒取頭細末每服二三匙煎桑白皮湯

磨木香汁調服 一方小便利者磨王樞丹燈心湯送下

一用草蓂仁每歲用一粒炒為末白酒調下外用河白草煎

湯洗浴 若浮腫先眼下臥蠶紋起喘急病在肺宜防莨散

### 黃疸

小兒黃疸是濕熱清熱利水方真訣指甲面目遍身黃溺如黃

汁或寒熱嘔吐口渴不思食夜無安臥不寧貼大便秘結珍珠

丹蒸餅快活調理截不愈茵陳滲濕湯茵陳赤茯連枝川山呻吟防已

二木及陳皮猪苓澤瀉兵郎悅食積神麴炒卜子理氣木香香

附絕小便不利加水通小便清白病自歇

### 汗症

小兒汗症原須治氣虛自汗日間至血虛盜汗睡中來總屬虛

弱分明訖黑豆錢三浮麥錢一及烏梅錢一煎湯服時汗亦住

一方用蜜炙黃芪生地各一錢五分牡蠣煨為末二錢水煎

服 一用五倍子為末津調塗臍內俱治汗出不止

### 諸失血

小兒失血非一病鼻中出血衄血認吐咯嗽血從口來總是上



集火熱症

宜化毒丹便結者用小牛黃丸

小便尿血為溺血大便出血下血甚

初生小兒是胎熱

用化毒丹一用生地汁入蜜少許和勻溫服或用甘露飲

能食小兒食

積病

用沉香末子或用蒸餅快活丸大便秘腹痛用小牛黃丸

隨症調治是良工再參方法

醫方應

治吐血衄血

一用白芍為末磨犀角汁調服一用側柏

葉藕節曬乾等分為末每服五分藕汁和蜜調白湯送下

一用黃芩為末蜜丸如龍眼大每服一丸鹽湯化下一

用吳茱萸為末津調塗腳心湧泉穴一用山枝炒黑為末

吹鼻中或用藕汁調服五分燈心湯送下

治小兒初生下血溺血及牙宣口臭口舌生瘡咽喉腫痛名

甘露飲

用熟地生地天冬麥冬去心枳殼茵陳酒炒黃芩石

斛耳草枇杷葉

蜜炙

各等分水煎飲溺血加石蓮肉燈心竹葉

一用蒲黃頭髮灰等分為末生地汁或藕汁乳汁調下一錢

脫肛

小兒脫肛有二症瀉痢之後氣虛應補中益氣去當歸外用薰

洗能接命若還便秘努力來清火潤燥方相稱

凡小兒脫肛大腸頭自糞門而出久不收進則硬燥難入法

用蓮鬚慈葉斤許煎湯數碗乘熱放桶內令小兒坐上薰之



後慢慢洗軟用冰片三四分爲末敷上肛自收矣。一用五  
倍子煎湯薰洗。一用陳壁土煎湯薰洗。一用驚頭骨燒  
灰存性香油調敷。一用五倍末敷上托入。一用草麻子  
搗爛貼頭頂上腸入去之。  
小兒大便秘結努力脫肛肛門隼痛或時下血用玄明粉二  
錢當歸一錢杏仁桔梗各八分甘草升麻各二分水煎服  
諸遲解顱鶴節

氣血不充行走遲腎氣不足齒生遲語遲皆因心不足血分不  
足髮生遲顱顙開解是頭縫不合并鶴節腎氣不成總宜知。

行遲語遲髮遲齒遲肌肉消瘦顱顙開解神色昏慢總宜調

元散 乾山藥錢五白芍沙茯苓去皮末茯神各二錢白朮人參生地

熟地當歸川芎黃芪蜜炙各二錢半甘草錢半石菖蒲錢一生薑三片棗一枚

水煎兒母不拘時同服

加減地黃丸 治頭縫不合名解顱腿瘦骨節呈露如鶴之

膝名鶴節腎主骨髓腎氣不成所致也。

懷熟地錢八嫩鹿茸山藥白茯苓山茱萸肉各五錢澤瀉丹皮當

歸各三錢爲細末煉蜜爲丸如龍眼大 解顱去澤瀉加人參

五錢食遠服 鶴節加牛膝肉五錢空心服白湯化下外用



大南星爲末米醋調攤帛上烘熱貼臍上

通神散 外感風寒內傷飲食頭疼發熱咳嗽痰喘鼻塞聲重

驚悸口乾煩渴胸滿不食凡有表症者並治并治瘧痢初起

薄荷葉 一兩 羌活 一兩 葛根 一兩 川黃連 姜汁炒 一兩

膽南星 一兩 枳實 七錢 兵郎 一兩 陳皮 炒 一兩

厚朴 姜汁炒 七錢 神麴 炒 七錢 麥牙 炒 七錢 川芎 三錢

甘草 三錢 共爲極細末黑糖拌濃煎生姜湯送下每服週歲

內者五分外者七分二週者一錢量兒大小酌用 痢姜細茶 各一錢煎

湯送下

白丸 止嗽疎邪消痰定喘清熱順氣凡嗽而聲不轉者効

石膏 煨熟 二兩 花粉 川貝母 去心 陳香圓 去穢

膽南星 款冬花 薄荷葉 各一兩 甘草

細芽茶 各七錢 已上九味共爲極細末聽用

麻黃 一兩 防風 桑皮 蜜水 杏仁 去皮尖炒 五錢

前胡 紫苑 蘇子 炒爲末 各一兩 陳瓜蒌 一大個

柿餅 三兩 山枝 一兩 葶藶子 炒五錢 已上十一味用水煎

去查濾清再入蘿蔔汁水梨汁錫糖各四兩姜汁五錢煎成

膏滴水成珠爲度將前末藥和勻爲丸每丸重一錢每服一



丸燈心湯化下大人噲化風和痰火咳嗽如神

蔣氏化毒丹 治一切胎熱胎毒遊風丹毒熱癰口疳疳火燥

渴煩燥大便結小便清赤等症

黃犀角

川黃連

桔梗

玄參

薄荷葉

粉甘草

各一兩

青黛

五錢

大黃

酒蒸九次五錢

硃砂

三錢另研極細末

右爲極細末煉白蜜爲丸九重一錢二分每服一丸燈心湯化下

小牛黃丸

消痰逐積追蟲消食清熱定驚除膨消脹凡大便

不通或按腹中硬痛者以此下之急驚痢疾初起神効

白土

頭末各七錢半

大黃

一兩五錢

膽星

半夏

各五錢姜汁製

枳實

炒五錢

牙皂

三錢

爲極細末煉白蜜爲丸九重一

錢二分週歲者一九三週者二九生薑湯化下追蟲糖湯下

沉香末子

治乳食傷脾胃以致嘔吐泄瀉痢疾瘧疾心腹疼

痛大便下血寒熱不止凡兼胸腹脹滿噯氣作酸惡心惡聞

食氣及不思食下洩臭屁上症不必悉具凡見一二定爲傷

食此方主之

香附

鹽水拌炒

兵郎

紫厚朴

姜汁拌炒

廣陳皮

炒各四兩

枳殼

炒

枳實

炒

青皮子

炒

山查肉



麥芽炒

神麴炒

蘿蔔子炒

白酒藥炒各二兩

柴胡

桔梗

真川芎各一兩二錢

芸白朮土炒

炮乾姜

沉香

研木香不見火各一兩

共爲極細末每服週歲七分二三週者一錢糖拌空心生姜湯送下便血米湯送下小兒下血多因飲食傷脾脾不攝血若用止血之劑及溫補升提之法無益也予製此方以消食為主食消則脾氣自復血不治而自愈。

陳氏小紅丸

治一切咳嗽驚癇發搐發熱齁喘痰涎上壅痰厥卒倒等症

全竭

去刺洗淨沙一兩

南星

一兩

硃砂

四錢半珠子一錢

巴豆霜

去油淨二錢半

爲極細末糯米糊爲丸如菜子大週歲者每

服五十丸二週者一百丸看小兒大小壯實用燈心湯送下

此吳中陳氏治急驚風秘方也昔年見田先生專司幼科名布江南其子珍如先生以此方授予試之奇驗

肥兒丸

治五疳五痢瀉蛔蟲臟腑虛弱身體羸瘦髮監焦黃

小便濁色消積化食健脾和胃長肌肉肚腹膨脹俱宜服

廣陳皮

一斤

甘草

炙四兩

蓬朮

炒六兩

厚朴

米泔浸炒八兩

枳實

炒八兩

連翹

六兩

香附

米泔浸炒一斤

山查肉

六兩



神麴炒六兩 卜子炒八兩 龍膽草六兩 青皮子炒八兩

川黃連炒 白朮土炒 兵郎各八兩

其為極細末煉白蜜為丸丸如龍眼大空心清米湯化下

若痺積加蘆薈胡黃連銀柴胡名蘆薈丸又名五痺保童丸

此須夜間發熱骨瘦如柴者可用一方加蝦蟇食蛆或用

蝦蟇食蛆俱燒存性入前藥內名乾蟾丸虛者加米仁山藥

虛甚加人參有蟲加川練子史君子肉鶴虱

蔣氏肥兒丸 治小兒瘦弱食不生肌肚腹疼痛內熱蟲積

芸白朮土炒 陳皮炒 香附鹽水炒 厚朴姜汁炒

枳實麸炒 兵郎 神麴炒 爽芽炒

澤瀉炒 卜子炒 山查肉炒 白茯苓蒸

白芍藥炒各四兩 木香不見火 甘草炙各二兩

內熱口渴脉洪數小便黃加連翹川黃連各三兩

骨蒸熱背熱手心脚底熱口渴身瘦溺赤脉細數加蘆薈一兩

胡連銀柴胡各三兩 鼈甲醋炙四兩

瘧後寒熱不止脇下有塊加銀柴胡胡黃連當歸青皮各三兩

醋炙鼈甲四兩 桂枝七錢

腹中膨脹或有塊痛手不可按如山稜蓬朮醋炒各三兩 食蛆二兩



乾蟾二隻

泄瀉少食或腹痛手按則減面色恍白無神六脉無力倍白

米白芍各四兩加入參山藥米仁各四兩瀉不止加肉果麩裹煨二兩

六脉遲手足冷口不渴溺清白肌肉日削或悠悠腹痛無減

增或喜就煖處或食生冷即瀉或臍下作痛是屬虛寒加炮

姜肉桂各二兩倍白木白芍泄加肉果麩煨二兩虛甚加入參山藥

各二兩

面上白斑腹中作痛口出清水或口中吐蟲屬蟲積加史君

子肉貫仲各二兩雷丸鶴虱各一兩

示吉曰小兒如春令草木得雨露滋養則日生夜長所患者

惟蟲物以害之則枯萎爾小兒稟純陽之體乳食滋補則先

天之氣生生不窮所患者飲食過度脾胃損傷成疳成積肌

肉瘦削也食積之害小兒亦猶蟲物之害草木蟲物去則草

木日長食積去則元氣自生固不易之理故古人製肥兒之

方多用消食去積之品蓋欲先除其害也予得古人之旨隨

症加減以盡寒熱虛實蟲積之變敢云一片婆心聊為古人

之小補耳

紅燕丹 專治小兒疳積丁癸骨瘦如柴目閉溺赤或腹中疼



漏或溺如米泔

大石燕

一雌一雄每個重一兩者佳入饌銀罐中上下用炭火煨紅淨入好醋中如此九次

明珠砂

三錢另研水飛紅麴一兩揀淨

三味為極細末和勻週歲者每服

三分糖拌不拘時服

按此方乃消疳化積之神藥也且無

藥氣利于小兒之良藥者予表侄二三歲間患疳積症頭大身瘦發熱溺如米泔諸藥不効後聞藥氣即吐束手無策偶遇異人傳此方和于糖菓粥飯中與之數服全愈後以此濟人無不効矣

抱龍丸

治小兒急驚癲癇痰涎壅盛胎驚內弔咳嗽喘急撮

搐驚悸等症

天竺黃

五錢

辰砂

二錢

九套膽南星

一兩

明雄黃

一錢

麝香

一分五厘

為極細末另用麻黃欸冬花甘草各五錢煎湯

去渣慢火熬成膏和末藥為丸丸如芡實大每服一丸薄荷

湯化下

示吉曰鎮驚消痰安神開竅製抱龍之旨也然恐病輕藥重殊雄則過于墜鎮而麝香更有引驚入竅之弊故古人有不可輕用之說今此方之妙作之以膏麝香得麻黃之辛散竅內之驚盡出雄硃得甘草之和緩墜鎮之性和平膽星天竺



而佐款冬消痰潤肺。肺潤則氣降。氣降則痰下。痰下則驚平。咳嗽痰喘不治而悉愈。其方若與古人同則其効勝于古人遠矣。非得岐黃之秘者斷不知此。此方爲計元讓家秘。活人無算。予求之數年始得。同志者勿易視之。

玉樞丹

一名太乙神丹 一名紫金錠

一名追毒丹

解百毒。逐水氣。下痰開

結。鎮驚去積。通竅除驚。悸定搐搦。理內外無名之症。療大小疑難之疾。

明雄黃

一兩

五倍子

搗破洗淨 焙三兩

山茨菇

去皮洗淨 二兩

紅芽大戟

去蘆洗淨 焙乾兩半

千金子

去元研去油 取霜一兩

明硃砂

五錢

麝香

三錢

右除雄硃麝千金另研外。其三味各爲細末。

和勻。却入前四味再研勻。以糯米糊和杵干。餘下爲錠。子陰乾。端午日午時脩合者佳。癰疽腫毒初起。腫疼或蟲獸咬傷。疼痛外用井花水磨敷。內用井水磨服。大人每服二錢。小兒週歲者五分。大者酌用。小兒夢中驚悸及痰痰壅甚。大便如常者。井花水磨服薄苛湯送下。半歲者二三分。週歲外者三五分。

珍珠丹

追蟲去積消食。逐滯消膨脹。通便結化。痰垢疎滯氣。

推陳致新。下法中之神藥也。



阜莢

去筋子八兩

小兵郎

乾切六兩

黑白丑

淘淨浮水者不用各四兩

巴豆肉

六錢槌碎包裏布中

四味和一處用陰陽水十四碗與藥共

煮水盡取起去巴豆曬乾磨爲極細末磁餅收貯每服男用

三五七九分女用四六八十分黑糖拌上部病白蘿蔔湯下

下部病冷茶送下生薑湯催之如治水蠱用川貝母秦艽

花粉各一錢真蘇子九分煎湯送下珍珠丹三分隔一日服

藥一次水去依本條中調理川貝四味爲末蜜湯調下治

咳嗽如神

雞肝藥

治小兒疳積肝經積熱以致眼閉眼紅失明腹脹等

症

白肉雷丸

一兩赤色者不用用蒼木一兩同煮一二十滾去蒼木切片

史君子肉

一兩黑油者不用

二味焙乾等分鉄碾內研爲細末用

不落水雞軟肝一具男用雌女用雄將末藥一錢滲上飯上

蒸熟小兒食之即愈輕者二三服重者不過七服神効忌猪

肝及猪牛犬肉不忌損日此方係王仙師所傳吳中專司

痺積者惟賴此方其効若神予竭力覓之以公海內庶得好

生之意云

蒸餅快活丸

治小兒丁奚疳症皮膚瘦削骨露如柴肚大青



筋。小便濁。睡臥燥。亂神氣昏沉。常服健脾化積。進食肥肌。神効。用小麥麵一斤。作餅十六箇。每餅重一兩。內裹青礬一錢。外以濕紙包黃泥封固。炭火內煨透。取出候冷。爲細末。用紅棗米泔水煮熟。去皮核。擣爛如糊。同餅末杵勻。丸黍米大。每服三五十丸。清水湯送下。研化下亦可。

示吉常讀內經曰。以酒爲漿。以妄爲常。醉以入房。以欲竭其精。以耗散其真。不知持滿。不時御神。務快其心。逆于生樂。起居無節。此岐伯言。今人致病之由也。若夫小兒。則榮辱不開。其心色慾不傷其腎。惟天之六邪外入。風寒火症爲多。暑濕燥次之。內因諸症。易驚則傷神。而心病善啼。則怒而肝病多。食則傷脾。而脾病至于傷肺。傷腎之事。無有也。故予集幼科諸方。通神瀉白。風寒火之通治也。沉香末肥兒丸。快活丸。脾胃病之通治也。紅燕丹。雞肝藥。肝臟之通治也。小紅丸。抱龍丸。心臟之通治也。小牛黃。珍珠丹。追蟲取積。化毒專司清熱。玉樞丹。消痰逐水。定驚解毒。兼理怪病。俱去害之良藥。因小兒純陽之體。害去其生生之氣。自長溫補之法。不講也。惟慢驚及久吐瀉。諸遲法。宜補益。已見于本條下。專司幼科者。諸方預宜修合。三歲之內。非此不愈。四五歲後。當參大人雜症。



條治之。

治夜啼方 治邪熱相乘。集炒夜啼。用燈花三顆爲末。以乳汁

調抹兒口內。或沫塢乳頭上。令兒吮之。一用燈心燒灰敷

乳頭上。令兒吮之。一用玉樞丹二分。井花水磨抹兒口中。

一用硃砂二分半。研細末。蜜調兒睡時抹兒口中。一方用

火柴頭一箇。長四五寸。削平面。用硃砂寫云。撥火杖。撥火杖。

將來作神將。捉着夜啼鬼。打殺。不要放。急急如律令。

治愛吃泥土方 煎黃土湯送下。小兒黃丸。一用乾黃土爲

末。煎黃連汁和爲餅食之。愈。一用膩粉一錢。砂糖和爲

丸。如麻子大。米飲送下。瀉出去土立愈。小兒愛吃泥土。乃

脾虛胃熱所致。用清胃養脾湯。用黃芩石羔陳皮白朮茯苓

甘草水煎服。

治蟲痛方 凡腹痛口中出清水者。屬蟲積。用小牛黃丸糖湯

化下。一方用史君子肉二錢。殼五分。栝郎一錢。水煎服。

一用史君子肉一錢。栝郎一錢。雄黃五分。共爲細末。每服一

錢。糖拌苦練根煎湯送下。小兒蟲咬心痛。欲絕。用五靈脂

二錢。枯礬五分。爲細末。水煎一錢。不拘時服。蟲卽吐出。

予少時入山路。逢一小兒。心腹痛。啼哭。口吐清水。予曰。蟲也。



少頃吐出蟲長一二寸者一二十。其痛愈急。倉卒無藥。予記老葱根能化蟲爲水。取葱搗汁。香油調服。下咽痛定。其病永不發矣。此方大人。心腹蟲痛俱治。

予一日靜坐。一人索化蟲藥甚急。曰。三日前鄰家小兒心腹痛欲死。服相公丸藥後。卽下血。鼈七八枚。蛔蟲二三十。如蟻蛄者。一二十。痛立愈矣。今小兒心痛亦然。必求前藥。乃妙。予亦不記其何藥。以諸丸令渠驗之。乃揀遇仙丹而去。方見雜症蟲條

治遺尿方 小兒膀胱冷弱則遺尿。用破故紙一兩鹽酒炒爲末。每服一錢熱湯調下。一用益智炒爲末白湯調下一

錢。一用雞胓脰一具雞腸一具燒存性猪泡炙焦爲細末。每服一錢黃酒調下。男用雌女用雄。一用官桂爲末雄雞肝一具等分搗丸如小豆大溫水送下。日三服。

治尿濁方 小兒胃中濕熱下流則小便濁如米泔。或多食糯米食之故。沉香末子主之一用澄清飲白木茯苓白芍黃連澤瀉山查青皮甘草水煎空心服。

治小便不通方 膀胱有火則小便閉結而不通。用燈心湯送下。益元散一錢。一用兒茶二錢爲末。薑黃煎湯送下。一用五苓散加車前燈心煎服。初生小兒二三日不大小



便用葱汁人乳各半調勻抹兒口中即通

治語遲方

治小兒心氣不足邪熱乘之則語遲用石菖蒲九

菖蒲人參麥門冬

去心

川芎遠志

甘草水  
泡去心

當歸

各一兩

乳香

五錢

砂三錢為細末煉蜜九黍米大每服十九食後粳米湯下

治齒遲方

小兒腎不足則齒生遲用川芎山藥當歸白芍

甘草

炙等分

為細末白湯調下二錢食後服將藥末擦牙齦即

生

龜胸方

小兒心胸高如覆掌是肺熱脹滿之故

用天冬

去心

百合杏仁

去皮尖  
麩炒

木通枳殼

麩炒

桑皮

蜜炙

葶藶

隔紙炒

石羔

煨各一錢

川大黃

酒蒸  
六分

共為細末煉蜜為九如菉豆大每服五九白湯

化下食後臨臥服

外灸兩乳前各一寸半上兩行三骨間

六處各灸三壯春夏從下灸起秋冬從上灸起

龜背方

風入督脉背脊受傷故背高如龜

用枳殼防風獨

活大黃

煨

前胡當歸麻黃

去節

等分為末麵糊丸如黍米大每

服十五丸看兒大小以米湯送下食後服外宜灸肺腧穴

在三椎下兩傍各一寸半心腧穴在五椎下兩傍各一寸半

隔俞穴在七椎下兩傍各一寸半六處穴各灸三壯以小兒

中指節為一寸艾炷如小麥大



陰腫疝氣方

治寒鬱下焦偏墜氣痛。

用故子

炒橘核炒乾

姜肉桂砂仁等分爲末酒拌空心生姜湯送下一錢。一方用五倍子燒灰存性爲末好酒調下三分出汗立愈。一方用牡蠣不拘多少爲末雞子調塗治外腎腫大卽消。陰囊忽腫或久坐濕地或蟲蟻吹毒用蟬退五錢煎湯薰洗腫痛白消內服五苓散加煇心煎服若因蚯蚓吹毒陰頭腫痛用鴨涎敷之。一方用葱園內蚯蚓糞以甘草汁調塗腫處或薄荷汁調亦可。

斷乳法

以山枝三粒

炒黑存性

硃砂輕粉各少許研爲細末取生

芝麻油調和待小兒睡着以藥濃敷兩眉間睡起卽不食乳

不可說破如不効再加黃丹一錢須揀伏斷及卯日

牙疳口瘡方

小兒心熱則舌瘡胃熱則牙疳脾熱則唇瘡凡

治牙疳口瘡先用青絹蘸雪水或井花水拭淨白皮卽血出

亦不妨拭淨後用元水丹

見雞症口舌病

吹入

口舌瘡用黃連爲

細末蜜水調服

牙疳用竹葉石膏湯水煎服少許噙嗽

凡痘後痧後生疳是邪熱未散積毒成疳不急治則牙落非

元水丹可治宜秘方二仙丹用活雄童子鱖魚炙乾大葫蘆

浸糞坑內七日取起洗淨炙乾各爲極細末等分勻先拭



淨牙根敷上即愈

牛黃散 治小兒口中百病。鵝口口瘡。重腭不能吮乳。及咽喉

腫塞。一切熱毒。用黃連末黃柏末各八分雄黃青黛火硝各二分

牛黃冰片硼砂硃砂各一分共研極細。每用少許敷入口內。

重舌木舌弄舌方 心脾積熱。舌下有形如舌而小者。名重舌。

舌腫硬不和為木舌。舌伸出縮進不安。名弄舌。重木舌用

歸尾連翹白芷各三錢大黃煨甘草炙各一錢水煎食後頓服。

外用青黛黃柏末和勻敷之。一方蒲黃敷。一方用瞻星

研細點少許。一方用百草霜和硝滑石共為末。酒調塗之。

木古用玄明粉五錢川連末一錢食鹽少許竹瀝調敷

弄舌宜服化毒丹

頭面疳火方 治小兒頭面諸瘡。丹毒腮腫眼痛。用牛黃黃連

散用牛旁子一兩炒川大黃一兩生川黃連三錢共為末。每

服一錢蜜湯調下。外用松香三錢熬汁拌東丹鉛粉各二

錢為細末香油調搽。名三物丹。

丹毒方 遍身遊走赤腫。名曰丹毒。內服通神散散之。或玉樞

丹解毒。外用朴硝大黃等分為末。新汲水調雞翎蘸藥塗

之。一用伏龍肝不拘多少雞子清調敷患處。



眼痛紅腫方 小兒眼痛紅腫是風火上攻宜通神散熱甚化

毒丹 外用熟地黃一兩新汲水浸透搗爛貼脚心布裹住

有効 一用火硝一錢雄黃六分爲極細末吹入鼻中目中

流淚卽効

耳痛方 腎熱上冲耳中或痛或出水或流膿 耳中腫痛用

葱汁滴入 出膿流水先用綿紙撚撚盡膿水後以白龍丹

見雜症吹入 一用五倍子燒存性爲末吹入耳効 一用

黃蠟如豆大搓成條外用真蘄艾槌熱裹蠟條用火燒着烟

燠患處

鼻瘡方 鼻下兩傍瘡濕痒 膿流處卽又成瘡最爲可厭宜

用澤瀉鬱金山枝仁炙甘草等分共爲細末食後白湯調下

一錢外用甘草湯洗淨敷疳火三物丹

頭瘡方 小兒頭上生瘡最難除根 法先用葱頭花椒米泔

水煎湯洗淨瘡蓋後用臘猪油半斤熬滾入麻黃半斤同煎

煎至麻黃色黑枯撈去查以油搽瘡一加輕粉三錢尤妙

一方用柴油一盃放杓內煮滾入活蜈蚣一二條煎蜈蚣黑

枯爲度去查將油搽

瘡方 小兒剪瘡外傷風濕以致瘡瘡不乾用枯白礬龍骨



煨各五分共爲細末每用少許摻臍上 一用草紙灰敷

一用紅戔灰敷 一用蠶繭燒灰存性敷

小兒初患舌碎繼之遍身發熱一醫以傷風停食而用發散消導之劑予曰無益也服後果熱愈甚滴水難食復來求救予以黃連五錢煎湯徐徐與之終劑而愈其父問其故予曰若先身熱而後舌碎則因風食發熱以致舌碎固常事也今先舌碎知其心火亢甚加之身熱是內熱極而火外行耳

一小兒二三歲身熱驚悸易醫六七俱無寸効一日忽作鴉聲少頃其音已啞魚口開張予視之欲哭狀惟肩頭稍動終無

音出心甚憐之細思其策因以指探其口中唇乾舌燥予曰心熱欲言而不能果有之乎卽以黃連黃芩石羔麥冬五味山枝玄參花粉知母甘草清荷澄心竹葉劉一大劑煎成薄膏顛顛與之一晝夜而鴉聲復出又一日而音始全而愈自此之後此法活人無數大便三四日不行者加玄明粉二三錢尤驗驚悸者加金子同煎嗟乎人遇啞驚風俱棄之而不治孰知唇乾舌燥終屬陽症此法甚善故記之

嘉善魏交讓子予之表弟也年十歲患小腹痛三四年矣醫藥不効予診之脉來沉遲二便如常按之無塊此必腎家虛寒



也。六味地黄丸加炮姜肉桂青皮香附車前牛膝而愈。

淮安大商陳受伯第年十一歲。傷寒病起。幾至二百日。粒米不食。食即脹滿。諸藥不愈。惟日以人參三錢煎湯飲而已。載至吳中求治。予視之。骨瘦如柴。六脈沉細。投之參朮正相宜也。何無効驗。因搗心胸小腹按之硬塊已滿。手按則痛。予曰。憑脈則難用下藥。不下亦無生理。遂用當歸玄明粉各三錢。酒蒸大黃二錢。杏仁麻仁蘇子桃仁俱炒為末。各一錢。白芍川芎桔梗各七分。水煎服。服後即去黑塊二三十中。腕硬處下行寸許。然人已虛極。明日去大黃玄明粉。加人參二錢。服一

劑後。日復用大黃玄明粉。而去人參。又去黑塊一二十。如此。人參大黃間服半月。黑塊始盡而愈。

周忠介公孫女年七八歲。大便下血不止。遍問幼科。有用黃連犀角者。有用人參阿膠者。但無寸効。予診得氣口沉緊。予曰。十服末子即霍然矣。佩老母舅笑曰。何言之易耶。姑試之。三服而血止。索其故。予曰。人但知脾虛不能衄血。不知飲食傷脾。亦不衄血。今用消導之劑。食去則脾氣復而血自衄焉。得不愈其末子即沉香末也。

小兒在水閣風雨卒至。又驚。又寒。後至四肢厥冷。漸至遍身



惟心口稍暖此冷風入骨症也冷至心窩則死用理中湯加附子一錢數服而寒始退

畢前音育用入參何恩音則州中成平參則參口武參子曰  
固恩公公恩文平十八參大對下血不止酸聞酸採音原武重  
入參大黃開眼半月黑與酸採而愈  
條針日野風大黃支腸飲而去人參又去黑與一二十咬也

次科

調經

文科雖則有專工餘病皆于男子同惟有調經并崩漏胎前產後不相通小產乳疾及種子催生臨蓐各成功。調經大法在

補血血旺氣衰名曰從古人四物爲主劑隨症加減酌其中

四物湯歸芎地芍本方烏藥香附青皮蒼朮蘭丹皮及砂仁茯苓

本白朮俱良藥并草陳皮引姜棗先期而至再斟酌一月一

至方爲正先期而來虛熱症。或半月而來或二十日外而至加入條芩炒山枝

阿膠知栢亦能應母黃  
後期而至屬虛寒三十日外或四炮姜十五日至蘄



艾古人定寒甚須加桂附子附子童便甘草水煮三日用脉虛氣弱參芪任

將來作痛用延平血瘀塊痛桃紅順塊痛不止達通稜桂枝

辛散疼方定經閉塊痛亦宜添酒蒸再着大黃九次牛膝達小腹有塊疼痛

屬瘀血故用行經破瘀之品若還勞瘵經閉者另有良方非一論牛膝鼈甲

王方兼臨服童尿一盃經來不止是虛熱涼血補血是真

訣條芩酒妙荆芥炒黑及阿膠日久升柴不可缺若醫崩漏用櫻灰

續斷蒲榆黃妙二味血自歇經後作痛血氣虛加入參芪調補悅

脉來遲細屬虛寒炮姜人參自古設適來適斷發寒熱熱入

血室謬語說本方合用小柴胡病兼外感湯澆雪白帶皆因

濕熱流半夏白薇功甚黃山赤加連枝血分來日久升補真奇絕

用補中益氣湯或十全大補加升柴肥人煦滿去地黃加入星半南夏正相當脉遲腹

痛去白芍泄瀉當歸也要藏經行不止澤蘭去氣虛青烏除出

方

示吉日乾道成男坤道成女女以坤道用事上應太陰月天

之陰也三十日則周于天故女子之血亦三旬而一見血之

下也同于月故名之曰月事月事時下有子道也若月事不

調艱于得子皆因陰衰之故故古人用四物厚味之品味厚

為陰中之陰理能益血隨症斟酌者可盡其寒熱虛實之變



也如是而調之。月事調勻。陰陽和而萬物生。種子之道得其旨矣。

胎前諸症

女子懷胎須調。飲食起居俱要節。辛熱推蕩毒莫投。利水破血藥宜歇。古人安胎有妙方。白朮炒條芩炒。歸訣生地紫蘇及枳殼。白芍甘陳香附附鹽酒拌炒為末。砂仁炒末。水姜煎隨症加減。為君別。惡心惡食名惡阻。二三月姙有是苦。加入茯苓并山枝竹。縮半夏姜汁炙。不嘔去半夏。胎前去生地。脉遲胃寒姜木香。總去甘草病自可。胎氣不和腹滿悶痛。湊心腹子懸症。加入腹皮共

人參生薑四片。葱七寸。減去地黃白朮。苓手帶弩弦疼自定。

黃母水

子淋之症。又如何。小便赤色去不多。加入栢知通。竹葉日久升麻不可無。一用地膚草四兩。水四升。煎至一半。去渣。分三服。取自然汁亦可。或用地膚子入藥。子癰卒倒。

痰壅甚。言語蹇澁。人不省。茯苓半夏及川連。臨服竹節姜汁進。

蘇明

小便不通。轉胞症。胞為胎壓。水不滲。加入升柴及葱頭吐法。

托法功誠勝。

示吉曰。胞為胎壓。轉在一邊。水不得通。最為急症。治法有二。一看其母氣怯弱。不能舉胎而逼胞者。入味地黃丸。丹溪吐法。一看其母氣壯實。善飯胎必肥重。胎重而壓胞者。瘦胎飲



穩婆托法。若因過忍小便。以致不通者。滑石爲末。葱湯送下。一錢亦効。若用八味丸。須加車前。如不能速合。竟配煎藥。與之。并治漏胎尿出不知者。

丹溪吐法。用二陳四君四物三湯煎大碗頓服。以指探吐。吐出少頃氣定。又與亦然。予曾用之甚効。

托胎法。用一老成穩婆察其病處。若胎氣上者。以香油抹手入產戶。托起其胎。溺出如注。開後卽以參芪升麻大劑服之。或少有急滿。再托如前一法。將孕婦倒豎起。胎自墜轉。其溺濺出。似勝于手托矣。此症治緩則殺人。故予備述。

四肢浮腫如水氣。面目俱浮。子腫例。姜皮。腹皮。與茯苓皮四物并。芩暫時去。足指發腫。漸腿膝亦如水氣。難飲食。二三月見名。

子氣。天仙藤散。另有力。天仙烏附及并陳等。生薑木瓜。蘇葉入。

各三片。每服三錢。日三服。六君兼用。脾虛益。中氣下陷。用胸腹脹。

滿遍身浮。名曰胎水。不須憂。加入蒼腹并。子四物黃芩去不。

留不愈。鯉魚湯一服。木扶歸芳等分。剉鯉魚一箇。破腹。鱗。煎汁。

調末四錢。足生薑七片。及陳皮煎至七分。空心服。妊娠下血。

名胎漏。加入膠芪。艾炒就。淋漓不止。續斷君烏梅一箇。功能奏。

胎動痛時。治如何。阿膠參木加相奏。風寒頭痛去芍歸羌。



活。葱姜為主。救無汗。加醋。乘熱服。被蓋汗出。人無咎。若兼暑。  
氣入。香菇。黃連。木通。菟豆。知。泄瀉。去歸。加蒼朮。小便不利。澤。  
車施。食添。蒼朮。腹上好。嗽入。前貝。杏。桑枝。瘧疾。柴胡。并。  
知母。痢疾。通朴。腹皮。持。大便秘。加蘇杏。桔。臨服之時。蜜十。  
延。去白。耳聾。目暗。因火。甚小。柴胡。湯。合用。除。

達生

八九月間。達生散。服過數貼。無產難。腹皮洗淨。三參。陳蘇。各五。  
芍藥。白朮。當歸。續。各一。炙甘草。二錢。葱。五葉。能食。胎肥。黃楊。讚。春。  
入。芍。防。夏。入。芩。冬。加。砂。壳。秋。澤。真。多。怒。芩。柴。食。炒。麴。胎。動。芋。根。  
及金銀。湯。加。芩。麥。痰。加。半。氣。上。加。蘇。生。地。尋。

臨蓐

臨蓐之時。有主方。僊生甚穩。佛手湯。當歸。六錢。川芎。四。五錢。益。  
母水煎。管。冬天衣服宜厚。煖。若傷冷氣。名凍產。紫蘇。吳。黃。煎。  
熱湯。薰洗。下體。無憂患。夏月產室。宜貯水。溫涼。得所。人無累。  
黃蜀葵。子。用煎湯。調入。五苓。功為最。子死。腹中。症如何。面赤。  
舌青。脹悶。多。三錢。熟黃。二。分。麴。本。方。加。便。妙。無。過。唇。舌。俱。青。母。  
亦死。面青。舌赤。子活。疴。母主。交骨不開。加龜板。錢。為。未。血。餘。一。  
錢。和。勻。服。



示吉曰。懷胎十月。覺腰痛連腹。腹中轉動。卽產候也。進佛手湯一劑。俟漿水破下。產婦正身仰臥。兒自轉順。頭對產門。努力送出。名曰正產。若臨月忽然腹痛。或作或止。或三四日。或數日。胎動而痛陣不息者。名曰弄胎。或一月前忽然腹痛。水下似欲便產。却又無事。名曰試水。俱非當產也。不問胎水來否。宜寬心候時。服本湯調理。若坐草太早。或努力過度。或先期動手。風入產門。使生路腫脹狹小。以致累日不下。及橫逆偏礙之患。治之宜多服本湯。生血氣。益胞水。庶爲可生。如產經日久。氣乏。名曰宿疾。宜用赤小豆二錢。阿膠炒三錢。水鍾半。煎八分服。一法用皂夾末吹鼻中。令嚏卽生。

胞衣不下

產後何症最爲急。胞衣不下。腹悶極。皆因惡露脹胞中。漸冲清道。痛不息。若喘滿時。定主凶。脫衣散用從來得牛膝木。通各三錢。歸尾枳壳各二錢。入滑石四錢。冬葵子二錢五分。水煎熱服。應有益。產母自咬頭髮尾。得嘔噦時。胞自出。

按胞衣不下。急以臍帶斷之。以物墜住。使其子血脉不潮入胞中。則胞衣自當痠縮而下。總淹延時日。亦無害矣。只要產母心懷安泰。不可焦燥驚憂。古法取夫單衣蓋井上。立出一



用鉄秤椎燒紅酒浸少頃服。一用胭脂一張。溫水洗服。一用黑豈一合炒熟入醋一盞煎五沸去渣分五服。外用鞋底炙熱熨小腹上下三五次立効。

產門不閉

產門不閉是爲虛。胎前調得不相宜。補中益氣湯誠妙。加入炮姜香附醋炒醫。

子宮不收

玉門不閉或腫脹。熨熱疼甚。無量加味逍遙散所司。當歸芍藥白茯苓白朮甘草各一錢及柴胡芍酒炒加入丹皮枝二樣。若腫

消後用升提補中益氣如良相。

按子宮不收外治法。用荆芥霍香椿根皮三味煎湯薰洗。總之二症俱屬虛乏。升補爲急。切忌寒涼。

產後

產後總宜大補益。寒涼尅伐害非一。雖有雜症未治之。丹溪一言餘論息。主方加減產寶湯。熟地當歸香附方丹皮白朮白茯苓陳皮山查木通入姜灰少許及川芎益母甘草棗姜及煎成。童便添一盃加減再分虛與實。何者爲實。腹痛兼有硬塊。手難動。皆因惡露去不多。敗血停留爲病重。桃仁紅花牛內膝桂增。



蒲黃靈脂亦有用。何者為虛惡露多。昏暈不省。腹空痛。手按痛止。曰懶言。人參黃芪加亦中。去血不止。血虛熱。生地山枝。荆芥二味炒黑。截阿膠黃芪及烏梅益母丹皮除去絕。血暈之症。頭眼暈。神昏口噤。心下悶。薑醋薰法。自古傳。補新去瘀。暈自定。有痛須憑失笑功。失笑散用蒲黃五無痛參芪亦神應。脉滑有痰合二陳。半夏白茯苓陳皮甘草再加竹瀝姜汁進。

示吉日產後眩暈。譫語發熱。諸症須問其去血多少。及胸脇小腹有無痛處。有痛處手不可近者。及去血少者。瘀未盡也。行血為先。無痛處者。或有痛處。手按痛減者。及去血過多者。

血虛極也。補血為要。倘倉卒未及詳審。先用薑法。產後血暈。用韭菜細切。入有嘴瓶。中用滾醋沃之。急封其口。以嘴塞產婦鼻中。令醋氣透入。即醒。然後辨症用藥。蓋韭菜最能清胸中滯血。加以醋氣運達。用無不効。

產後噦惡。名冲胃。顛狂錯亂。冲心類。是皆敗血往上冲。五靈為末。半生炒三錢。兌送下童便酒來調。本方調理精神遂。

產後寒熱多屬虛。本湯調理又何疑。不愈柴胡并鼈甲。醋炙腹中塊痛。敗血欺增。入澤蘭桃紅。仁花漆失笑散。用亦相宜。若兼噦酸并飽悶。惡食惡心。傷食醫加入山查及厚朴。麥芽神麴効亦奇。



卷四

用真奇絕

逍遙膏歸甘草炙白芍酒炒柴胡入茯苓白朮加

丹枝水煎

後病如失

半身肉戰半身汗惡露不淨真希罕二陳四物加桃查煎成瀝

汁功不亂。

卒倒仆地似中風肢體抽搐達症同產寶須加半瀝汁發痊仍

添桂枝攻

聖惠愈風

湯名亦主治痢疾暑當歸身等分通爲末

三錢童便下豆淋酒下有奇功。  
豆淋酒黑豆不拘多少炒黑投酒中去豆用酒

大腸血少大便結生地壳紅不必說桃杏麻仁炒爲末減去木

扶姜益飲

泄瀉脾虛兼發腫蒼朮砂仁厚朴統猪苓澤瀉及麴芽除去當

病不

寫甚加肉果

食傷脾胃自飽悶作酸惡心泄瀉甚。加入蒼朮香砂仁。除去歸

地芎藭應

去血過多生惡心嘔噦不止虛寒形加參半夏并姜汁一加益

毋當歸熟地停。去三味。

因怒傷肝胸脇痛飽脹胸滿食不用木香延平青朴增不止柴

胡芍藥動



血虛煩燥易虛驚錯語失神臥不寧加入參朮砂麥丹姜益  
母去不存

痰迷心竅不能言瓜川枳人蒲梗實參菖枯添竹瀝姜汁臨服入去丹姜皮灰

附益母傳精神短少添遠志冬扶麥神生地服如仙

脾虛飽悶不進食砂仁白寇香朴入弓丹烏益四味除倍加白

木功奇特

升舉作痛腹有塊若無寒熱見枕類兒枕塊痛七日自止痛不移處作寒

熱花桂牛膝死血遂或合失蒸乳寒熱乳必膨青壳木通功為

最

骨節疼痛難轉側內無血養榮筋骨去血過多之故生地芍紅人參增

牛膝乳桂香官二味少許亦有益

小產

妊娠小產是何緣七情交攻厚味煎起居不時調理失或因跌

撲損傷兼大產如瓜熟自脫小產猶如生採然枝枯藤萎葉自

落病比大產十倍添因循不治滑胎症終身無子良可憐古人

保胎豫防法養血清火固胎元固胎湯用芍歸弓生地條白當川苓炒酒

白朮同參菴甘陳同膠艾砂仁香附氣多壅有痰再添姜半夏

脉數山枝亦可通三五七月服數劑螽斯之慶自無窮



示吉日凡人經淨種子之後最宜將息勿怒勿勞勿舉重勿  
遠行勿洗浴勿復淫火以擾其子宮而多服養肝平氣清熱  
養血補脾之品胎自固矣蓋墮胎之症在三五七月者多在  
四六八月者少臟陰而腑陽三月屬心五月屬脾七月屬肺  
皆在五藏之脉陰常易虧故多墮耳唯一月之內墮胎人但  
知不受妊不知其受而墮也一月屬肝大怒則墮多洗下體  
竅開亦墮一次既墮肝脉受傷後則必應乘其虛耳故人無  
子者宜預服調經種子之藥以保一月之胎予家四金匱丸  
出自秘府實有挽回造化之功屢用屢驗調經種子如神

敢自秘謹附于後以廣生生之德云

四金匱丸

香附六兩

用黃栢山枝各二兩同浸炒

川弓續斷白朮白茯苓

當歸山藥白芍

俱酒洗炒各四兩

青皮砂仁

俱炒

白薇

酒洗各二兩

條芩

酒炒

生地

酒洗各四兩

為末山藥淡醋湯糊丸醋湯下蓋條芩白朮安

胎聖藥養胎全在脾胃譬之鐘懸于梁梁軟則鐘下墜折而  
墮矣故用白朮若條芩力能清下焦實火火去則陰自足一  
增其利一去其害又何小產之足慮哉

赤白帶下

奇經八脉帶居一橫于腰間如帶束病生于此故取名方書分



爲五種錄

色如青泥屬肝。紅津屬心。形如白涕。經行產後風人。

胞傳于臟腑生病

出婦人。東垣之論主亡陽。東垣云。血崩久。則亡陽。故白滑。

之物下流。未必

丹溪濕熱痰積屬。丹溪云。帶下是濕熱爲病。治。

宜升

白屬氣。分赤屬血。徐用誠言。真可讀。清源收帶有妙方。其。

術歸參升柴局

茯苓半甘。陳弓香附。水煎姜棗。空心服。生地黃。栢。

瘦人添延平小

茴腹痛兼。去冬加姜灰法。玄妙。防風山枝色青。

先紅白黃連枝

子用黑合六味地黃煎。

示吉曰帶症病原不同。治法各異。如病婦肥白。無病容。或昔

肥今瘦。脉來沉滑。濕痰也。如飲食減少。四肢無力。帶下多白。

胃中痰積下滲也。如婦人久病寒熱不齊。夜輕日重。或自汗

脉大無力。氣虛下陷也。如兼潮熱。夜重日輕。肌黑形瘦。盜汗

骨蒸。脉細數。血虛火熱也。如因不得于夫。七情抑鬱。鬱而

爲火。以致帶下鬱也。濕痰宜滲濕消痰。海石半。夏南星。黃栢。

痰積宜消痰升提。二陳加二朮升麻柴。下陷宜升提補氣。

宜六君子湯加。火熱宜滋陰養血。四物湯加黃栢。梔根。鬱。

氣宜開鬱行氣。越鞠丸加。分條而治。自得病情。東垣用葵。

花治帶白者治白。赤者治赤。須炒黑用神驗。肥人用瓦龍。

子以燥其濕。



乳疾

陽明胃經主乳房厥陰肝經乳頭庄醇酒厚味兼憤怒胃肝火動癰疽妨堅硬如石名石乳婆婆多口乳發方吹乳發于乳嘴上乳漏之症生兜囊不痛不痒如桃核乳巖潰後病難當有子吃乳外吹症兒口熱毒吹乳病急須消散易為功因循潰後醫難應軟溫飲子是煎方總治乳疾能接命柴胡赤芍并木通黃芩瓜蒌青皮順甘草桔梗共當歸乳香沒藥山甲進廣膠三錢酒水煎痛甚角刺橘葉滲托裏黃芪及防風解毒銀花翹貝順示吉曰乳症消散為易潰後收斂為難蓋其形內懸垂而血

易滿也然乳癰為輕石乳乳發為重乳癰費日尤可望愈乳巖一潰不可救矣胎前乳癰為內吹產後乳癰為外吹外吹若潰乳至即膿最難收口初起乳汁不通結核腫痛遠宜揉散或忍痛吮出惡汁或用木梳頻刮乳房乳汁一通核自消散倘不愈急用葱熨成餅攤乳上一指厚用灰火一鏹覆之須臾汗出腫消內服瓜蒌散亦妙黃瓜蒌子多者一當歸甘草各五錢乳香沒藥另研各一錢水酒煎服若結核乳巖兼用八珍湯加青皮柴胡麝香少許尤妙秘方治吹乳乳汁不行猪牙皂炒蛤粉等分為末每服一錢陳酒送下一方諸般



乳病內消。用大黃白芷鼠糞當歸等分爲末。每服三錢陳酒下。毛公威驗過。

### 女子月事胎產脉法

玄黃之精妙合而凝。乾道成男。坤道成女。女子以坤道用事。故陰盛陽衰爲順。左爲陽。右爲陰。寸爲陽。尺爲陰。是以女子寸脉常弱。尺脉常盛。右脉常盛。左脉常弱。此與丈夫之脉不相同之。大綱也。更有不相同者。惟月事胎產之脉。經云女子二七而天癸至。任脉通。太衝脉盛。月事以時下。故有子。王太僕曰。陰靜海滿而去血。陽動陰合而泄精。二者相資。故能有子。卽易所謂男

女構精。萬物化生也。其有子之脉若何。經曰。足少陰脉動甚者。妊。又云。陰搏陽別。謂之有子。十月旣滿。子欲受生。則有離經之脉可考焉。離經者。離其常經。謂脉來數急。或沉細而滑也。迨及產後。脉來沉小。緩弱爲吉。何也。脉爲血之充。產後則心生血。肝藏血。其生藏者有限。血送胎下無窮。不足症也。若脉來弦實洪大。是爲脉症相反。其能久乎。搃之產後之脉。現微細。不責其不足。胎前之脉。現洪滑。不責其有餘。臨蓐之際。沉滑而數。不責其熱。調經之時。遲數不等。方辨其病。此爲女子脉法之要。從此而益求其精。有何病之不愈哉。



調經脉法

診脉沉遲主踰期不至少腹冷痛。脉弦數主先期而來或有  
黑紫血塊。弦滑而沉主月色淺淡或雜色如魚腦或帶下多  
白。脉微瀝主月來血少或過期不至。沉實主經行著氣腰  
腹疼痛。六脉俱微主榮衛皆虛月事前後不均或來欠少或  
淡白色。陰脉虛陽脉搏手主血崩。二尺芤主血海敗。微  
細而數主骨蒸血少經閉不行。脉來狀如琴絃若小腹痛主  
月水不利孔竅生瘡。少陰脉滑而數者陰中生瘡。少陰脉  
弦者白腸必挺出。胃脉瀯少陰脉微遲微則無精遲則陰中

寒瀉則血不來此爲居經三月一至。漏血下赤白脉遲者及  
芤小虛滑者生急疾者及大緊實數者死。  
妊娠脉法 王冰曰陰搏陽別謂之有子者陰中有陽故尺脉  
搏擊于指與寸口殊別也。王叔和曰診其少陰脉動甚者妊  
子也少陰心腎也心主血脉腎名胞門子戶二脉動甚妊娠何  
疑。王肯堂曰懷胎二三月之脉兩寸浮大兩關滑而尺微帶  
數者此真胎脉。妊娠四月可分男女左疾爲男右疾爲女俱  
疾主主二子。又法尺脉左偏大爲男右偏大爲女左右俱大  
主產二子。妊娠五月脉來數疾不散。六七月脉來實長若



沉遲而濇。宜防胎墮。八月脉喜弦實。忌沉細。若少陰微緊。主兩胎一傷。臨蓐脉法。離經之脉。一息六至。或六脉沉細而滑。若兼中指本節跳動。臨蓐之徵也。如忽然浮大。必主難產。看唇舌。若青黑沫又出者。爲母子俱死。若面赤舌青。母活子死。面青舌紅。母死子活。

產後脉法。產後之脉。診得緩滑。及沉細附骨者。生。若見實大弦急。及寸口疾濇不調者。死。肝脉虛散而數者。主血暈。左手三部堅牢。主血氣冲心冲胃。胎前尺脉沉滑。產後不減者。主兒枕痛。兩尺脉芤。主去血過度。右手三部虛散者。主惡

露不止。蓋氣不足以固血也。微細而數。主血虛發熱。日輕夜重。六脉微細無神。主蓐勞自汗。右關沉而有力。主傷食發熱。噫酸惡食。產後傷寒熱病。脉宜微細。不作陽病。見陰脉論也。丹溪曰。胎前脉細小。產後脉洪大者。死。

一婦年四十歲。有十餘年不受胎矣。月事前後不准。而又無子。脉來微細。兼數。予製女宝丹。服至百日而孕。後產一男。一女子二十餘歲。有孕至五月間。必墮。已三四次矣。予亦以女宝丹加減付之。卽產一子。

女寶丹 調經種子如神。兼能安胎保孕。



當歸六兩酒洗

生地六兩酒淨

白芍藥酒炒三兩

川芎酒洗三兩

芸白朮六兩土炒

條芩酒炒四兩

陳皮炒三兩

香附童便益酒醋四製四兩

阿膠酒浸溶蜜內三兩

砂仁炒二兩

已上如法製度為末另將益母草

二斤半煎膏和煉蜜及阿膠為丸丸如桐子大每服五錢空

心白湯送下月事後期來者去條芩加乾姜灰一兩岐艾

二兩肥者加製半夏三兩白茯苓四兩有白帶者再加白

薇四兩氣虛甚者加人參三兩茯苓四兩山藥四兩如

安胎用白蜜丸不用益母膏如腰痛加山藥杜仲各三兩

一孕婦瘧疾大作脉得弦數予用知母四錢柴胡三錢陳皮二

錢甘草一錢井河水各一碗煎至一碗露一夜明早隔湯頓

溫服而愈不愈加生何首烏五錢自盜汗甚加黑薑三

錢食多加枳壳二錢此方熱多者宜之

一孕婦瘧疾右脉微滑左脉微弦予曰脾虛生痰也以白朮五

錢生薑三錢井河水煎露一夜溫服而愈此方寒多者宜

之

一孕婦痢下赤白裏急後重逐滯利水俱不可予曰惟清血調

氣法也用姜汁炒黃芩黃連各一錢蘇梗當歸各錢半炒白

芍藥豆山藥茯苓澤瀉車前枳壳各一錢木香五分甘草二




分煎服數劑而愈

一新產發熱服藥不止。予以益母草煎湯。加童便與之熱遂退。蓋胎其脈平和惟稍數故也。

一新產發熱投之四物及童便姜灰之類。不應予診其脈。右弦滑左微細。予曰是必嚙酸飽悶停食故也。以神麴山查厚朴枳實加入前方而愈。








醫宗說約

四

終

内閣文庫			
番號	漢	15475	
冊數		4	( 4 )
函號	田	33	1





醫宗說約外科卷之五

古醫官丁漢壽示吉仲芳武述

姚江後學七惠公感天恭

婁東張浩而如氏訂

吳縣晉仙鍾英氏訂

外科賦

瘡瘍疔症歷代推詳膏梁八厘變而為內經表裏三因治法  
分乎先哲

經云膏梁之變足生大下又云諸難腫筋攣官漏者此寒氣



之腫。八風之變也。又云諸痛痒瘡瘍皆屬心火。三因詳後。火氣微甚。河間推痛痒之原。

河間曰。人近火者。微熱則痒。熱甚則痛。附近則灼而爲瘡。皆火之用也。或痒痛如針輕刺者。猶飛迸火星灼之然也。或疑瘡瘍皆屬火熱。而反腐出膿水者何也。猶穀肉菓菜熱極則腐爛而潰爲污水。火熱過極。反兼水化也。

氣血少多。丹溪分經絡之異。

丹溪云。瘡之要害處。近虛處。怯薄處。前哲已論及之。惟分經之言。未之會聞。何則。諸經唯少陽厥陰經之瘍。理宜預防。以

其氣多血少也。其血本少。肌肉難長。少陽更有相火。遽用破毒之劑。以伐陰血。禍不旋踵。訣曰。多血多氣。君須記。手經大腸足經胃多氣。少血有六經。三焦膽腎心脾肺多血。少氣心包絡。膀胱小腸肝無異。記此則知氣血多少之異矣。

外科精要五善七惡。自明此事難知。九死地分宜識。聖濟錄名色固詳。朱李書論方斯驗。竇氏之徒擅針經之妙。毓仁之輩補思邈之方。熟味羣言。勾述玄奧。欲明大旨。先分平病之人。要識安危。宜究陰陽之症。

示吉按。啓玄子曰。經脉一周于身。凡長一十六丈二尺。計人



之息共一萬三千五百定息。平人一息。脉行六寸。漏水下百刻。則氣都行八百一十丈。正難經所謂一日一夜榮衛行陽二十五度。行陰亦二十五度。共百十度。周于身也。丹溪曰。得熱則行速。而太過得寒則行遲。而不及。予按行速。熱也多。兼實陽症之所由生。若兼虛。後必陷為陰。行遲。寒也多。兼虛陰症之所由生。若兼實。後必返為陽。陰陽二症詳後。

內因之故。厚味薰蒸發熱。更兼七情內攻。外因之原。風寒暑濕傷人。亦為乘虛襲體。餓飽勞役失節。是名不內外因。更有冷熱不均而至。金石燒煉常服。是因藥毒內傷。外有痰鬱兼發而來。

三因既明。部位宜審。督脉通于背脊。背側二行。太陽是其本經。背分五行。中間係奇經督脉之道。兩傍四行。乃足太陽膀胱經之部分。

任脉行乎腹中。臍側兩傍三陰是其所屬。

腹分七行。奇經任脉從前陰起。由臍中。上咽喉。至承漿而止。臍傍第一行。一寸。足少陰腎經之部。第二行。一寸。足陽明胃經之部。第三行。一寸。足太陰脾經之部。第四行。一寸。足厥陰肝經之部。乳根屬足陽明胃。乳傍乃手三陰經所起。

足少陽經循脇肋行身之側。足陽明經由乳中。行身之前。頭為



諸陽之會。面爲三陽之交。手背爲陽。手之三陽。從手走至面。手心爲陰。手之三陰。從胸走至手。足之外。肘爲陽。足之三陽。從足走至頭。足之內。肘爲陰。足之三陰。從足走至腹。唇爲脾竅。舌乃心苗。目集五臟之精華。鼻通肺家之呼吸。腎竅于耳。足少陽經。膽達耳之傍。胃通于乳。足厥陰司乳之頭。跨馬囊。癰肝家之部。喉癰。臍發任脉之司。

先明部分者。如毒見于背。見于腦中。屬督脉。傍屬足太陽經。也。見于鬢。屬手足少陽經。見于脅。屬手足太陽少陽經。見于頤。見于髭。屬手足陽明經。見于腮。頤屬手陽明經。見于顙。屬

手太陽經。見于穿腦。屬督衝任三經。見于腿。外肘屬足三陽。內肘屬足三陰。見于臂。從手背赤肉。屬手三陽。從手心白肉。屬手三陰。見于乳。內屬陽明。外屬少陽。頭屬厥陰。逐部推求。治療自驗。用藥引經。如太陽用防風羌活。陽明白芷升麻。少陽用柴胡太陰用白芍升麻。少陰止宜獨活。厥陰用青皮柴胡。佐之以桂麻。藥力直攻患處也。

經絡已清。引經之法有驗。惡症須識費人之謗。不生脫疽并疽。及腎疽。天疽。銳毒。醫之何濟。對心雙發。及對口。蓮子蜂窠。急治乃安。



陳毓仁訣曰發于心上出心經五臟乖張事可明名曰井脾

家積毒生肩脊發于肩下脊上腐脾厚味發熱積毒所致高腫鮮明根不過肩者順心經火毒

對心臨背上對心而發形截督脉兩肩左右雙生發肺肝積

毒不虛稱左搭手属肝右搭手属肺俱生蓮子蜂窠防毒陷

孔似蜂窠實如蓮子二發多生于背與心相近與脊中腰間

腎俞發難生生于兩腰內陷肉之間或生兩腰中間椎上毒

活高腫為膿急以人參養榮湯合地黃丸療救之督脉經虛從項發俗名對口治宜

精生于項後而對前口故名對口但有偏正之不同正者屬

俗以正為重偏督脉易于起發治反易偏者属太陽經瘡多平塌治反難

為輕庸說也何期耳後多生發大疽銳毒病非輕左天疽右銳毒

生耳後一寸三分陷中是瘡發所發毒從肝肺來形多堅又

硬頭多隱伏未潰先黑臭積易生氣易敗多致不救又

有脫疽生手足或生口面命難保此症如粟漸大其色如褐

不知痛痒熱臭難聞小兒多從積熱積毒大人多因服石

燥熱古人雖有割截之法予見三人俱至七八日而死

示古曰諸症皆因瘡勢之治大積毒之最深地分之險惡故

特拈出然瘡之足以傷生者不止于此也背上有九處入髮

際為玉枕又為舌本一也頸項節二也第三椎為崇骨三也第四

椎為玉藏四也肺俞五也脾肝俞六也腎俞七也後心對鳩

尾鳩尾即心蓋骨八也鳩尾骨穴九也正面六處喉骨為垂骨一也

胃為神舍一也心鳩尾三也兩乳穴四也臍中為神闕五也



臍下二寸為腸屈間六也共十五處俱忌生癰外腦髭鬚顙迎香瞳子膠之間者俱地分之所忌然種種地分皆脉絡所會內系府臟若病者調攝得宜醫者補瀉無失亦可起死回生苟不知此將息失宜治不對症雖發于不死之地分吾知其不免矣。

看病之淺深分毒之臟腑大而高起屬乎陽癰也六腑所發平而內發屬乎陰疽也五臟所生疽重而癰輕最輕者初起無寒無熱是熱癰之浮于膚上。

凡瘡初起不發寒熱高腫于皮膚之間淺而小最大不過一

二寸者曰癰。六腑積熱發于肌膚之間高腫而痛如碗如盆曰癰。五臟積熱攻注肌膚初發如粟或如莢許與肉俱平而不高腫或作赤色時作痺痛曰疽。

陽善而陰惡所慮者其症半陰半陽須司命之決于喉中初起焮疼頂如尖字惡寒發熱陽可知二七之期膿漸至。

訣曰癰疽須分陰陽症純陽初起必焮疼微惡寒時身又熱。

頂如尖字高突形腫似彎弓根紫束高腫氣足根紫束血足也二七之期

膿漸侵陽瘡以十四日為關一七焮痛二七膿成二便如常口有味腫消膿潰復

精神痛隨膿減生新肉新肉紅色如榴子者吉腐皮將斂白星星此屬



純陽誠是善隨時調治自功成。

初起溫頑形如粟米。無熱不渴陰為逆。一七之後倦怠生。

訣曰純陰之症。症何如初如粟米。人不知吃瘡。僵頑不紅腫。

無疼少熱不嫩時。七日之後身倦怠。瘡根平大實難支。氣虛不能

起。被則瘡頭平而不高。血虛不頂。不高尖。根不活。色無光采。

腐膿遲陷。軟無膿。空結聚。精神昏憤。氣難舒。飲食少減。身戰。

慄。瘡形紫色。寡無施舌。強咳喘。純陰症。總有靈丹不治之。

半陰半陽死生難卜。脈數無力。形似半昏。半爽。半平。高。食難消。

運。症見微寒微熱。微赤腫。投方應病。方得陰轉為陽。腐去生新。

亦可回生起死。

訣曰陰陽相半死生交。善惡相兼。細辨昭微。熱微寒微。赤腫。

半昏半爽。半平高。脈來雖數多無力。飲食雖食難運。消腫而。

不潰。因脾弱。潰而不斂。為膿饒。大便多澀。小便數。上身有汗。

下身隼。五善雖兼有。七惡未全逃。口渴喜茶。腸腹痛。面浮唇。

飲足。心高。心煩不穩。睡神亂。怕音隼。投方應病。方為妙。陰轉。

為陽。漸可調。

外症已審。脈法宜明。氣血沉瀆。脈來緊身有痛處。即發瘡疽之。

兆。身應發熱。脈浮數。人反惡寒。即為瘡疽之萌。



仲景曰脉數不時見則生惡瘡。又曰肺脉俱數則生瘡。

初起實大洪大為病進。已潰者為邪氣未退而留連。潰後沉實

沉伏為餘毒。初起者主邪氣深伏而難痊。潰後脉乳滴遲緩脉

症相應無妨也。若短細則將變症。此六脉總不初起脉浮大洪

數邪正相搏有餘也。若促結則非吉兆。此六脉總不浮大浮數

瘡必高腫。宜發表而忌攻利之方。高腫者毒在表經所謂汗之

過反傷元氣。沉數沉實邪必內藏。其外症不欺腫高赤宜疎通而除

發表之劑。平塌漫腫宜內補托而益其虛。不浮不沉當和榮衛

而解其勢。初起宜疼不宜痒。潰後作痒乃有長肉之功。潰後遍

風乘虛入宜潰後宜痒不宜疼。初起不疼乃有純陰之咎。不痛

大痛非佳症。或麻或痒實難醫。脉症初詳善惡細辨善不止于

五。飲食知味二便調動息寧靜者吉。惡不止于七。嘔吐藥食目

上視神氣昏沉者凶。善者五藏未傷。善候并至則生。惡者五臟

已損。惡候并至則死。惡證忽有二三宜當深懼。善候乍見一二

便可回生。

五善訣曰心善精神爽言清舌潤鮮瘡疼兼不渴睡醒得安

然肝善身輕便因煩自不煩指頭紅活色坐起覺平康

脾善唇滋潤衾無穢氣藏凡食俱有味膿厚更肥黃肺善



聲音響無痰韻更長。皮膚多滑潤。大便自尋常。腎善誠爲  
要。水升火降良。口和因不渴。小便利清長。  
七惡訣曰一惡神昏憤。心煩舌上乾。瘡形多紫黑。言語自呢  
喃。二惡腰身強。目睛邪視人。瘡頭流血水。驚悸是肝迪。  
三惡形消瘦。膿清臭穢生。瘡形多軟陷。脾敗不知疼。四惡  
皮膚稿。聲嘶韻不長。痰多兼喘急。鼻動肺將亡。五惡成消  
渴。隨飲卽隨乾。形容多慘黑。囊縮腎凶端。六惡身浮腫。腸  
鳴嘔飢頻。大便多滑泄。臟腑並將傾。七惡瘡倒陷。形如剝  
繻。同四肢多冷逆。污水自流通。

示吉曰五善七惡方書俱載。此訣尤備。故錄之。然亦不止于  
此也。如膿成不自出。失導引者死。膿成不針烙。反敷藥者死。  
熱痛正甚。失治則毒內攻者死。毒內攻後。不服藥。反針烙者  
死。潰而至于透內膜者死。潰喉者死。未潰而陷。面青唇黑。便  
汚者死。陰入腹。入囊者死。高腫不托裏。反用下藥者死。漫腫  
不內托。反用寒涼攻利者死。潰後誤用寒涼。致瘡紫黑者死。  
故治者不可不早。亦不可不審也。

善惡明而生死自分。虛實辨而補瀉方得。氣實者瘡頂高而突  
起。虛則平塌之可憂。血實者瘡根水而鮮明。虛則漫腫之有咎。



瘡之虛者腫平膿稀軟曼。瘡之實者腫起堅硬膿稠瀉痢腸鳴。脈弱皮寒飲食嘔而手足冷。臟腑之虛可知。胸腹滿脹身熱。脈大飲食如故。二便調。臟腑之實有驗。瘡口不合膿稀肉冷。自汗色脫者。乃氣血之虛。寒熱疼痛高腫色赤。膿厚肌熱者。乃血氣之實。上實則口渴飲冷。目赤頭疼鼻不通。下實則小便如淋。腹中膨脹大便結下。虛精滑洩瀉。脈沉足冷。最爲凶。上虛則目閉神昏無熱不渴。真爲逆。邪氣甚則實。腫焮疼痛日久不潰。大便秘而小便淋。真氣奪則虛。色敗音嘶。睛不了了。食無味而身體重。初起皮肉未破。其實也固然。一毫熱藥不敢用。潰後膿血出多。其虛也固宜。一毫冷藥何敢投。寒必尅伐過攻。有反善爲惡之弊。保元托裏常服。致補虛回陽之功。爲實補虛得宜。次序投方自効。初起之後七日之前。內治之法有三。托裏疎通和榮衛。機要云。治瘡大要須明托裏疎通和榮衛三法。毒邪在內。則痛深。脈必沉實。外症發熱煩燥。大便秘。瘡腫木悶不焮赤。宜用寒劑疎通臟腑。毒邪在裏。則痛淺。脈必浮數。外症焮腫。作痛。二便調和。或惡寒發熱。拘急頭疼。恐邪氣外極而內行。故先托裏散之。毒邪在經絡中。外無焮惡之氣。內亦二便調和。食如常。口知味。不惡風寒。止于熱燥。其脈不浮不沉。



知邪在經絡中也。宜調和榮衛。

外治之法不一。藥圖湯漬艾火攻。

示吉日。凡瘡初起。不發寒熱。便高腫紅痛。癰也。其毒最輕。外用神應丹。四面圍之。中空一頭。或頭上點白降丹一點。即得消散。不消。或服神化可。或神仙活命飲。即愈。若瘡初起。即發寒熱。癰疽也。其毒重。不論陰陽二症。俱用艾火灸之。瘡腫初生。古人用藥湯淋射。蓋氣血凝滯。則為癰腫。得熱則腠理通。經絡暢。誠至理也。其法以藥煎濃湯。瘡在四肢者。則塌置之。在腰腹者。則淋之下部者。則浴漬之。仍以淨布蘸水。浸

其患處。水涼再換。

寒熱頭疼。脉浮數。托裏散邪。發其表。

經云。汗之則瘡已。東垣云。瘡勢奮然高起。結硬而痛。色赫赤微帶黯色。其邪在血脉之上。皮膚之間。急發其汗。則毒隨汗散矣。宜荆防敗毒散。冬月萬靈丹。脉虛者。四妙湯。內托復煎湯。

示吉按仲景云。瘡家雖身疼。体痛。不可發汗。汗之則發。淫。此為瘡家復傷寒者說也。若瘡初起。七日之內。惡寒發熱。頭疼身痛。瘡尚腫。身無汗。二便如常。脉來浮緊。浮數。表症居多。非



汗不愈。若汗藥誤投之。于已潰之後。或表邪俱去之時。其禍亦不止於瘡而已也。

煩熱便閉。脈沉實。疎通臟腑。絕其源。

張潔古云。有裏者下之。陳實功云。大便秘燥。通利相宜。陳文治云。脈沉實。發熱煩燥。外不燉腫。赤痛。乃邪氣深伏在裏。宜先疎通。宜衛生湯。熱結甚者。內疎黃連湯。

示吉曰。據東垣之意。瘡瘍面赤。雖伏火熱。鬱不得攻裏。爲陽氣怫鬱。邪氣在經。宜發表以去之。雖大便數日不見。亦宜多攻其表。發散陽氣。少加潤燥藥以潤之。薛立齋云。腫瘍內外

皆壅。宜以托裏表散爲主。如用大黃。寧無孟浪之非。若此則大黃之難用也明矣。而丹溪又云。大黃治癰疽之要藥。豈諸名家亦相矛盾乎。蓋癰疽初起。有六經表症者。大便如常者。脈浮緊。浮數者。邪氣在表。斷不可下。若表症不現。大便燥結。口渴引飲。脈浮沉實。沉數。瘡頭堅硬不起。若不用大黃。將何以宣通臟腑。邪初虞世云。癰疽初作。須以大黃等藥。急搏利之。勿以困苦爲念。此亦一偏之說。不辨表裏。胡可爲訓。總之真知其實而瀉利。真知其虛而補益。浮露而淺者。則外消。藏伏而深者。則內托。庶無弊也。



并無風寒之病形。內無便溺之阻寒。腹中和。舌知味。病在經絡。  
先和榮衛。

通用神仙活命飲當歸黃芪湯四妙湯

火攻之法宜施早

凡瘡初起。不論陰陽俱用艾火灸之。是開門逐賊法也。其法  
先以濕紙復瘡上。立視其紙先乾處。乃瘡結頭處也。用獨蒜  
頭切片。如三錢厚。貼瘡頭上。以艾在蒜片上灸之。每三壯一  
易蒜片。不痛者灸令知痛。痛者灸令不痛。為度。如瘡大者。以  
蒜持爛鋪瘡上。亦鋪艾蒜上灸之。一二日初發時灸可立愈。

三四日十愈六七。若過七日之關。膿將成而不可灸矣。古人  
蟬蟪蟲去兩頭隔艾灸法。豆豉為末。溼津作餅灸法。取淨土  
水和作餅灸法。秘方用南星半夏為末。薑汁調成餅灸法。其  
灸法俱與蒜灸同。各隨其便也。

示吉曰考之方書。頭上瘡面疔毒。腎俞發。俱禁艾火。以頭為  
純陽之位。生瘡則熱亢極。面疔為陽毒。腎俞發為亢陽燥陰。  
灸之恐以火濟火也。此言甚善。然又見此症。因灸後而愈者。  
如元好問腦疽。東垣灸之百壯而愈。陳文治曰。疔毒藥力不  
能速到。非艾火不解。此又當酌量艾之大小。壯之多少而行。



矣。然灸之不穩。不如再行他法。病人元氣素虛。肢體倦怠。精神昏憤。瘡形平塌。脈來微散。空虛及素畏火者。俱不可灸。灸之恐生昏暈。且無真氣抵當大力。有損無益。亦陳實功之至言也。凡遇此症。急用白降丹點頭上。拔其毒氣。內用四妙湯托之。

樂園之方隨症投。

示吉日瘡之外見雖同。而毒之內因各異。有因微熱外攻而發于皮膚之上。高腫熱痛。俗所謂熱癰者。用大黃朴硝為末。醋調敷可也。有因氣血不和。留滯而發于肌膚之間。堅硬癰

痛者。宜用辛散攻反之品。如神應丹是也。有因氣鬱痰生。發

于頸項皮膚之間。腫硬白色。不甚疼痛。用南星半夏為末。姜

汁調敷可也。星半為末。姜汁和為餅。隔艾灸尤妙。有因陽極而發。高熱疼痛。書

所謂癰者。宜用清涼之品。抑陽散是也。花粉三兩。姜黃白芷赤芍各一兩。為末。茶

湯調搽。有因陰極而發。平腫不紅。書所謂疽者。宜用溫熱之

品。抑陰散是也。用草烏白芷赤芍南星各二兩。肉桂五錢。為末。葱湯調塗。熱酒調敷亦可。有因潰

後氣血虛而漫腫者。宜用收清之品。鉄桶膏是也。詳種種不

同。俗以一二種藥。果治諸病。其能愈乎。丹溪云。敷貼之藥。止

可應酬。輕小執症耳。若不辨其陰陽所由。分妄敷涼藥。其禍



不小。此說不易之論。然即對証調治。止可圍瘡之四傍。中空瘡頭。用白降丹點上。以拔其毒。自無倒陷之悞。降丹有拔毒之能。藥湯有疎通之妙。

秘方白降丹。是陳珍如先生所傳。珍如幼患惡瘡。危在旦夕。遇異人傳授此方。降煉點上。其毒立愈。此丹點瘡頭上。初起者。即消有膿者。即潰。頑肉即化。拔毒去腐。功難盡述。方附後。湯腫湯。用木香犀角大黃升麻黃芩黃連射干黃柏白斂耳草朴硝檀香枝子生地羚羊角各一兩。和勻。每用五兩。以水以斗煎。七升。入麝香一錢。淨綿蘸藥熱湯腫上。一日兩三度。

冷即再換。

火毒方熾。辛熱溫劑。休嘗膿血將成。寒涼敷藥。其過寒涼敷藥。其患最大。氣脉得寒。則不行。瘀血得寒。則不散。瘀肉得寒。則不潰。新肉得寒。則不生。

七日之後。將已成膿瘡頭。已見黃色。外宜拔而內宜托。燈焰甚佳。

七日之後。瘡頭見黃色。竟用白降丹點上。升頭拔毒。上用太乙膏掩之。以防風邪外入。每日用葱艾煎湯洗淨。再換膏藥。大約在十一日前後。膿出痛定。是陽瘡之順候也。內服四妙。



湯黃芪當歸湯托之。若八九日後瘡勢已定。毒氣已聚。尚未成膿。須用神燈照法。

二七之期。定行穿穴。瘡中大流膿水。外宜升而內宜補。洗法亦妙。

凡瘡潰後輕者。痛隨膿減。先用葱艾煎湯洗淨。敷上紅升丹。拔毒呼膿。外用膏貼。以防風襲。內服托裏湯。十全大補湯。壯日自愈。若瘡勢浩大。須用猪蹄湯洗法。

護心護膜蠟礬丸有妙用。補血補氣。八珍湯有神功。若仍堅硬而難潰。原須拔針之點。頭反生煩燥而昏沉。不免藥筒之拔毒。

凡瘡十日之後。是膿腐之期。若仍堅硬。須用拔針。當頭點入寸許。開竅發泄。是開門逐賊之法也。若雖不作膿。形尚紅活。焮熱腫痛。不必用針。竟用白降丹點頭上。內服補托之劑。如瘡過半月。仍不膿潰。反生煩燥。重如負石。恐毒內陷。攻心急用披針。品字樣。當原頂寸許。點開三孔。隨瘡之淺深。一寸二寸皆可入。針不痛。針深不妨。針後隨用藥筒拔毒法。其法用新鮮嫩竹一段。徑口一寸二三分。長七寸。一頭留節。用刀刻去外青。留內白一半。約厚一分許。靠節鑽一小孔。以柵木條塞緊。外用羌活獨活紫蘇岐艾鮮菖蒲甘草白芷各五錢。連



醫宗金鑑 卷之五  
鬚慈二兩共放入筒內筒口用慈塞緊將筒橫放鍋內以物壓住勿令浮起用清水十大碗煮筒者數滾約筒內藥濃熟爲度用大磁鉢連湯盛貯患者楊前針後將筒藥倒出急用筒口乘熱對瘡合上以手捺緊其筒自然吸住約待片時藥筒已溫拔去塞孔木條其筒自脫再看筒中拔出何物如鮮明紅黃膿血相粘者吉如敗血氣穢紫黑秬水者死內服之品切戒尅伐寒涼外治之方正宜箍根長肉潰後若根脚漸開紅腫不散惡症也宜鉄桶膏箍之過此之後去腐生新膿潰腫消痛隨膿滅新肉已生紅燥

皮將斂白漫漫尅日功成夫復何慮若榮衛衰弱潰瘍之變無窮倘調治謬差惡候之來難免膿熟自潰易斂爲吉癰疽膿熟勢盈欲溢用白降丹點上半日自潰不潰宜開針烙各異皮薄腫高毒淺癰也宜針皮厚腫堅毒深疽也宜烙

癰疽輕按即痛者膿之淺也重按方痛者膿之深也按之不起者膿未成也按之復起者膿已成也膿已成而皮厚肉深難潰不用針烙使腐肉挾毒熱之氣久留肉腠間將好肉亦化爲膿血此烙法所以有功于潰瘍也使根淺而皮薄者又



何必假此以賣弄乎。由此觀之。皮薄者用白降丹可也。皮稍厚則用針。皮極厚而毒深者。非烙不可。其法看瘡頭之最大者。卽是膿窠。用熟鐵大針。于麻油燈火上。燒令紅透。量瘡淺深。及所生之處。置針入一寸。或至二寸。針約五六寸。針下半寸。針頭半寸。若截用竹筋。穿開夾針在內。以意消息。用半寸露針頭。半寸于外用。一寸露針頭。一寸于外用。線縛緊。恐淺深有誤也。若未有膿。暫以紙捻。維入候。次日取出。膿色黃白。卽愈。赤黑防出鮮血。若在虛處。及筋脉骨節處。不得亂行針烙。針烙之入。猶宜稍斜。恐透膜也。烙遲固爲不佳。太早亦生變症。膿深針淺。內膿不出。外血反洩。瘡淺針深。內膿雖出。好肉受傷。此用

針烙之難也

膿流毒泄。氣血俱虧。膿出反痛。虛之故。膿多不斂。弱之因。宜二症。宜大劑參耆歸地。苦藥木苓補之。飲食不化。則脾虛。飲食不思。皆胃弱。宜六君子湯。十全大補湯。肉豎陽虛而屬寒。大補湯加肉赤血虛而兼熱。脈數者。四物湯加連山枝。肉死不潰。因脾困。大補湯加倍參木。肉白不斂。爲陽孤。大補湯加炮姜。寒其之類。膿少色赤。不斂血虛也。穢氣觸而亦然。穢觸者。乳香沒藥。附子。膿流疼痛。筋膈也。針挑引而不妨。膿潰猶疼。必用針挑引。出之。根脚赤暈。口不收。蓋緣餘毒未退。膿少肉白。肉不長。祇因停住寒邪。餘毒未退。四妙湯加白芷。防風。花粉。連召。消毒藥。寒邪凝滯。大補湯加防風。桂枝。外用葱艾湯洗。破後瘡



口堅硬曰風

外用白降丹水調少許鷄翎掃上太乙膏蓋之內服托裏疎風藥

潰後肉長色紫

曰毒

以紅升丹掃上太乙膏貼之肉即紅活

破傷風皆因風襲破傷濕亦為濕侵

四妙湯

治風加防風羌活桂枝之類濕加蒼白朮防風之類虛甚加人參膿出肉長毒未平生肌藥

且宜緩用

毒氣未盡切勿用生肌收斂藥敷之後必復瘡口既腫復潰若瘡口大痒以細茶慈鹽煎湯熱洗瘡口既

收皮薄嫩

太乙膏未可便除發熱宜究邪正之虛

干前熱主于補氣午後熱

主于補血

脈浮數邪在表惡寒仍別虛寒之故

陽虛則惡寒宜四君湯加桂枝或

炮姜大料

寒涼非生肌所喜若肉赤而久不收口脈數者枝連黃芪與之

之品亦投

湯用同四物

發散非潰後所宜倘將斂而遍身作痒脈浮

者消風之劑亦用

消風散與托裏散同服

內虛極而敗症作毒內陷而惡

候生潰後痛疼

膿色敗臭者胃虛之火宜識

大補湯加麥冬五味喘粗氣

短恍惚嗜臥者

脾肺之弱當求

補中益氣湯

脾胃將傾則飲食

作嘔而難化

六君子湯加木香砂仁不應加附子

脾腎已損則肩背不便而重沉

補中益氣湯

加

肝腎陰虛目系急而瞳子上視

山茱萸料加炒山

脾肺氣脫肢體腫而色敗聲嘶

黃丸料加五味

俱浮者大君子

湯加炮姜

不應大補

衣厚仍寒孤陰無濟

陽獨存

陰虛極宜

寒氣內淫腹痛吐瀉手足冷而人昏憤

逆腹鳴不食

陽氣虛之惡症

虛極傳變驚悸怔忡牙關緊而臥

宜托裏溫中

湯後用大君湯

不寧或發熱惡寒

身熱脈洪大按之如無俱惡症

作渴自盜汗手撒

腰背反張頸項強直為變



瘡之兆口噤作冷寒戰咬牙斯絕命之期惡症並見托裏溫中  
功莫緩變症蜂起十全大補力宜施加炮姜熟附救補陽補陰  
不同虛火虛寒當察此因生之常試亦貴當局之變通智者  
緣異以求同患者泥法而昧意瘡外治更有奇方膿不盡而  
腐不脫紅升丹之妙無窮腐已盡而不生入寶丹之功尤大  
瘡口紫黑而堅硬桑枝灸甚佳用桑枝湯洗後將桑枝燃火吹  
三五次新肉生新肉淡白而生遲桃紅散絕妙白降丹治死肉  
遲宜灸四畔息稍近肉取火氣灸患片時日  
不去何須巴豆灰硃太素膏司肉長不平不煖丹香龍竭治療  
細陳調耳宜審溫床煖室偏宜冬月嚴寒冬月發背須穿有袖  
可縫合取其易干揭看也且西人預生炭火使煖逼盡餘寒然後揭開用藥潔淨臥房有便夏天暑熱

熱則微氣明窓淨几常防蟲盡之傷夏大發背時草紙柏烟庶  
易生故也解穢氣之觸穢氣觸則變症起用保全胃氣厚味與生冷皆除  
勿冒風寒大熱與大寒皆避多言多動不免真氣之有傷久坐  
久行皆致起居之不適寡思節慾尤戒悲怒悲憂湯粥適時更  
宜清虛恬靜調耳無失自能保命于萬全治療隨宜無怪活人  
千百中

腫瘍主治法

腫瘍治法先分表裏外因之邪表病也在症則惡風寒拘急發



熱二便如常在脉則浮緊浮數浮洪在瘡則高焮紅腫而痛淺  
內因之邪裏病也在症則煩燥口渴大便秘結小便赤澀在脉  
則沉數沉實在瘡則堅硬平腫不赤而痛深以此二症分認明  
白如看病人純是表症用荆防敗毒散汗散之如表而兼寒兼  
濕兼痰者用萬靈丹如表而兼虛少食泄瀉脉來浮而無力用  
內托復煎散如表邪輕裏症少脉來虛用四妙湯此毒邪在表  
之治法也如看病人純是裏症用內疎黃連湯不應加朴硝如  
止是熱燥大便如常去大黃如兼見大渴大汗合白虎湯此毒  
邪在裏之治法也若不惡風寒二便如常表裏之症俱不見用

當歸黃芪湯此調和榮衛之法也若惡風寒二便秘表裏之症  
互見用衛生湯此通解表裏之法也如表裏之症雖見而微蓋  
因氣血不和兼痰兼鬱壅遏為瘡用神仙活命飲此疏通經絡  
之法也如偶爾跌撲因而腫硬積久欲潰用瓜蔓托裏湯此破  
瘀和傷解毒之法也如口渴便秘寒熱無汗鬱久熱深表裏上  
下俱病用復生散此驅逐三焦內外熱邪之法也若瘡腫外甚  
恐毒邪內攻用蠟礬丸此護心護膜之法也如表裏之症俱無  
瘡頭不高不紅不腫不痛平塌僵頑病人昏迷脉來沉遲微細  
用回陽三建湯此溫補奪命之法也外此則隨時令之寒溫察



地分。之順逆。分經絡之虛實。身重。脉緩。濕勝者。除濕。身熱。脉大。心燥。時腫。乍來乍去者。清熱。諸痛。眩暈。動搖。脉弦者。去風。氣澁。氣滯。乾燥。無津。脉澀者。瀉氣。補血。其大要。始終調理。脾胃為主。若脾胃不傷。臟腑各有所稟。氣血凝結者。得藥自散。膿瘻已成者。得藥自潰。肌肉欲死者。得藥自生。死肉已脫者。得藥自斂。若專攻于瘡。脾胃一虛。變症蜂起。而不可為矣。昔東垣翁。治表不云發汗。而曰托裏。治裏不云攻下。而曰疎通。求經絡不曰疎通。而曰和榮衛。蓋欲保全元氣為主。而不專攻于瘡也。今之醫者。以速愈為高。汗下峻攻。溫毒漫治。毒或速散。不知元氣傷而天

年天矣。予集諸方。攻補兼備。但用者有一可補之幾。則補之。有必不可不攻之勢。則攻之。庶幾得古人好生之意也。

荆防敗毒散 治癰疽發背乳癰等症初起頭疼發熱惡寒

腫高赤疼。痛脉浮緊。浮數。邪在表也。服者汗散。

防風 荆芥 羌活 獨活 柴胡 前胡

薄荷 連翹 桔梗 枳殼 川芎 茯苓

甘草 金銀花 生薑

水二鍾煎八分。瘡在下。空心服。瘡在上。食後服。瘡在臂。加桂枝少許。瘡在腿膝。加木瓜。熱服。取汗。用陳酒過口。



瘡發大陽經倍羌活防風 陽明經加白芷升麻 少陽經  
倍柴胡 太陰經加芍藥升麻 少陰經倍獨活 厥陰經  
加青皮柴胡皆以肉桂佐之

萬靈丹。治癰疽疔毒對口發願一切瘡症初起惡寒發熱高  
燠腫赤疼痛脉來浮緩浮緊用此辛溫發表以散之并治風  
濕風溫濕痰流注附骨陰疽鶴膝風及中風癱瘓血氣凝滯  
之症。

蒼木入兩

全蠍

石斛

天麻

當歸

甘草炙

川芎

羌活

荆芥

防風

麻黃

北細辛

川烏

湯泡去皮

草烏

湯泡去皮尖

何首烏

各一兩

明雄黃

六錢

右爲細末煉蜜爲丸每丸重一錢用硃砂六錢研細爲衣磁  
磬收貯老弱而病勢緩者每服一丸少壯而病勢急者每服  
二丸服法用連鬚大葱白九枝煎湯一茶鍾將藥乘熱化開  
通口服盡被蓋出汗爲度如服後汗遲再用葱白湯催之後  
必汗如淋洗漸漸退下所蓋衣被汗自收而病如失矣若瘡  
已成膿者卽得高腫潰膿若治諸疾無表症者只用熱酒化  
服

內托復煎湯

治瘡燠腫赤痛根盤不深寒熱形等

表大便



如常或泄瀉脉浮數無力恐和外盛而內侵此方主之

黃耆 防風 地骨皮各二錢 蒼朮三錢 芍藥 黃芩

白朮 茯苓 人參 甘草 當歸各一錢 防已

肉桂各五分 水三鍾煎至鍾半不拘時服

四妙湯 治一切瘡瘍腫痛微惡寒時內熱口中無味大便如常皆氣血內虛之故此方益氣和血解毒托裏神方也潰後用之排膿去瘀生肌長肉逐餘毒通經絡

黃耆五錢 當歸八錢 金銀花五錢 甘草一錢

右剉一大劑酒水各半煎服 寒熱脉浮加防風柴胡 腫

赤痛甚加乳香末藥 腫處堅塊白色加半夏南星

泄瀉加蒼白朮 嘔惡心加陳皮半夏蒼朮 惡寒加桂皮

若膿成不潰加防風穿山甲 潰後膿少膿多不斂加牛皮

膠五錢 飲食不思不化加白朮陳皮 虛甚加人參 肉

赤口渴脉數加人參麥冬五味 熱甚加黃連山枝 肉白

肉紫手足冷脉微細無力或嘔加人參白朮陳皮肉桂炮薑

寒甚加熟附子

內疎黃連湯 治癰疽發背對口腿癰等症初起腫硬發熱作

嘔大便秘結小便如淋煩燥飲冷心煩口苦六脉沉實有力



此毒和深伏在裏也用此疎通臟腑使毒邪不得傳變經絡

黃連 黃芩 山枝 當歸 薄荷 木香

白芍 檳榔 桔梗 連翹各一錢五分 甘草五分 大黃二錢

水二鍾煎八分食前服 此方代黃連解毒湯清涼飲破棺丹等劑苦寒攻下之品也若病者大便如常惟見煩燥作渴飲冷謔語脈洪數此方竟去大黃與之可也如不應反加狂言自汗大渴再加石膏知母竹葉梗米倘本病投之本方不應倍大黃如大便仍不通反加狂言大渴非用芒硝不可師古入方不若師古人意全在司命者之變通也

衛生湯 治癰疽發背腦疽對口丹瘤癰癰惡毒疥瘡濕痰流

注一切瘍症未成即消已成即潰在表即散在裏即下通解表裏之神方也

羌活八分 防風 白芷 山甲土炒 石決明煨 沉香

紅花 連翹各六分 金銀花 皂角刺 歸尾 甘草節

花粉各一錢 乳香五分 大黃酒拌炒二錢脈虛便利者不用

水二碗煎八分病在上部先服藥隨後飲酒一杯病在下部先飲酒一杯隨後服藥

當歸黃芪湯 治一切瘡瘍腫痛熱燥但患者二便如常飲食



不減腹口和口知味裏無邪也不惡風寒脉不浮表無邪也  
表裏既和宜調和榮衛此湯主之

當歸 黃芪 地黃 川芎 地骨皮 芍藥

等分剉一劑水煎服 升散加升麻白芷 發熱加黃芩

煩燥加山枝 嘔是濕氣侵胃加白朮 脉虛甚煩燥加人

參麥冬五味白朮甘草去骨皮名托裏養榮湯并治一切不

足之症不膿不潰或潰後寒熱肌肉消瘦盜汗食少睡臥不

寧

神仙活命飲 治一切瘡瘍表裏症互見未成即消已成即潰

初起止痛消毒神效兼痰兼鬱兼內傷瘀血者並治

穿山甲炒白芷 防風 赤芍藥 甘草 歸尾

花粉 貝母 角刺 金銀花 陳皮各三錢乳香

沒藥各一錢二味另研爲末

水酒各半煎成去渣入乳沒末和服

瓜蒌托裏湯 治跌撲傷損腫痛積久欲潰或血氣鬱結痰留

血壅致成瘡瘍未成消已成潰生肌解毒良驗

瓜蒌個 忍冬草 乳香各一錢蘇木五錢 沒藥二錢 甘草二錢

酒煎分三服一日服盡粗爲細末酒糊丸彈子大當歸酒化



下

復生散 治諸般瘡疹。丹瘤膿疥。頭面疔火。口舌熱瘡。及癰疽發背等症。初起增寒壯熱。口乾。大小便秘。用此通解表裏。古人防風通聖散之遺意也。

荆芥

防風

川芎

白芍

甘草

各五分

薄荷

山枝

當歸

連翹

滑石

金銀花

羌活

人參

白朮

各八分

麻黃

各五分。秋三分。夏一分。不用加紫蘇一錢。

大黃

芒硝

二味。人壯氣實。大便七八日不行。各二錢。人老氣虛。各一錢。虛弱煩熱。二便如常。各五分。

水二碗煎。表症甚者。姜三片。蔥頭二。裏症甚者。臨服加生

蜜三匙和服

蠟礬丸

治癰疽發背已成。未膿之際。恐毒不能外出。反而內攻。服此護膜護心。并治腸癰及下部癰腫。未成即消。痔漏腫硬亦効。蓋礬解百毒。無堅不散。蠟性難化。能達下焦也。

白礬

三兩。研極細。

黃蠟

二兩。

硃砂

三錢。另研極細末。

先用白蜜五錢。銅杓內溶化。後入黃蠟同化。清離火入礬末和勻。衆手急丸。丸如桐子大。如藥硬。火微烘。丸就用硃砂末爲衣。每服三四十九。白湯送下。病甚者日二服。

回陽三建湯

治陰疽發背。初起不疼不腫。不熱不紅。硬若牛



皮堅如頑石十日外脉細身涼肢體倦怠皮如鼈甲色似土  
殊粟頂多生孔孔陷血根脚平散軟陷無膿又皮不作腐手  
熱足涼者俱急服之

附子

人參

黃芪

當歸

川芎

茯苓

枸杞

陳皮

黃肉

各一錢

木香

甘草

紫葳

厚朴

蒼朮

紅花

獨活

各五分

煨姜三片阜角樹根皮二錢水二碗煎八分入酒一盃隨病  
上下食前後服之用綿帛蓋煖瘡上頂不得大開瘡孔走泄  
元氣服藥後手足溫煖瘡便發熱漸作焮腫復生疼痛色

暗得活堅硬得腐胃氣得回此是藥之驗也在三服中應之  
則生外兼炤法接助為陽為妙

潰瘍主治法

瘡瘍既潰肉腐膿流血散氣消其虛之必補也宜矣故十全大  
補湯為潰後諸症之總司但其中尚有氣虛血虛虛寒虛熱之  
分丹溪云此湯須看年之老壯資稟壯弱症之緩急時令之寒  
熱加減用之故予以加減法條叙附後是皆先哲之已驗然司  
命者從此而消息之察脉審症隨時致宜再能以已意增損一  
二以平為期斯不愧丹溪之囑也已



十全大補湯

治癰疽瘡瘍潰後血虛氣散氣短懶言倦怠膿

潰反痛死肉不腐膿多不斂膿清肌冷瘡口散大瘡根餘腫

不消肉白肉淡肉紫肉黯腐肉雖脫新肉生遲等症并治虛

人偏身流注瘰癧等瘡難膿難潰難斂者並効

人參已下各一錢白朮炒茯苓已上四味各四君子湯

熟地酒拌當歸酒拌川芎已上四味各四物湯合

黃芪監水拌炒肉桂五分白芍四君子湯名八珍湯

水二鍾姜三片棗二枚煎八分食前服虛人瘡瘍初起加

陳皮香附半夏連翹服之內消一加陳皮五味子烏藥

腫出反痛倍參芪歸地不應加乳香沒藥各七分更不應四

物湯加乳沒肉桂各一錢粟壳泡去筋膜蜜炒二錢

肉赤而不斂血虛有熱也去桂加生地牡丹皮口渴飲冷脉

數加連翹炒黑山枝麥冬五味熱甚加黃連

肉黯不斂陽氣虛寒也倍參芪肉桂加白斂

瘡根脚赤暈不斂及肉長色紫餘毒未退也加金銀花連翹

防風白芷去桂

瘡口堅硬不斂風寒穢氣所觸也加防風白芷金銀花痛加

乳香沒藥



漫腫不痛或死肉不斂脾氣虛也倍參朮不應加炮姜熟附  
肉白膿少不斂陽氣虛也去白芍加炮姜不應加熟附  
膿多不斂氣血虛也去白朮加山藥陳皮

肉淡肉白不斂新肉生遲漫腫虛極也總加牛皮膠五錢去  
白芍。

飲食少思而不斂胃氣虛也加木香砂仁陳皮如嘔再加半  
夏炮姜。

飲食難化而不斂脾氣虛也加炮姜陳皮倍參朮不應佐以  
八味丸如泄瀉送下二陳丸。

惡心作酸飽悶噯氣胸膈不寬惡食少食因虛停食也加陳  
皮山查半夏枳實去當歸生地如嘔臨服加姜汁。

膿少而帶赤血虛也去桂倍歸地加丹皮。

發熱日重夜輕懶言氣短脉浮大無力氣虛也倍參朮若加  
足膝無力偏身倦怠口中無味是中氣下陷用補中益氣湯。

見內傷

發熱夜重日輕五心煩熱脉微細而數血虛也倍歸地加丹  
皮麥冬去桂不應加姜炙二分再不應臨服加童便半盃  
忿怒瞋熱而出血肝火血虛也去桂加丹皮炒黑山枝。



面青血脹而出血肝虛不能藏血也。去桂加山茱萸五味。不應兼用六味丸。

食少體倦而出血脾虛不能捍血也。去桂倍參芪歸地。兼鬱少寐。加遠志。棗仁。茯神。龍眼肉。如不應。暫用歸脾湯。

欲吐作嘔。或外搽內服寒涼。或痛甚。或感寒。和穢氣而嘔。胃氣虛也。去地芎倍參朮。加藿香。陳皮。半夏。木香。臨服加姜汁。

飲食少思。腸鳴腹痛。腹冷泄瀉。脾氣虛寒也。去當歸。川芎。加炮姜。木香。陳皮。如不應。兼用四神丸。

手足逆冷。脾腎虛寒也。加炮姜。木香。熟附子。如兼自利。脉沉。手足逆冷。脾腎虛寒也。加炮姜。木香。熟附子。如兼自利。脉沉。

常用回陽急救湯

方見傷寒

飲冷作渴。熱毒也。加赤小豆。知母。花粉。山枝。麥冬。去桂。善食作渴。胃火也。去桂加知母。山枝。麥冬。五味。不應加石膏。

膿多作渴。氣血虛也。去桂加五味。麥冬。口乾舌燥。腎氣虛也。去桂加山茱萸。山藥。不應兼用六味丸。

自汗內熱。口乾。胃氣虛也。加麥冬。五味。烏梅。黑豉。去桂。盜汗內熱。口乾。陰血虛也。倍當歸。白芍。加麥冬。五味。黑豉。浮

麥。去桂。如不應。暫用當歸六黃湯。莖中痛。小便不利。精內敗也。去桂加山茱萸。山藥。澤瀉。不應



兼用六味丸

愈便則愈痛。愈痛則愈便。精復竭也。去桂煎送六味丸。  
食少體倦。口乾飲熱。小便黃短。脾肺虛熱也。去桂加五味山  
茱萸。不應兼用六味丸。

勞役而小便黃。元氣下陷也。加升麻柴胡。

午後小便黃短。腎虛熱也。去桂加升麻柴胡。不應煎送六味  
丸。

口燥作渴。小便頻數。腎水虧也。去桂加五味麥冬。山萸山茱  
食少體倦作渴。胃氣虛也。加麥冬五味去桂。

體倦頭痛或眩暈。中氣虛也。加升麻柴胡。不應暫用補中益  
氣湯加蔓荊子。

目痛頭痛或眩暈。陰血虛也。加柴胡半夏兼用六味丸。

夢泄遺精頭眩頭痛。或痰喘氣促。腎虛不能納氣也。兼用六

味丸。如不應是虛寒也。用八味丸。面目赤色。煩熱作渴。脉

大而虛。血脫煩燥也。倍芪歸。去桂。

身熱惡衣。欲投于水。脉沉微細。氣脫發躁也。加熟附子。不應  
用回陽急救湯。

多思不寐。体痛盜汗。脾血虛也。去桂加茯神遠志酸棗仁圓



眼肉不應暫用歸脾湯

寢寐汗出。腎氣虛也。去桂加五味煎送六味丸。

飲食時出汗。胃氣虛也。加五味麥冬去桂。

睡後覺飽。出盜汗。宿食也。加半夏陳皮。

胸滿多痰。脾氣虛也。去桂加桔梗半夏。不應六君子湯加桔

梗枳壳。

肺熱多痰。脾血虛也。去桂加陳皮半夏。

咳嗽吐痰。腎虧津液上泛也。加山萸山藥。不應佐以腎氣丸。

忿怒胸痞。肝氣滯也。去桂加桔梗山枝。不應暫用補中益氣

湯加桔梗枳壳。

倦怠胸痞。中氣虛也。倍白朮加陳皮半夏柴胡。

口苦寒熱往來。肝火虛也。去桂加柴胡陳皮。

因怒寒熱往來。肝火血虛也。去桂加柴胡黃芩。不應再加炒

山枝炒棗仁酒炒黑龍胆草。

體倦寒熱往來。肝脾氣滯也。加柴胡陳皮。

內熱晡熱。或寒熱往來。陰血虛也。去桂加柴胡牡丹皮陳皮。

畏寒或寒熱往來。胃氣虛也。用桂枝柴胡。

脇痛痞滿。或寒熱往來。肝氣滯也。去桂加青皮木香柴胡。



婦人勞役。恚怒。或經行發熱。譫語。夜間熱甚。此邪在血分也。去桂加生地。丹皮。柴胡。不應止。用四物湯。悞服。尅伐之劑。或膿血大泄。或因吐瀉。或悞入房。或勞損元氣。或夢遺泄精。或外邪感觸。以致發熱。頭痛。小便淋瀝。或滑數便血。目赤煩喘。氣短。頭暈體倦。熱渴。意欲投水。身熱惡衣。揚手擲足。腰背反張。此陽氣脫陷之假熱症也。畏寒。頭痛。咳逆。嘔吐。耳聾。目矇。小便自遺。瀉痢。腸鳴。裏急。腹痛。陰莖短縮。牙齒浮痛。肢體麻痺。或厥冷身痛。或咬牙齧唇。此陽氣脫陷之真寒症也。

以上假熱真寒。勿論其脈。勿論其症。若見一二急。加附子。溫補之。庶有復生之理。種種加減法。皆爲虛弱者說。倘人壯氣實。瘡頭小毒。勢輕。飲食如常。二便調勻。身輕體健者。竟以四妙湯加減與之。亦無不効也。經曰。以小治小者。功小。其此之謂乎。

托裏溫中湯 治潰後元氣虛寒。或過服尅伐。以致胃氣脫陷。

吐瀉腹痛。神思昏憤。急須溫補。緩則不治。

附子炮去 羌活 乾姜 甘草炙 丁香 沉香

益智仁 木香 茴香 陳皮



生薑水二鍾煎服

金匱腎氣丸 命門火衰以致脾土虛寒不能消潰收斂或飲

食少思不化。臍腹痛。夜溺多。口乾喜熱。虛痰泛上。此方主之。

熟地白製者佳八兩 山萸肉酒淨五兩 山藥蒸人乳拌蒸尤妙 白茯苓蒸

牡丹皮各四兩 澤瀉炒三兩已上六味各六味地黃九專補腎水滋陰降火

附子一枚重一兩二錢者佳先用甘草防風煎湯煮三四滾去皮臍切片再用童便煮一日取起晒乾

厚肉桂去粗皮二兩已上八味各八味地黃九兼補命門相火去陰寒並陽道去附子加五味子二兩各加減八

味先生津止渴引火歸原虛而微寒者用之 牛膝酒淨兩 車前子炒一兩

右為末煉白蜜為丸如桐子大每服三四錢空心鹽湯送

下已上十味名腎氣丸引火歸原回陽返本之妙劑也腎水

虛上泛為痰脾虛不能捫涎而為痰非此不救

瘡瘍外治方法

白降丹 治癰疽發背一切無名腫毒用少許瘡大者用五六厘瘡小者用一

二水調敷瘡頭上初起者立刻起泡消散成膿者即潰腐肉

即脫拔毒消腫誠奪命之靈丹也

水銀一兩 硃砂 雄黃各二錢 硃砂五錢 食鹽 白礬

火硝 皂礬各二兩五錢

先將雄硃礬三味研細入鹽礬硝皂水銀共研勻以水銀不



見星為度。先將羊城礮一箇放微炭火上徐徐超藥入礮化盡微火逼極乾取起。如火大太乾則永走如不乾再用一則藥倒下無用其難處在此羊城礮合上以綿紙截半寸濶將礮子泥草鞋灰光粉三樣研細以鹽滴鹹汁調極濕。一層泥一層紙糊合口四五重及糊有藥礮上二三重地下挖一小潭用飯碗盛水放潭底將無礮放水碗內以瓦埃潭口四邊齊地恐炭火落碗內也有藥礮上以生炭火蓋之不可有空處約三炷香去火冷完開看約有一兩外藥矣煉時礮上如有綠烟起急用筆蘸礮子鹽泥固之。

回春神應丹 治血氣不和壅遏為瘡高腫赤痛兼瘰癧兼濕兼寒者並治 用小雄鯽魚七鮮山藥四兩大慈頭連鬚一個共搗爛用千年陳石灰末少南星半夏白芨赤芍末各一兩和勻陰乾再碾為細末臨用之蜜調敷四遍外用綿子掩之

神燈照法 治癰疽發背初起七日前後未成者自消已成者自潰不起發者即起發不腐潰者即腐潰誠良法也

雄黃 硃砂 血竭 沒藥各二錢麝香四分

右五味研為細末每用三分綿紙裹藥為燃長約尺餘以真



麻油潤透。點火離瘡半寸許。自外而內。周圍徐徐炤之火頭。向上藥氣內入。瘡毒隨火解散。自不內侵臟腑。初用三條。漸加至四五條。瘡自漸愈。炤後隨用敷藥。如大膿已出。不必聚也。只用膏藥蓋之。

敷藥方。用車前子。菴蓋草。五龍草。金銀花。各等分。鮮者搗爛。加陳米粉兩許。飛鹽末二三分。共打為稠糊。徧敷瘡上。中留一頂。以膏蓋貼。避風。如冬月無鮮草。預採陰乾為末。醋調敷亦妙。倘草藥不便。以金黃散代之。

金黃散

治諸般癰疽疔腫。跌撲損傷。大頭時毒。濕痰流注。瘰癧。

瘡火丹。風熱大泡。肌肉赤腫。乾濕。人乳。小兒丹毒。

天花粉。大黃。

黃柏。

姜黃。白芷。厚朴。

陳皮。

甘草。

蒼朮。

天南星。各三錢。

右切細。晒乾。磨為極細末。磁壺收貯。勿令泄氣。凡紅腫發。

熱未成膿者。及夏天火令時。俱用茶湯同蜜調敷。如微熱。

微腫。及大瘡已成。欲作膿者。俱用葱湯同蜜調敷。如漫腫。

無頭皮色不變。濕癰流毒。附骨癰疽。鶴膝風等症。俱用葱酒。

煎調。如風熱惡毒。皮膚亢熱。紅色光亮。形狀遊走不定者。

俱用蜜水調敷。如天泡火丹。赤遊丹。黃水漆瘡。惡血攻注。



等症俱用大藍葉搗汁調敷。加蜜亦可。湯潑火燒皮膚破爛麻油調敷。

猪蹄湯洗法

治癰疽諸毒已潰流膿瘡勢浩大此湯洗之消毒氣去惡肉同死肌潤瘡口散風消腫腐盡則已。

羌活

甘草

赤芍

黃芩

白芷

當歸

蜂房

各等分

為粗末看瘡大小用藥先將猪蹄煎一雙用白水六碗煮蹄軟為度將汁濾清吹去汁上油花用藥末一兩入蹄汁內微火煎十沸再用絹濾去查候湯半溫再用方盤靠身瘡下放定隨以軟絹淋湯瘡上併入孔內輕手擦盡內

膿腐敗腐宿膿隨湯而下以淨為度再以軟帛疊成七八重

勿令大乾帶湯覆于瘡上以手輕盈旋按片時帛冷再換如

此洗五六次自然痛減毒消洗時避風及人口氣

鉄桶膏

治發背大瘡將潰已潰根脚走散不收束者用之

五倍

微炒

銅綠

白芨

明礬

四錢

膽礬

二錢

輕粉

鬱金

各二錢如無美黃代之

麝香

三分

為極細末用陳米醋一碗銅杓內慢火熬至一小杯候起金

色黃泡為度待溫用藥末一錢攪入膏內每用頓溫用新筆

塗膏瘡根上以綿子掩之其瘡根漸收漸縐為妙



太乙膏

治一切惡瘡。跌撲傷損。濕痰流毒。風濕疼痛。及內傷。攻刺作痛。腰膝酸軟。無力。五損內癰。七傷外症。俱貼患處。又男子遺精。女人白帶。俱貼臍下。臘毒腸癰。亦可丸服。

肉桂

白芷

當歸

玄參

赤芍

生地

大黃

土木鱉

各二兩

槐枝

柳枝

各百

血餘

一兩

乳香

沒藥

三錢

東丹

四十

輕粉

四錢

真阿魏

三錢

右十味。併槐柳枝。用真麻油。稱足五斤。將藥浸入油內。春五夏三。秋七。冬十。候日數已畢。入潔淨大鍋內。慢火熬至藥枯。浮起為度。住火片時。用布濾去藥渣。將油將稱記數。將鍋

展極淨。復用細絹將油。又濾入鍋內。將血餘投下。慢火熬至血餘浮起。以柳棒挑看。似膏溶化之象。方筭熬熟。凡淨油一觔。將飛過黃丹六兩五錢。徐徐投下。火加大些。若夏秋熱時。每油一觔。加丹五錢。不佳。手攪候鍋內先發青烟。後至白烟。旋起。氣味香馥。其膏已成。即便住火。將膏滴入水中。軟硬得中為度。若太硬。加熟油。太軟。加炒丹。每各少許。務使老嫩得所。候烟盡離火。將阿魏切成薄片。散于膏面上。化盡。次下乳沒。輕粉末攪勻。傾入水內。以柳棍攪成一塊。再換冷水浸片時。乘溫每膏半觔。扯拔百轉。成塊。又換冷水投浸。隨用時



取一塊銅杓內復化隨便攤貼

紅升丹 治一切瘡瘍潰後拔毒去腐生肌長肉瘡口堅硬肉  
黯紫黑用丹少許雞翎掃上立刻紅活瘡醫若無白升二丹  
決難立刻取效

水銀 一兩 硃砂 五錢 雄黃 五錢 旱礬 六錢 白礬 兩 火硝 兩

先將二礬研碎入大銅杓內加火酒一小盃頓化一乾即  
起研細另將汞硃雄研極細汞不見星再用礬末研勻  
先將羊城礬用紙筋泥澆一指厚陰乾常輕輕撲之不使生  
裂澆泥礬子泥亦可用如有裂以礬子泥補之極乾再晒無

勢入前藥在內礬口以鐵油蓋蓋定加鐵梁蓋上下用鐵  
絲繫緊用綿紙撚條蘸蜜塞礬口縫間外用熟石灰細  
末醋調封固蓋上加炭火二塊使蓋熱礬口封固易乾也

用大釘三根釘地下將礬子放釘上礬底下置堅大炭火一  
塊外砌百眼爐昇三炷香第一炷香用底火

如火大則  
亦先飛上

二炷

香用大半礬火筆蘸水擦蓋第三炷香火平礬口用扇煽頻  
頻擦蓋不可令乾乾則汞先飛上三香完去火冷定開看方  
氣足蓋上約有六七錢刮下研極細末礬礬盛用一以鹽滴  
溷調礬子泥極濕將鐵絲紫筆頭在管上如礬上有綠烟起



即承走也急用筆蘸礬子泥固之

桃紅散

疔痛生肌長肉

用輕粉赤石脂

煨石羔熟各三錢

鉛粉二錢瓜兒血竭一錢冰片五分研極細末磁罇收貯用

少許掃瘡上即愈

八寶丹

每腐已盡新肉生遲此方敷上立效

乳香

去油

沒藥

去油

血竭

輕粉

各二錢

兒茶

龍骨

各一錢

冰片

五分

鉛粉

一錢

為極細末以細紗縛筆套上藥入筆套中篩入瘡內外用膏貼之

太素膏

凡瘡久不收口是元氣虛極急投大補湯內托之外

用輕粉三錢冰片五分為細末用猪脊髓調勻椎絹帛上蓋

貼冠口取効虛甚者加胎骨灰五分或天靈蓋灰五分

補遺神効方

神化丹

治癰疽疔毒一切無名癰腫初起服之立消又解表

裏疎通經絡以毒攻毒削堅導命一名醉消散真神方也

乳香

去油

沒藥

去油各二錢

桉榔

黑丑

頭末

母丁香

山稜

醋炒

蓬朮

醋炒

巴豆

荊芥

桔梗

大黃

赤芍

川烏

草烏

熟地

何首烏

五靈脂

桂枝



當歸

小茴

白菟

去壳

斑貓

連翹

硃砂

全蝎

去尾

雄黃

杏仁

炒

麻黃

各三

穿山甲

不麝香

五分

甘草

三升

蜈蚣

大者一條

共三十二味各為極細末稱准和勻水為丸丸如十子大硃砂為衣每服三分煮酒送下盡醉為度被蓋出汗孕婦忌服

神効干槌膏

治瘡瘍疔毒初起貼之即消及治癰瘰連根拔

出小兒蟻咬頭大人臙瘡久不收口用之

白嫩松香

四兩

草麻子仁

去壳

土水鼈

去壳

杏仁

去皮

銅綠

研細

巴豆肉

五粒

乳香

沒藥

各一

石合一處石臼內搗二千餘下即成膏矣取起浸清水中用時隨瘡大小用手捻成薄片貼瘡上用絹蓋之

玉膏

治久遠癰瘡神効

乳香

各五

沒藥

各五

輕粉

四

蜜陀僧

二

象皮

五

錫粉

二

黃蠟

二兩

白蠟

五

已上除蠟俱為極細末

先用真桐油一觔放鍋內火上滾透去沫油清先入陀僧末攪勻取起入二蠟溶盡攪勻待油稍溫方入細藥攪三百餘遍以大綿紙攤上陰乾隨瘡大小圓長剪貼初貼時瘡中毒



水流山膏藥裏再換新者貼之

疔瘡

瘡小而禍速者莫甚于疔瘡。古人分三十餘種。然皆不外臟腑所積之毒也。元化實功。俱以五色屬五臟。其瘡多生頭面四肢。形如粟米。黑豆或癰黃泡。中或紫黑。按之如疔。在內先痒後痛。先寒後熱。四肢沉重。心悸眼花。是其候也。瘡在項已上者。三陽受毒。先用披針刺入瘡心四五分。挑斷疔根。令出惡血。應用回疔丹。插入孔內。膏藥蓋之。令其自腐。項已下者。三陰受毒。即當隔蒜灸之。不痛亦須針刺。柿葉方効。隨後用飛龍奪命丹。方中用藥底無

也。此丹萬靈丹發汗疎通。如兼見表裏症候。方中用藥底無

飛龍奪命丹 專治疔瘡及癰毒發背。胸股乳癰。一切無頭腫

毒惡瘡。及有頭不知痛痒者。已成未成。服之神効。

蟾酥老酒化 雄黃各三 乳香 沒藥 銅綠各二 膽礬

硃砂 血竭 寒水石各一 輕粉 冰片另研

麝香當門子各五分 蜈蚣一條酒浸炙 蝸牛二十箇

右俱為極細末。用蝸牛連壳研如泥。少加飛羅麵和藥為丸。如棗豈大。每服三丸。用葱白三箇。令病人嚼爛。吐于男左女



右手中將丸藥放在內墊好酒送下。被蓋如人行五六里出汗為效。無汗以熱酒助之。重者再進一服。病在上食後服。在下食前服。忌冷水瓜茄油膩猪雞魚麵及一切發物。

走馬回疔丹 治疔瘡初起針破用此一粒插入孔內膏蓋之。

次後退出膿血疔根為效。

蟾酥酒化

礞砂

輕粉

白丁香

各一

金頂砒

五分

蜈蚣一條

雄黃

硃砂

各二

乳香

六分

麝香

五分

共為細末糊成麥子大補瘡內。

一方內消疔毒用耳菊連葉根搗升一碗用酒送下。重危者

入口即活。一用雄黃一錢為末。爛烏梅肉三枚。蛇蛻二條。

共搗爛塗疔上。疔即拔出。一用鱗皮魚一箇搗爛塗上疔。

毒自出。白降丹千槌膏拔疔毒甚驗。凡瘡毒走散頭面。

耳頂俱腫煩燥脉細痰動喘急走黃過心自汗者死。

紅絲疔

手足間有黃泡即起紅絲一條走入心腹令人悶亂不救皆因大喜大怒氣血逆行所致。急用針于紅線所到之處刺之出血。再嚼浮萍草根敷之立愈。

癰癰



瘰癧之名因形而起累累貫珠

連接三五枚

曰瘰癧形長如蛤曰馬

刀蟠蛇瘰癧則繞項起核瓜膝瘰癧則延及胸腋種種瘰癧名不可勝

述或因風寒厲毒或因厚味熱結或因汗液蟲殘或因憂愁鬱

結或因痰凝氣滯病原不一治要宜分暴久如病人耳項胸腋

驟成腫核色紅微熱寒熱頭疼此風寒暑熱之暴病也易于消

散宜荆防敗毒散加貝母夏枯草不應再加軟堅開鬱之品如

病人累累如貫珠先小漸大不作寒熱日久漸痛堅硬如棋子

大小如李梅繞項延腋此食毒鬱結之久病也最難消散宜潰

堅湯挑竭散之類若瘰癧久而失治身體瘦羸時生寒熱勞怒則

其甚飲食俱減男子骨蒸女人經閉已成壞症若專攻其瘰癧速

其斃也理宜調理脾胃補養氣血使根本既固然後再理其瘰

瘰癧有可生之幾也

潰堅湯 治馬刀結核硬如石在耳下肩缺盆腋此症俱

從手足少陽經起若失而不治不守禁忌漸延至陽明頰下

頰車俱到已潰未潰皆可服之瘦瘰皆治

昆布

冷水先

海藻

炒

黃柏

酒炒

知母

酒炒

天花粉

桔梗

五

膽草

四手

三稜

酒炒

莪朮

酒炒

連翹

黃芩

酒炒

乾葛

五

白芍

酒炒

黃連

各二

甘草

炙

升麻

紫胡

歸尾

各五



右到每一兩水二盞先浸半日煎至一盞去查食後臥定伸足在高處頭微低每嚥一口作十次嚥下服畢安臥片時切不可頓服有耳藻二種相反恐致吐也另揀半料為末蜜丸丸如棗豆大每服百丸臨臥服此方人壯氣實者宜之不

足者宜滋陰散堅湯潰後宜益氣養榮湯  
 滋陰散堅湯 治憂抑所傷遂生癰瘰氣血不足形體瘦弱潮熱咳嗽堅硬腫痛不分新久未潰者並効

川芎 當歸 白芍 熟地 陳皮 茯苓  
 桔梗 白木 香附 甘草 海粉 貝母

人參 昆布 升麻 身熱加柴胡黃芩 自盜汗

姜二片棗二枚水煎食遠服 飲食無味加藿香砂仁 食而不化加山

去升麻倍參芪 胸膈痞悶加澤瀉木香 咳嗽痰氣不清加杏仁

查麥芽 麥冬 口乾作渴加知母五味 睡臥不寧加黃柏遠志棗

仁 驚悸健忘加茯神石菖蒲 有汗惡風加薄荷半夏

無汗惡寒加蒼朮藿香 女人經事不調加玄胡丹皮 腹

脹不寬加厚朴大腹皮

益氣養榮湯 治抑鬱勞傷思慮太過心神俱弊以致四肢頸

瘰癧



項筋縮結成累累如貫珠。或硬或軟或赤或白。或痛或不痛。日晡發熱。及潰而不斂者。効。

人參

茯苓

陳皮

白芍

貝母

香附

當歸

川芎

黃芪

熟地

甘草

桔梗

白朮

二片

生薑

三片

大棗

二枚

水煎服

胸膈痞悶加枳壳木香

飲食不甘暫加厚朴蒼朮

往來

寒熱加柴胡骨皮

膿潰作渴倍參芪歸朮

膿多或清倍

當歸川芎

脇下痛痞加青皮木香

肌肉生遲加白斂肉

桂

痰多加半夏橘紅

口乾加麥冬五味

發熱加柴胡

黃芩

渴不止加知母赤小豆

膿不止倍人參黃芪當歸

潰後反痛加熟附子沉香

虛煩不睡倍人參熟地遠志棗

仁

示言曰瘰癧之作。七情六慾。痰飲鬱熱。積久而成。實非一朝

一夕之故也。故已上二方。以養榮益氣為主。而佐以治癰之

品。蓋恐榮衛一衰。變症蜂起。雖欲治癰而不可得矣。若病初

起。人壯氣實。後方亦可選用。

桃蠟散

治憂思鬱結。痰留氣滯。乃生瘰癧。用大全蝎廿一枚。

核桃廿一箇。核桃劈開去肉入全蝎在內。紫緊火內煨存性。



各用一枚爲末臨臥陳酒送下

孫真人方 治瘰癧初起用壁虎裏泥中煨存性去泥爲末臨臥陳酒送下并治瘰癧潰爛不收口

外治法 一用干槌膏貼欲速用白降丹點拔 一用火針法其法用做鞋底大針二條將竹筋頭劈開以針雙夾縫內相離一分許用線紮定先用桐油一盞用燈草六七根油內排勻點着將針燒紅用手指將核捏起用針當頂刺入四五分核大者再針數孔亦妙核內或痰或血隨卽流出候盡以膏蓋之次日針孔漸腐若堅硬者以白降丹厚麵糊打成條晒

乾揅入針孔內以紙糊二重封固其核癰腫作痛瘡出內服益氣養榮湯調理切戒勞動氣惱房事煎炒海腥一切發物

### 下疳瘡

小便腫痛生瘡名曰下疳濕熱下注者輕淫火毒發者重小便自利不紅不腫止用二靈丹珍珠散敷之自愈如小水不利莖中疼痛紅腫流膿大便亦硬內服八正散大瀉其濕熱方見二便閉若大便自利脉虛人弱者用清心蓮子飲方見五淋若小便淋漓漸爛漸開色紫無膿疼如針刺者難治也

二靈丹 治下疳初起流膿用兒茶一錢研極細去粗查再入



冰片三分研勻。瘡上先用冷茶或甘草湯洗淨。拭極乾用雞翎將藥掃上即愈。

珍珠散 治下疳皮損腐爛痛極難忍及諸瘡新肉已滿不能生皮又治湯火燒皮損肉爛疼痛不止。

新白珍珠

一不入荳腐內煮數滾研極細末無聲方用

花青

五分即上好青黛

真輕粉

一兩

三味共研干轉細如飛麵磁餅收貯初起搽之即愈若腐爛疼痛甘草湯洗淨猪脊髓調搽又婦人陰蝕瘡或新嫁肉傷痛甚者搽之極効。

### 魚口便毒

合縫之間紅腫疼痛左為便毒右為魚口得之奔走勞役濕熱下注者少得之入房忍精淫毒內攻者多故其毒從便而入亦當從便而出初起宜通水丹逐之不應則用山甲內消散潰後用四妙湯托裏其外治法亦照尋常膏散可也若其毒不因入房止因奔走勞役而得者即用四妙湯補而消之甚驗。方見前

通水丹 治下部諸瘡初起魚口便毒橫痃腹癰人壯氣實小便淋瀝者効。用芫花不拘多少揀淨晒極乾研為極細末磁餅收貯每用五分先將大棗二三枚去核夾藥在內空心罇下冷水過口一方先用雞蛋一枚入瓦罐煮二三滾



取起蛋上用銀簪打孔三四十再入礮中復下荳花末一錢  
同煮一二十滾去藥食蛋名綠鳳散并治癰瘰癧核初起良  
驗

山甲內消散 治魚口便毒騎馬癰橫痃等症初起未成膿者

當歸尾 甘草節 大黃各三錢 姜蚕 黑丑打碎各一錢

土木鼈去壳三筒 穿山甲炒三片 水酒各一碗煎八分空心服查

再煎服大便行三四次吃淡粥補住避風為妙

楊梅瘡

瘡形如楊梅或上或下綿綿不絕皆因入房不淨淫火鬱結之

毒也瘡毒所觸氣化傳染先入脾肺其瘡先見于上部皮膚作  
痒筋骨不疼其形小而且乾此症為輕治宜發散若淫女構精  
毒氣入腎流于肝先發下疳次生魚口漸至筋骨疼痛下部生  
瘡漸至遍身形大且硬小便淋赤此症最重因其毒內入骨髓  
外連皮毛若非汗下兼行將何以洗濯其臟腑乎然須察其虛  
實表裏如瘡上身為多皮膚作痒筋骨不疼宜汗之用羊肉發  
藥或用萬靈丹如瘡下身為多骨節酸疼小便赤色大便亦硬  
宜下之用精肉茯苓湯此二者治人壯氣盛初起邪實者之法  
也若瘡發已久血氣已虛毒猶未退宜解毒托散之用胰子湯



虛甚者用仙遺根湯。總之此症宜癸不宜過。貴在除根莫求速愈。得其旨耳。

羊肉發藥 治楊梅瘡初起。皮膚燥痒。上部為多。

威靈仙一兩 蟬退

川芎

當歸各三錢

麻黃春用七錢。夏用九錢。

五錢冬用二兩二錢。先用羊肉一斤。水十碗。煎七碗。去羊肉。入煎藥。于汁內煎至三碗。去查。一日內早午晚分三次服完。用羊肉好酒過口。吃盡被蓋取汗。或吐或瀉三四次。以粥補住。肉毒自解。外毒自癸。忌牛狗鵝雞火酒茶醋等物。每早食仙棗三枚。如病人不能飲酒。或虛極者。服胰子湯。

仙棗方 好大棗廿一枚。去核。入朝粉二分。逐箇用線穿好。放小砂罐內。略放水。煮熟。露一宿。空心吃三箇。冷茶下。

猪肉茯苓湯 治瘡毒下身先見。遂及遍身骨節酸疼。二便澀滯。

牛膝肉 蛤粉

當歸

蒼耳

角刺

紅花

金銀花 花粉

甘草各二錢 蟬退半箇

山甲廿一片。土炒為末。

土茯苓四兩。洗淨。木槌打碎。

大黃大便結者用一兩。如常者用五錢。自利者不用。

猪精肉四兩 用生白酒三大碗。煎至碗半。空心服。猪肉過口。

大便去三四次。以粥補住。



胰子湯 治瘡毒入虛氣弱不敢汗下用此解毒托散

黃連 胡黃連 川芎 牛膝 當歸各錢 防風

金銀花 米仁 木通各一錢 甘草六分 肥阜子七粒去黑皮打碎

姜蠶七條炒研碎 土茯苓二觔白米泔浸一二時打豈大勿托鐵器并花水洗淨

陳酒河水各二碗煎二碗入前藥并胰子一隻去油淨 在內同

煎一碗空心服取汗忌物如前虛弱甚者加人參

仙遺糧方 治楊梅瘡初起筋骨疼痛數月延綿不已并治楊

梅風毒誤服輕粉癱瘓骨疼不能動履

川芎 當歸 防風 米仁 木瓜 木通

金銀花 白癬皮 蒼木 威靈仙各一錢 甘草五分

阜莢子五箇切片微炒 仙遺糧即土茯苓水槌打碎二兩 虛人參瘡久氣者加入

水二碗煎八分看病上下食前後服腿脚之下加牛膝一錢

病淺者一月可退病深者百日可痊此瘡欲發先發下疳預

服此方能免發瘡也食忌如前

外治法 一用銅綠膽礬各五錢輕粉熟石膏各一兩共研極

細末磁罐收貯濕瘡乾摻乾瘡公猪膽汁調點一日點三次

自愈 一用輕粉三錢冰片五分杏仁四十九粒泡去皮尖去油

取霜研極細和輕粉冰片再研勻猪脊髓調點 若瘡一二



枚既大且硬須先用白降丹少許拔腐毒氣後用上藥收口  
洗瘡方 用黃柏黃芩黃連白芨各五錢川椒三錢黃占五錢  
食鹽少許煎湯洗之 一用上方入好醋下冬青葉三四十  
葉同煎取葉貼瘡上查煎湯洗 一方用土菖蒲一味煎湯  
洗瘡即得收口

結毒

結毒者瘡毒方熾末經發散忽被藥火之薰蒸或因輕粉之內  
拔或經點藥之收斂以致毒沉骨髓積久外攻其始也先從筋  
骨疼痛漸漸腫起發無定處故有鼻崩唇缺咽塞喉疼手足拘

等症治法初起者仙遺糧湯膿子湯經年累月毒串筋骨用

五寶丹丹素丹紫金丹選用頭疼欲破吹鼻碧雲散

五寶丹 治結毒筋骨疼痛口鼻腐爛諸藥不効者

清乳石 如乳頭下垂碾之易碎 琥珀 紅色者佳 硃砂 冰片

珍珠 新白者佳 各二錢

五味各研極細秤准共合一處再碾數百轉磁罐封貯每用  
藥末二錢加飛羅麪八錢再碾和勻 每日用土茯苓一觔  
洗極淨置石臼內木槌碎為骰子大用水十一碗煎至七碗  
去渣再用大竹筒一箇絹綳一頭將藥五分置竹筒中細



篩汁內隨手攪勻。一日吃完。看病上下食前後服。每日如此。重者四十服。輕者一二十服。即愈。一方加肥皂核一個。同茯苓煎。如毒結鼻上加辛夷三錢。同茯苓煎。若毒結最重。鼻舌腐爛。加牛黃胎骨。即能暗補。其功最大。忌食火酒。猪頭糟物。海味。茶醋。姜椒。蒜。牛。羊。雞。鵝。豆腐。麩。鮮魚。不忌。若猪肉。肝。肺。腰子。鴨。

丹素丹 治遠年結毒如神

透明硃砂大塊者佳一兩桂府滑石極白者佳二兩各曬乾。研細水飛九次。每服用上法。用硃砂三錢。滑石七錢。研極細。分三十服。

本一觔。洗淨。木槌打碎。先用半觔鋪平。砂礮內做一小窩。大者一箇。挖一孔。入藥一服。于孔內再放半觔。在上用水六。以筋刻痕記定。再加水六碗。煎至六碗水。取起。瀝清。渣。再加水六碗。煎三碗。先後共九碗。一日內不拘時溫服。不可。開斷間。一日要補三日。服完三十服。終身不發。忌食如前火。酒等物。

紫金丹 治遠年近日楊梅結毒。筋骨疼痛。日久腐爛。臭敗。不堪。或咽喉。唇鼻。破壞。諸藥不効者。良。

龜板放炭火上炙。隻用白酒漿筆蘸塗上。反復炙。塗三次。以焦黃為末。三兩。透明硃砂末。



石決明丸孔大者佳煨紅童便內漬一次為末各大錢

共再碾極細爛米飲為丸麻子大每服一錢量病上下食前

後服筋骨疼痛酒下腐爛者土茯苓湯下至重者四十服而

愈

碧雲散 結毒入于顛頂以致頭疼眼痛如破者吹之

鵝兒不食草兩一 川芎兩一 青黛錢

共為極細末患者口噙凉水以蘆管吹藥吹之左右鼻中取

嚏為効

外治法 結毒瘡色紫黑者用白降丹少許掃上拔去惡毒俟

瘡紅活用紅升丹掃上俱用太乙膏蓋外候肉將平用太乙

膏收口

痔

古人因形定名分為九痔牛奶雞心蓮花雞肝翻然不外 醉飽

入房厚味發熱負重致遠以致濕熱風燥流注肛門為腫為瘡

也治法以涼血為主用槐角槐花生地 佐以和血生血用川芎當歸桃仁 行氣

見陽用枳殼 清熱山枝 行溫黃柏防已澤瀉 潤燥麻仁大黃 疎風秦艽 下陷者

升之防風 氣弱者補之人參 氣不順者和之木香 其外治法須

分內外痔生肛門之外痛甚者清之洗之頭大根小者線結之



頭大根大者枯之內痔生于肛門之內有喚腸等法次序而行庶獲效也

良方治痔主方 諸痔初發服一二貼即愈

當歸

生地

枳壳

連翹

槐角

黑牛膽製五味為上多用

升麻

黃芩

黃柏

黃連

陳皮

荊芥穗

大味為中稍減

防風

地榆為下少用

右藥連相冬月用五分夏用一錢伍分春秋用七分 水二鍾

煎空心服 大便燥結加酒蒸大黃三錢炒麻仁末錢半

提肛散 治久痔氣虛肛門下墜及脫肛便血脾胃虛弱等症

川芎

歸身

白朮

人參

黃芪

陳皮

甘草

各一錢

升麻

柴胡

條芩

黃連

白芷

各五

分 水二鍾煎八分食遠服查再煎

能膽散 治痔瘡堅硬作痛脫肛腫泛不收用大冰片一分

能膽二分為末先將大田螺一個用尖刀挑起螺蓋入藥在

內平放片時待螺化出漿水用雞翎掃痔上勤勤用之立愈

洗痔黃硝湯 痔瘡腫痛用大黃二兩用水十二碗煎至八碗

再入朴硝一兩畧滾傾桶內薰洗之一用枳壳二兩荔枝

草四兩河水煎湯先薰後洗



藥線方 治諸痔瘻瘤九根蒂小而頭面大者用此線繫其患

根自効 用芫花五錢壁錢二錢白色細扣線三錢將水一

碗同浸小磁罐內慢火煮水乾為度取線陰乾凡遇前患用

線一根患大者二根雙扣繫于根蒂兩頭留線日漸緊之其

患自然冰冷紫黑枯落後用長肉藥收口秘方用蜘蛛網四邊粗絲合成線維患

上根

枯痔方 凡痔瘡泛出即用此藥塗之痔自乾黑枯落欲用此

方四邊好肉上須先用護痔散護好

明礬四兩 白砒四錢 輕粉三錢 硃砂二錢

先將礬入銅杓內煨滾次入砒末攪勻以礬枯為度去火

片時次入輕砂再研極細磁罐收貯每日辰午申三時以溫

湯洗淨痔上唾津調塗七八日其痔自然枯盡方上生肌藥

護痔散 白芨大黃苦參葶苈粉寒水石黃柏各等分為細末

熟水調塗四邊好肉上方上枯痔藥

喚痔散 痔在肛門內腸頭上外面不見痛苦不勝用此藥喚

出痔來以葱湯洗淨上藥

磁石一兩活而 枯礬五錢 乾姜三分另研 草烏尖五分生用

共研極細用生姜汁或葱汁調塗肛門上少頃肛自內脫出



痔瘡上下洗淨四邊好肉上用前護藥次上枯藥一日三上洗用新筆蘸藥洗之如此六七日脫盡痔根即生肌藥收口後用貼頂升陽散收入其腸內服槐角丸

貼頂升陽散 草麻子四五粒去壳 麝香三分 共搗如膏將頭頂心髮去錢大一塊貼此藥少頃其肛即收入如緩再用醋一口噴患人面上立收

漏

凡瘡口收口有管如燈草日流膿水者曰漏皆因氣血虧損熱毒鬱結使榮衛運行而失其職也偏身有之惟痔瘡成漏最

易俗醫或以藥條腐管或以穿線結開俱痛苦難狀不若服藥內消之為妙也

惟車客散 痔漏不論遠年近日最凶者百日收功其管自出

棗仁炒 遠志肉 山甲炒 骨皮 枳殼醋煮

側柏葉白礬水煮 蒼朮鹽醋米泔童便製各二兩 槐角子炒 陳棕灰

貫衆酒拌九蒸九曬各三兩 蛻皮煨存性一兩 白花地丁七八月採生白花者陰乾六兩

如法製度為極細末空心酒下三錢白湯送下亦可服一月後每服加推車客末三分即蟻 管自推出出者或用快剪剪去



栢膠丸 內消痔漏

廣膠

八兩切斷以牡蠣粉八兩炒成珠去牡蠣

槐角米

一夾四五粒者佳四兩

川黃連

側栢葉

各一兩

雄黃

七錢以白蜜四兩同煎蜜老為度洗去蜜

硃砂

小茴

熊膽

一錢

共為末煉白蜜為丸早晚各服三錢白湯送下

用雞子素用豈腐過口

如痔痛極者加乳香沒藥各三錢

蟾酥一錢半

正宗追毒丸 痔漏通腸汚從孔出先用此丸追盡膿毒後服

閉管丸立効

胡黃連

一兩切片姜汁拌炒

刺蝟皮

一兩炙切片再炒黃為末

麝香二分

共為末軟飯為丸麻子大每服一錢食前酒下服藥後飲水反多藥力到也勿慎之

閉管丸

胡黃連

一兩末

穿山甲

麻油內煮黃色

石決明

煨

槐花

微炒各末五錢

煉蜜丸麻子大每服一錢空心清米湯送下早晚日進二服

至重者四十日而愈如漏四邊有硬肉突起者加蠶繭二十

個炒末和入藥中并治遍身諸漏皆効

臙瘡

臙瘡紅者多熱腫者多濕痒者多風痛者屬實早寬而暮腫者屬虛氣下陷初起者風熱濕毒為多日久者下陷濕熱為勝初



起者荆防敗毒散加牛膝木瓜米仁濕勝加蒼朮熱甚加黃柏  
痒甚倍防風大便結者加酒蒸大黃痛甚加乳沒日久者用補  
中益氣湯加蒼朮米仁茯苓熱甚加黃柏此內治法也其外治  
法先用葱艾湯洗淨瘡色紫黑者用桑枝灸法四圍有硬肉者  
用紅升丹瘡肉未淨者用干棧膏新肉將生濕毒未退用白玉  
膏瘡肉已滿不斂用太素膏此皆神驗之方也若膿上百物打  
破急用熟石膏三錢東丹一錢為細末填實縛緊良驗

### 疥瘡

古人雖有乾濕蟲砂膿五名其大要在分疥膿二種小如疹子

乾而且痒名曰疥瘡風熱蟲三者為多內治復生散疥靈丹外  
治三聖丸薰被法若瘡大如黃荳黃膿起泡而痛甚名曰膿窠  
瘡濕熱虛三者為多初起濕熱勝復生丹日久痛甚用四妙湯  
加蒼朮防風外治法用黃赤丹白風散

疥靈丹

苦參

糯米泔  
浸一日

白芷

白蘚皮

炒各  
一兩

枳殼

炒

連翹

羌活

山枝

當歸

荆芥

各七  
武

右為細末煉蜜為丸桐子大每服五十九湯下立可除根

三聖丸

川大風子肉五十粒水銀二錢章腦二錢共研極細

加相油二錢研勻為丸周身滾之立愈若兼膿窠加硫黃末



一錢

薰被法 川岐艾絨一兩。雄黃細末三錢。共研勻。分三分。每分用綿紙條裹藥在內。一頭燃火置脚爐中。以所蓋之被薰之。火過取出。方解衣就寢。薰三次立愈。一方加銀硃一錢。一方加輕粉一錢亦妙。一方睡在被中薰之。常致偏毒入內。變生他病不可用也。

黃赤散

治膿瘡用硫黃三錢

豆腐內煮半日用

松香二錢東丹一

錢共研極細末。菜油調搽雞子油調更妙。用雞子七箇煮熟去自用黃。先將銅杓置炭火上。加菜油少許。入雞子黃煎

至黑。油自出也。

白鳳散

用雞子一箇打一孔去黃留白入礬石灰二錢用紙

封口外用鹽泥封固火煨通紅去泥研為細末菜油調搽

癰瘡

五癰者濕頑風馬牛也。治法宜分上下。上半身為頑癰治之易。多屬風熱。下半身為陰癰治之難。多屬寒濕。總之血分受病以致皮膚不和也。

浮萍散

治風癰疥癩熱服取汗

浮萍

七月十五採之陰乾

當歸

川芎

赤芍

荆芥



麻黃春秋減半  
夏用三分

甘草各半

剉一劑葱白二莖豆豉五六十粒水煎熟服在手臂加挂枝  
在背加羌活在膝加牛膝薄桂

外治法 一用輕粉硫黃為末蜜調搽 一用大棗一箇去核

入白朮三分泥裹煨透冷定去泥為末香油調搽 一用蜜

陀僧蚊蛤等分為末蜜調敷 一用土槿皮不拘多少為細

末醋調敷以紙蓋之 一用商陸根蘸蜜擦癬 一用禿菜

根蘸人乳擦癬 一用白降丹三分和輕粉七分為末醋調

搽最効

### 疣瘡

防風通聖散酒浸焙乾凡三次食後白湯調服日三服頭上

汗瘡愈矣瘡攻頭用千槌膏貼之

外治法 須用葱椒艾煎滾湯慢慢洗之洗淨瘡甲拭乾先將

菜油三兩銅杓內熬滾八鰾蜈蚣三條以蜈蚣黑枯為度去

查用油搽瘡 一方用鹹猪油半斤杓內煎化後入麻黃六

兩煎麻黃枯黑為度去查洗淨瘡甲用油搽之

### 去白癰瘋

用附子硫黃為細末薑汁調勻用茄蒂蘸擦之 一用硫黃蜜



陀僧各一錢白砒六分共為細末用陳醋調和擦之

鵝掌瘋

用五倍子為末桐油調搽瘋上用炭火烘之二三次即愈一方用風仙花草一枝希莖一兩蟬退三錢煎湯洗一方用瓦花頭髮搗爛用手上搓之立愈一方用川烏草烏何首烏花粉赤芍防風荆芥蒼朮地丁艾葉各一兩煎湯先薰後洗効

汗斑

用硫黃末共浮萍草搗爛塗斑上過一夜立愈一用蜜陀僧細末陳醋調搽隨手而愈

杖瘡

一杖後即用童便和酒一盃飲之以免血氣攻心外用熟豆腐鋪在杖傷處其氣如蒸腐色變紫後易之得紫血散盡轉淡紅色為度一用韭菜搗爛塗患處一用風仙花草搗塗傷處一用陳石灰為末水調鵝翎掃上

金瘡

用五倍子炒枯為末降香屑炒黑色為末等分和勻敷傷處和定立愈單方南星末半夏末青石末花蕊石末陳石灰用韭菜搗爛陰乾為末小麥麩紅絨灰舊氈帽灰



香灰 百草霜末 已上諸方敷瘡俱効各隨其便也

### 湯火瘡

用大黃熟石羔寒水石各三錢東丹錢半冰片三分共爲極細末再用礬灰兩許清水浸化取石灰面上清水半鍾和菜油半鍾攪勻色如雞子黃爲度用水油調前藥敷上立愈 未發泡者醬敷 鹽汁浸 大黃朴硝末菜油調敷俱妙取肉得鹹而堅實且解熱毒也已發泡者解熱毒爲主如蛤蜊壳灰石羔末蚌壳灰大黃末香油調搽取其寒勝熱也已破者收濕解毒生肌爲主如榆樹根皮爲末油調敷銀杏爲末搽之熟石羔東丹

爲末敷細茶小麥共炒黑存性爲末濕者乾滲乾者油調俱妙

### 損傷

按墮車落馬打撲閃胸劓傷刀破皆損傷也其症血肉筋骨受病不在氣分專從血論大要宜分血之虛實如皮破而亡血過多者血虛也宜兼補而和之如皮不破而內積瘀血者血實也宜破血和傷攻利之亡血之脉虛細者生數實大者死損傷瘀血脹滿脉堅強者生小弱者死俗醫損傷惟指瘀血停滯一症故予並載之

和傷治血湯

治損傷瘀血腹脹內壅紅腫暗青瘀痛昏悶欲



死傷最重者服之

山甲炒為末

歸尾

紅花

蘇木

生地

靈仙

加皮

各二

川芎

乳香

沒藥

花粉

各五

茸草

桃仁

打碎四

血竭

分二

大黃

五

水酒各一碗煎臨服加童便一盃服後瀉出瘀血為効後服

活血丹調理若打撲氣閉已死者先用通開散見中吹鼻中

有礙後服此藥自活

活血丹

治跌撲損傷神藥

桃仁

去皮

加皮

山查

刈寄奴花頭

地盤香

浸酒曬乾

紅花

當歸

酒洗

牛膝肉

酒洗

延平索

醋煮

牡丹皮

香附

童便浸炒

各三兩

蓬朮

醋炒

青皮

蘇木

枳實

降香末

川芎

山稜

醋炒

凌霄花

赤芍

威靈仙

兵榔

各二

乳香

去油

沒藥

去油各

大黃

入兩陳

酒浸乾

右如法製度為極細末每服二錢壯者三錢陳酒送下核桃

四五枚過口

透骨丹

治撲打損傷深入骨髓或隱上疼痛或天陰則痛或

年遠四肢沉重無力此藥主之真神方也

開楊花子

一兩

童便浸

二次培乾

乳香

沒藥

不去

真血竭

各

卷之三

卷之三

卷之三



錢各爲末稱准和勻。再加麝香一分再研。磁餅收貯封固。每服三分。壯者五六分。不必用夜飯。准要黃昏睡好方服。酒可盡量送下。葷用猪肉過口。素用豆腐過口。服後避風。有微汗出爲効。忌房事酸寒茶醋等物。及諸般血虛弱者。間五日一服。壯實者間三日一服。

益母膏 能治折傷筋骨。遇天陰則痛。

益母草不拘多少。用水煎膏。隨病上下。食前後服。酒化下。

醫宗說約卷之五終



